


អត្តសញ្ញាណកម្មសត្វព្រៃដែលគេជួញដូរក្នុងតំបន់ អាស៊ីអាគ្នេយ៍



មាតិកា

សៀវភៅរូបភាពពាសម្រាប់ការធ្វើអត្តសញ្ញាណកម្មសត្វព្រៃទាំងនេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយអង្គការត្រាហ្វិកភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (TRAFFIC Southeast Asia) ដើម្បីជួយដល់មន្ត្រីពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់សត្វ និងរុក្ខជាតិព្រៃ ដែលកំពុងមានវត្តមាននៅក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ។ រូបភាពសរុបទាំងអស់មាន៩៣សន្លឹកដែល បានរៀបចំឡើងនៅក្នុង ចន្លោះ ឆ្នាំ២០០៨ ដល់ ឆ្នាំ២០១១ ។

ប្រភព

បញ្ជីក្រហមរបស់អង្គការ IUCN និងឧបសម្ព័ន្ធរបស់អនុសញ្ញាសាយតេស សមត្ថកិច្ចគ្រប់គ្រង និងសមត្ថកិច្ចវិទ្យាសាស្ត្រសាយតេសកម្ពុជា ការណែនាំអំពីការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់លិខិតអនុញ្ញាតសាយតេស ការវាស់វែង និងសេចក្តីពន្យល់ វិធីសាស្ត្ររត់ពន្ធបទល្មើស សត្វព្រៃ និងរុក្ខជាតិព្រៃ ដាក់តាមមនុស្សម្នាក់ៗ វិធីសាស្ត្ររត់ពន្ធបទល្មើស សត្វព្រៃ និងរុក្ខជាតិព្រៃ តាមការលាក់ទុកក្នុងវាលីសំលៀកបំពាក់ វិធីសាស្ត្ររត់ពន្ធបទល្មើស សត្វព្រៃ និងរុក្ខជាតិព្រៃ ដោយបង្កប់ជាមួយទំនិញ វិធីសាស្ត្ររត់ពន្ធបទល្មើស សត្វព្រៃ និងរុក្ខជាតិព្រៃ ដោយបង្កប់ជាមួយប្រភេទស្រដៀងវិប្រហាក់ប្រហែល វិធីសាស្ត្ររត់ពន្ធបទល្មើស សត្វព្រៃ និងរុក្ខជាតិព្រៃ ក្រោមរូបភាពជាសត្វចិញ្ចឹម ការសង្កេតតាមដានលើការក្លែងបន្លំលិខិតអនុញ្ញាត ស្ថានភាពដែលងាយសម្គាល់លើការក្លែងបន្លំលិខិតអនុញ្ញាត

ថនិកសត្វ

<i>Bos gaurus & Bos javanicus</i>	ខ្លាំង និងទន្សោង (Gaur & Banteng)
<i>Capricornis</i>	ក្រមសត្វកែវ (Serow)
<i>Pantholops hodgsonii</i>	ក្រមពពែ Shahtoosh
<i>Saiga tatarica</i>	ក្រមពពែ Saiga
Deer and Antlers	ពពួកមានស្បែក
<i>Moschus</i>	ពពួកប្រើសក្រអូប (Musk Deer)
Felidae (1)	ពួកខ្លា (១) (Cats)
Felidae (2)	ពួកខ្លា (២) ប្រភេទក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ I
Felidae (3)	ពួកខ្លា (៣) បំណែក និងវត្ថុកែច្នៃដែលឃើញមានក្នុងពាណិជ្ជកម្ម
Southeast Asian Otters	ពពួកភេនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍
<i>Helarctos malayanus</i>	ខ្លាប្លង់តូច (Sun Bear)
<i>Ursus thibetanus</i>	ខ្លាប្លង់ ធំ (Asiatic Black Bear)
<i>Hemigalus derbyanus & Chrotogale owstoni</i>	សំពោចបង្កង់ និង កំពឹងដូង (Banded Palm Civet & Owston's Civet)
<i>Prionodon pardicolor & Prionodon linsang</i>	កំពឹងដូងអុជ & កំពឹងដូងបង្កង់ (Spotted Linsang & Banded Linsang)
<i>Arctictis binturong</i>	ឈ្នួសប្រែង ឬ សំពោចភ្នំ (Binturong)
<i>Rhinocerotidae</i>	ពួករមាស (Rhinoceroses)
<i>Manis</i>	ពួកពង្រួល (Pangolins)
Primates	ពួកស្វា
<i>Nycticebus</i>	ពួករញ្ជី (Lorises)
<i>Macaca fascicularis</i>	ស្វាត្តាម (Long-tailed Macaque)
<i>Elephas maximus & Loxodonta africana</i>	ដំរីអាស៊ី និងអាហ្វ្រិក (Elephants)

បក្សី

<i>Dendrocygna javanica & D. arcuata</i>	ប្រីក (Lesser Whistling & Wandering Whistling Ducks)
<i>Leptoptilos</i>	ត្រដក់តូច & ត្រដក់ធំ (Adjutant Storks)
Hornbills	ពួកកេងកង, ញ៉ាំង
<i>Copsychus malabaricus</i>	ល្វាចេកព្រៃ (White-rumped Shama)
<i>Falconiformes</i>	ពួកបក្សីស៊ីសាច់ (Bird of Prey)
<i>Pycnonotus zeylanicus</i>	Straw-headed Bulbul
<i>Gracula religiosa</i>	សារិកាកែវវង់ (Hill Mynah)
<i>Psittaciformes</i>	ពួកសេក (Parrots)
<i>Cacatua</i>	ពួក Cockatoo ស (Cockatoos - White)
<i>Probosciger aterrimus</i>	សេក Cockatoo ត្នោត (Palm Cockatoo)
<i>Eos</i>	ពួក Lorikeet តំណូនេស៊ី (Indonesian Lorikeets)
<i>Loriculus galgulus</i>	សេកកំបោយខៀវ (Blue-crowned Hanging Parrot)
<i>Lorius garrulus</i>	ឆាធីវីង (Chattering Lory)
<i>Lorius lory</i>	កំបោយខ្មៅ (Black-capped Lory)
<i>Strigiformes</i>	ពួកខ្លែងស្រាក (Owls)

មាតិកា

ឧរង្គសត្វ

<i>Crocodylia</i>	ក្រពើ (Crocodyle Hides)
Alligators & Caiman	ប្រភេទក្រពើ និងខ្សែម៉ង់
<i>Crocodylus novaeguineae</i> & <i>C. mindorensis</i>	ក្រពើហ្វីលីពីន និងព្យូហ្គីណេ (New Guinea & Philippine Crocodiles)
<i>Crocodylus porosus</i> & <i>C. siamensis</i>	ក្រពើត្រី និងក្រពើភ្នំ (Estuarine & Siamese Crocodiles)
<i>Tomistoma schlegelii</i>	False Gharial
<i>Uromastyx</i>	បង្កួយកន្ទុយបន្ទា (Spiny-tailed Lizards)
<i>Phelsuma</i>	ប្រភេទត្រីក្រដាសថ្ងៃ (Day Geckos)
<i>Gekko gekko</i>	ពពួកតុកកែ (Tokay Gecko)
<i>Varanus</i>	ពពួកត្រកូត, អន្ស៊ង (Monitor Lizards)
<i>Ptyas mucosus</i>	ពពួកពស់ព្រៃ (Oriental Rat Snake)
<i>Ophiophagus hannah, Naja</i>	ប្រភេទពស់វែក (Cobras)
<i>Pythonidae</i>	ប្រភេទពស់ថ្លាន (Pythons)
<i>Carettochelys insculpta</i>	កន្ទាយប្រមុះជ្រូក (Pig-nosed Turtle)
<i>Chelus fimbriatus</i>	អណ្តើកម៉ាតាម៉ាតា (Matamata Turtle)
<i>Cheloniidae and Dermochelyidae</i>	អណ្តើកសមុទ្រ (Marine Turtles)
<i>Eretmochelys imbricata</i>	អណ្តើកសមុទ្រចំពុះស្នាំង (Hawksbill Turtle)
<i>Batagur</i>	អណ្តើកផ្តៅ & អណ្តើកពណ៌ (Batagur)
<i>Geoclemys hamiltonii</i>	អណ្តើកត្រពាំងពណ៌ខ្មៅ (Black Pond Turtle)
<i>Cuora</i>	អណ្តើកបិទមុខស្លឹកខ្មៅ (Asian Box Turtles)
<i>Leucocephalon yuwonoi</i>	អណ្តើកព្រៃស្នំឡាវេស៊ី (Sulawesi Forest Turtle)
<i>Platysternon megacephalum</i>	អណ្តើកសេក (Big-headed Turtles)
<i>Orlitia borneensis</i>	អណ្តើកយក្សម៉ាឡេស៊ី (Malaysian Giant Turtle)
<i>Siebenrockiella leytensis</i>	អណ្តើកព្រៃហ្វីលីពីន (Philippine Pond Turtle)
<i>Trachemys scripta elegans</i>	អណ្តើកត្រចៀកក្រហម (Red-eared Slider)
Testudinidae	ប្រភេទអណ្តើកភ្នំ (Tortoises)
<i>Astrochelys (Geochelone) radiata</i>	អណ្តើករ៉ាឌីយ៉ា (Radiated Tortoise)
<i>Astrochelys yniphora</i>	អណ្តើកម៉ាដាហ្គាស្ការ (Ploughshare Tortoise)
<i>Chelonoidis (Geochelone) carbonaria</i>	អណ្តើកជើងក្រហម (Red-footed Tortoise)
<i>Geochelone elegans</i>	អណ្តើកផ្កាយតំណូ (Indian Star Tortoise)
<i>Geochelone platynota</i>	អណ្តើកផ្កាយភូមា (Burmese Star Tortoise)
<i>Geochelone (Stigomochelys) pardalis</i>	អណ្តើកខ្លាវិទិន (Leopard Tortoise)
<i>Geochelone sulcata</i>	អណ្តើកខ្លាបណ្ឌិត (African Spurred Tortoise)
<i>Indotestudo elongata</i>	អណ្តើកព្រៃច័ (Yellow-headed Tortoise)
<i>Malacochersus tornieri</i>	អណ្តើក (Pancake Tortoise)
<i>Manouria emys</i>	អណ្តើកសោមបន្ទាភ្នំ (Asian Brown Tortoise)
<i>Manouria impressa</i>	អណ្តើកមាសរឹ ខ្មាស់ (Impressed Tortoise)
<i>Amyda cartilaginea</i>	កន្ទាយអាស៊ី (Asiatic Softshell Turtle)
<i>Chitra</i>	រមិចប៉ារ៉ា (Narrow-headed Softshell Turtles)
<i>Pelochelys</i>	រមិច (Giant Softshell Turtles)
<i>Pelodiscus sinensis</i>	កន្ទាយចិន (Chinese Softshell Turtle)

ថ្មលជនីកសត្វ

<i>Dyscophus antongilii</i> spp.	កង្កែបប៉េនប៉េន (Tomato Frog)
----------------------------------	------------------------------

ត្រី

<i>Scleropages formosus</i>	ត្រីនាគ (Asian Arowana)
<i>Cheilinus undulatus</i>	ត្រី Humphead Wrasse
<i>Hippocampus</i>	ពួកសេះសមុទ្រ (Seahorses)

ពួកសត្វគ្រប់គ្រងកង

Tridacnidae	ពពួកត្រីយក្ស (Giant Clams)
-------------	----------------------------

រុក្ខជាតិ

<i>Nepenthaceae</i>	រុក្ខជាតិបំពង់ស្រមោច (Pitcher Plants)
<i>Orchidaceae</i> (1)	ប្រភេទផ្កាអំរីតិដេក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ របស់អនុសញ្ញាសាយតេស
<i>Orchidaceae</i> (2)	ការវិនិច្ឆ័យផ្កាអំរីតិដេក្នុងប្រទេស (Orchids)
<i>Gonystylus</i>	ប្រភេទឈើ Ramin

ឧបសម្ព័ន្ធសាយតេស និងបញ្ជីក្រហមរបស់អង្គការសហភាពអភិរក្សពិភពលោក (IUCN)

CITES

- CITES (អនុសញ្ញា ស្តីពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ លើប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិព្រៃ ដែលកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់) គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិ រវាងរដ្ឋាភិបាលទាំងឡាយ (រដ្ឋជាសមាជិក) ។ អនុសញ្ញាមានគោលបំណងធ្វើការធានាថា ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ លើសំណាកនៃប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិព្រៃ (ឬបំណែក និងវត្ថុដែលកែច្នៃចេញពីសំណាក សត្វ/រុក្ខជាតិទាំងនោះ ឧទាហរណ៍: វត្ថុមួយដែលធ្វើចេញពីសត្វ/រុក្ខជាតិព្រៃ) មិនគំរាមកំហែង ដល់ការរស់រានមានជីវិតរុក្ខជាតិ/សត្វឡើយ ។
- សាយតេស ធ្វើការដោយដាក់ ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិលើសំណាកប្រភេទសត្វ/រុក្ខជាតិ ដែលបានជ្រើសរើសដើម្បីត្រួតពិនិត្យជាក់លាក់ ។ គ្រប់ការនាំចូល ការនាំចេញ ការនាំចេញបន្ត និងការណែនាំឱ្យស្តាប់ពីសត្វ/រុក្ខជាតិណាមួយ ក្នុងចំណោមពួករុក្ខជាតិ/សត្វ ៣០.០០០ ប្រភេទ ដែលបានចុះបញ្ជីធានាដោយអនុសញ្ញា ត្រូវទទួលការអនុញ្ញាត ឆ្លងកាត់តាមរយៈប្រព័ន្ធផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ ។ សត្វ/រុក្ខជាតិទាំងឡាយដែលការពារដោយអនុសញ្ញាសាយតេស ត្រូវបានចុះក្នុងឧបសម្ព័ន្ធមួយ នៃឧបសម្ព័ន្ធទាំង ៣ ។
- ឧបសម្ព័ន្ធ I គិតលើប្រភេទសត្វ/រុក្ខជាតិទាំងឡាយ ដែលកំពុងរងការគំរាមកំហែងឈានទៅរកការវិនាសផុតពូជ ។ ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើពួកទាំងនេះ ត្រូវបានអនុញ្ញាតចំពោះករណីពិសេសមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះ ។
- ឧបសម្ព័ន្ធ II គិតលើប្រភេទសត្វ/រុក្ខជាតិទាំងឡាយ ដែលការធ្វើពាណិជ្ជកម្មគ្មានការគ្រប់គ្រង អាចនាំដល់ការគំរាមកំហែង ដល់ការរស់រានមានជីវិតរបស់សត្វ/រុក្ខជាតិ ។ ទោះបីនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ប្រភេទទាំងនោះ មិនទាន់ទទួលរង ការគំរាមកំហែងខ្លាំងក្លានៅឡើយក៏ដោយ ។
- ឧបសម្ព័ន្ធ III មានប្រភេទសត្វ/រុក្ខជាតិដែលត្រូវបានការពារដោយប្រទេសមួយយ៉ាងតិច ដែលប្រទេសនោះជាសមាជិកអនុសញ្ញា បានស្នើសុំឱ្យប្រទេសជាសមាជិកដទៃទៀត ជួយត្រួតពិនិត្យការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើសត្វ/រុក្ខជាតិនោះ ។

- សំណាកមួយ នៃប្រភេទដែលមានចុះក្នុងបញ្ជីសាយតេស គេអាចអនុញ្ញាតឱ្យនាំចូលទៅក្នុង ឬនាំចេញ(ឬនាំចេញបន្ត) ទៅក្រៅពីរដ្ឋជាសមាជិកបាន លុះត្រាតែមានឯកសារស្របច្បាប់ត្រឹមត្រូវ ដែលបានផ្តល់ឱ្យជាមុន និងបានបង្ហាញដល់សមត្ថកិច្ចត្រួតពិនិត្យតាមច្រក ឬក៏ពង្រីកនាំចូល ឬនាំចេញ ។ ក្នុងករណីខ្លះច្បាប់ជាតិ អាចមានការតឹងរឹងជាងកិច្ចព្រមព្រៀងខាងលើ បែបនេះ គេត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមករណី ។

ព័ត៌មានបន្ថែមមាននៅលើទំព័រវេបសាយ www.cites.org

ប្រភេទទទួលបានការគំរាមកំហែង នៃបញ្ជីក្រហមរបស់អង្គការសហភាពអភិរក្សពិភពលោក IUCN

ជាង ៤០ ឆ្នាំមកហើយ តាមរយៈគណៈកម្មាធិការស្រាវជ្រាវប្រភេទសត្វ ឬរុក្ខជាតិ អង្គការសហភាពអភិរក្សពិភពលោក IUCN បានវាយតម្លៃស្ថានភាពអភិរក្សប្រភេទ អនុប្រភេទ ប្រភេទផ្សេងៗ និងពពួកមានចំនួនតិចតួច នៅលើផែនដី ធ្វើបង្ហាញឱ្យឃើញលើពពួកដែលទទួលបាននូវការគំរាមកំហែង ឈានទៅរកការវិនាសផុតពូជ ។

សៀវភៅបញ្ជីក្រហម នៃអង្គការសហភាពអភិរក្ស ធ្វើការចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ស្ថានភាពអភិរក្ស និងព័ត៌មានអំពីរបាយរស់នៅរបស់សត្វ ឬរុក្ខជាតិដែលគេបានវាយតម្លៃហើយ ។ ប្រភេទថ្នាក់ និងលក្ខណៈសម្បត្តិដែលកំណត់ ត្រូវបានរៀបចំដើម្បីកំណត់ស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ ដែលទាក់ទងនឹងការវិនាសផុតពូជ ។

ប្រភេទសត្វ/រុក្ខជាតិដែលបានចុះបញ្ជី រងគ្រោះជិតផុតពូជ (CR) កំពុងរងគ្រោះ ថ្នាក់ (EN) និងងាយរងគ្រោះថ្នាក់ (VU) មានកំរិតគ្រោះថ្នាក់ នៃការវិនាសជាសកល ខ្លាំងជាងប្រភេទសត្វ/រុក្ខជាតិដែលបានចុះក្នុងថ្នាក់ប្រភេទ ជិតទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ (NT) ឬរងគ្រោះថ្នាក់តិច (LC) ។

សមត្ថកិច្ចគ្រប់គ្រង និងសមត្ថកិច្ចវិទ្យាសាស្ត្រសាយតេស

អនុសញ្ញា CITES ដំណើរការតាមរយៈការត្រួតពិនិត្យ ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិលើសំណាកនៃប្រភេទសត្វ ឬរុក្ខជាតិព្រៃដែលបានតម្រូវឱ្យធ្វើការត្រួតពិនិត្យ ។ គ្រប់ការនាំចូល ការនាំចេញ ការនាំចេញបន្ត និងការនាំចូលពីលំហសមុទ្រអន្តរជាតិនៃប្រភេទ ដែលមានចុះក្នុងបញ្ជីឧបសម្ព័ន្ធរបស់ CITES ត្រូវមានការអនុញ្ញាតតាមប្រព័ន្ធនៃការចេញលិខិតអនុញ្ញាត ។ ប្រទេសនីមួយៗដែលជាសមាជិករបស់អនុសញ្ញា ត្រូវបង្កើតសមត្ថកិច្ចគ្រប់គ្រងមួយ ឬច្រើន ដើម្បីគ្រប់គ្រងលើការងារចេញលិខិតអនុញ្ញាត និងត្រូវបង្កើតអាជ្ញាធរវិទ្យាសាស្ត្រមួយ ឬច្រើន ដើម្បីផ្តល់យោបល់ឱ្យអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងអំពីស្ថានភាពអភិរក្សរបស់ ប្រភេទសត្វ ឬរុក្ខជាតិព្រៃដែលត្រូវបានធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ និងផលប៉ះពាល់ទៅលើប្រភេទនោះ ។

សមត្ថកិច្ចគ្រប់គ្រងសាយតេសកម្ពុជា

អាស័យដ្ឋាន : អគារលេខ ២៤២ សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ មហាវិថី ព្រះនរោត្តម
 ខណ្ឌចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ ប្រអប់សំបុត្រ ១៦២០
 អ៊ីម៉ែល : CITESMA.Cambodia@online.com.kh
 ទូរស័ព្ទ/ទូរសារ : ៨៥៥ ២៣ ៧២៦ ៤៤១ ឬ ២១៥ ៩៦៨

សមត្ថកិច្ចវិទ្យាសាស្ត្រសាយតេសកម្ពុជា

១- រដ្ឋបាលព្រៃឈើ ទទួលបន្ទុកជាសមត្ថកិច្ចវិទ្យាសាស្ត្រសាយតេសកម្ពុជា សម្រាប់ធនធានសត្វ និងរុក្ខជាតិព្រៃ
 អាស័យដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៤០ មហាវិថីព្រះនរោត្តម ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា
 ទូរស័ព្ទ/ទូរសារ : ៨៥៥ ២៣ ២១២ ២០១

២- រដ្ឋបាលជលផល ទទួលបន្ទុកជាសមត្ថកិច្ចវិទ្យាសាស្ត្រសាយតេសកម្ពុជាសម្រាប់ធនធានជលផល
 អាស័យដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ១៨៦ មហាវិថីព្រះនរោត្តម សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ,
 កម្ពុជា ប្រអប់សំបុត្រលេខ ៥៧២
 ទូរស័ព្ទ/ទូរសារ : ៨៥៥ ២៣ ២១៩ ៤៤៦/០២៣ ២១៥ ៤៧០
 អ៊ីម៉ែល : Catfish@camintel.com.kh


៣- អគ្គនាយកដ្ឋានការពារ និងអភិរក្សធម្មជាតិ ទទួលបន្ទុកជាសមត្ថកិច្ចវិទ្យាសាស្ត្រសាយតេសកម្ពុជា សម្រាប់ធនធាន សត្វ និងរុក្ខជាតិព្រៃនៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិទាំង ២៣កន្លែង ដែលចុះក្នុងព្រះរាជក្រឹត្យទេសា ១៩៩៣ ។

អាស័យដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៤៨ មហាវិថីព្រះសីហនុ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា
 ទូរស័ព្ទ : ៨៥៥ ២៣ ២២២ ៣១១ ទូរសារ : ៨៥៥-២៣-២១១ ៩៤៤

ក្រុមការងារ ឬស្វា ពួកស្វាមាឌដំ និង ស្វា


Guide to Verification of CITES Permits

លិខិតអនុញ្ញាត CITES ដែលត្រូវត្រួតពិនិត្យជាមួយសំណាក ឬទំនិញក្នុងពេលដឹកជញ្ជូន



ការវាស់ និងសេចក្តីពន្យល់

ការវាស់ :



Radiated Tortoise
Credit: Chris Shepherd/TSEA





Image Credit: Vincent Nijman

សេចក្តីពន្យល់ :



ស្រកា ឬស្រកាស្បែក

ជាស្បែកក្រិន ឬស្បែករឹង
ដូចជាស្រកាស្លឹករបស់អណ្តើក

ស្លឹកខ្នង (ខាងលើ)

ជាផ្នែកខាងលើនៃស្លឹកខ្នងរបស់
អណ្តើកជាតិក្នុងកាលតែងតែ
មានស្រកាវីង ឬស្បែកទន់

ស្លឹកទ្រូង/បាត

ជាផ្នែកខាងក្រោមនៃស្លឹកអណ្តើក
ដើម្បីគ្របក្រពះរបស់វា

Bos gaurus (Bos frontalis) - Gaur & Bos javanicus - Banteng

(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ)

(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រខ្មែរ)

(ខ្លី)

(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ)

(និមិត្តរូប)

ខ្លី (Gaur)

ឈ្មោះម្យ៉ាងទៀត: Seladang (ម៉ាឡេស៊ី) Pyoung (ភូមា) Gaur (អង់គ្លេស)

រាយការណ៍នៅ: ប្រទេសបង់ក្លាដេស ប៊ុយតាន កម្ពុជា ឥណ្ឌា ឡាវ ម៉ាឡេស៊ី ភូមា នេប៉ាល់ ថៃ វៀតណាម។

លក្ខណៈរូបរាង: ស្លាក់ពស់ចាប់ពី ១៦៥-២២០ស.ម ប្រវែងក្បាល និងដងខ្លួន: ២៥០-៣៣០ស.ម ប្រវែងកន្ទុយ ៧០-១០៥ស.ម មានទំងន់ចាប់ពី ៦៥០-១០០០គ.ក

នឿរ (Banteng)

ឈ្មោះម្យ៉ាងទៀត: Tsaine (ភាសាភូមា)

រាយការណ៍នៅ: កម្ពុជា ឥណ្ឌូនេស៊ី ឡាវ ម៉ាឡេស៊ី ភូមា ថៃ វៀតណាម។

លក្ខណៈរូបរាង: ស្លាក់ពស់ ១២០-១៩០ស.ម ប្រវែងក្បាលទៅដងខ្លួន: ១៨០-២២៥ស.ម កន្ទុយ ៦៥-៧០ស.ម មានទំងន់: ៤០០-៩០០គ.ក

ស្ថានភាពអភិរក្សអន្តរជាតិ:

- ខ្លីស្ថិតក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ I នៃអនុសញ្ញា ស្តីពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិលើប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិព្រៃ ដែលកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ (CITES)
- ខ្លី (ងាយរងគ្រោះថ្នាក់=VU) នឿរ (កំពុងរងគ្រោះ=EN)

កិច្ចការការពារជាតិ:

ខ្លី និងនឿរ ត្រូវបានការពារស្របតាមច្បាប់ ស្តីពីព្រៃឈើឆ្នាំ២០០២។ (កម្ពុជា) ខ្លី និងនឿរស្ថិតក្នុងក្រមសត្វដែលកម្រ

លក្ខណៈសំគាល់:

ខ្លី: *Bos gaurus* (*B. frontalis*)-Gaur



ដងខ្លួនខ្លីពណ៌ខ្មៅ ត្នោតចាស់ ឬប្រផេះ ជើងទាំងបួនចាប់ពីដង្កង់ចុះក្រោមពណ៌ស


ស្បែកមានប្រវែង: ≤ ៩៥ ស.ម
វិជ្ជមានត្រប្រវែង: ≤ ៥៦ ស.ម



ស្បែកខ្លីមានពណ៌លឿង ហើយចុងស្បែកពណ៌ខ្មៅ

Credit: Claire Beasall

នឿរ: *Bos javanicus* - Banteng



- ដងខ្លួននឿរមានពណ៌ត្នោតចាស់និងខ្មៅ (ឈ្មោល) និង ពណ៌ត្នោតខ្ចី (ញី)
- ជើងទាំងបួនខាងក្រោមជង្គង់ និងផ្នែកខាងក្រោយត្រង់ត្រគាក មានពណ៌ស

គល់ស្បែកមានរាងមូល

លលាដ៏ក្បាលមានរាងរួមតូច និងមិនសូវមានរោមក្រាលទេ



នឿរមានល្បាយជំទង់
Credit: Mark Auliya / TSEA

ស្បែកមានប្រវែង: ≤ ៨៧ ស.ម
វិជ្ជមានត្រប្រវែង: ≤ ៤៨ ស.ម

លក្ខណៈពាណិជ្ជកម្ម: មានស្បែកជាប់លលាដ៏ក្បាល និងសាច់។



ស្បែកតាំងលក់

ក. ស្បែកនឿរ

ខ. ស្បែកខ្លី



ស្បែកនឿរតាំងលក់
Credit: TRAFFIC SEA

ស្បែកខ្លីតាំងលក់
Credit: TRAFFIC SEA

លក្ខណៈសំគាល់: ខ្លី មានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាជាមួយក្របីព្រៃ



ស្បែកមានប្រវែង: ≤ ១៤៩ ស.ម
វិជ្ជមានត្រប្រវែង: ≤ ៥៨ ស.ម

គោស្រុក



លលាដ៏ក្បាលមានរាងសំប៉ែត

ប្រភេទ *Budorcas taxicolor* ត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ II នៃអនុសញ្ញាសាយតេស (CITES)



ស្បែកមានរាងកោងនៅត្រង់គល់ស្បែក
ស្បែក takin មានប្រវែង: ≤ ៦៣ ស.ម
វិជ្ជមានត្រប្រវែង: ≤ ៣៣ ស.ម

Capricornis spp. - Serow spp.

(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ)

(ក្រុមសត្វកែវ)

កែវ (Serow)

ឈ្មោះម្យ៉ាងទៀត: Kambing Gurun (ភាសាម៉ាឡេស៊ី) Taw sai (ភាសាភូមា)

រាយការណ៍នៅ: ប្រទេសបង់ក្លាដែស ប៊ុយតាន កម្ពុជា ចិន ឥណ្ឌា ឥណ្ឌូនេស៊ី (កោះសូម៉ាត្រា) ជប៉ុន ឡាវ ម៉ាឡេស៊ី ភូមា នេប៉ាល់ តៃវ៉ាន់ ថៃ វៀតណាម ។

លក្ខណៈរូបរាង: ស្លាកំពស់: ៨៥-៩៤ស.ម ប្រវែងពីក្បាលទៅដងខ្នង: ១៤០-១៥៥ស.ម ប្រវែងកន្ទុយ: ១១-១៦ស.ម ប្រវែងស្បែក: ១៥-២៥ស.ម ។

ស្ថានភាពអភិរក្សជាតិ:

- ប្រភេទសត្វកែវទាំងអស់ត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីឧបសម្ព័ន្ធ I នៃអនុសញ្ញា ស្តីពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិលើប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិព្រៃដែលកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ (CITES) លើកលែងប្រភេទសត្វកែវក្នុង ប្រទេសជប៉ុន និងតៃវ៉ាន់ *C. crispus* និង *C. swinhoei* ដែលមិនទាន់ចុះបញ្ជី ។
- វាប្រែប្រួលពីសត្វរងគ្រោះថ្នាក់តិចទៅ ងាយរងគ្រោះថ្នាក់ (IUCN: LR-VU)

កិច្ចការពារថ្នាក់ជាតិ:

ត្រូវបានការពារដោយច្បាប់ ស្តីពីព្រៃឈើ ឆ្នាំ២០០២ កែសម្រួលក្នុងក្រមប្រភេទសត្វដែលកម្រ ។ (កម្ពុជា)



Credit: Claire Beastall

លក្ខណៈសំគាល់:



Credit: Claire Beastall



Credit: Claire Beastall



Credit: Chris Shepherd / TSEA

- ត្រចៀកវែងៗ
- មានក្នុង និងរោមក្រវីងវែងៗដូចគ្នា ចាប់ពីក្បាលដល់ស្មា (រោមនេះអាចពណ៌ត្នោត ឬពណ៌ស)
- រោមរបស់វាត្រឹមៗ ហើយមានពណ៌ចម្រុះ ខ្មៅលាយប្រផេះ ត្នោត ក្រហមច្រើង
- នៅពេលមានពណ៌ស្រាល

ក្រពេញមីកក្នុងក្បាលដែលអាចមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ក្រោមភ្នែកទាំងសងខាង

លក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទៅនឹង:

ក្រុម *Naemorhedus* spp. - Goral spp.

ត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីឧបសម្ព័ន្ធ I នៃអនុសញ្ញា CITES ពីក្បាលទៅដងខ្នងមានប្រវែង: ៨២-១៣០ស.ម

កំពស់ស្មា: ៥៧-៧៨ស.ម

ប្រវែងកន្ទុយ: ៧-២០ស.ម


ប្រវែងស្បែក: ៧.៨-១២ ស.ម

- ដងខ្នង និងស្បែកតូចជាងសត្វកែវ *Capricornis* spp.

- មិនមានលេចចេញក្រពេញមីកក្នុងក្បាល

- រោមវាមានពណ៌ប្រផេះ ត្នោតចាស់ ឬក្រហម

- ពោះមានពណ៌ស្រាលជាទូទៅ



ខ្នងស្លឹកខ្មៅ

សន្ទុះកស

ស្មាមន្តូតខ្មៅនៅជើងមុខ

លក្ខណៈពាណិជ្ជកម្ម:

ភាគច្រើនជាបំណែករាងកាយសត្វកែវត្រូវបានផ្ញើជូន (ដូចជា ស្បែក ក្បាល ជើងមុខ ។ល ។ជាដើម) ដើម្បីធ្វើ ឱសថ និង ព្រមទាំងសាច់របស់វាផងដែរ ។



ស្បែកកែវ

Credit: Chris Shepherd / TSEA



ស្បែកកែវ

Credit: Chris Shepherd / TSEA



ប្រេងចំរាញ់ពីក្បាល និងជើងសត្វកែវ
Credit: Chris Shepherd / TSEA



ស្បែកកែវ

Credit: Chris Shepherd / TSEA



ក្បាលកែវ

Credit: Chris Shepherd / TSEA



ប្រេងចំរាញ់ពីក្បាល និងប្រអប់ជើងសត្វកែវ

Credit: Chris Shepherd / TSEA

Pantholops hodgsonii – Tibetan Antelope

(ឈ្មោះខ្មែរសាស្ត្រ) (ពពែនីមេ)

ពពែនីមេ Tibetan Antelope

ឈ្មោះផ្សេងៗទៀត : Chiru (អង់គ្លេស), Tsod (ទីប៊ែ), Zanglingyang (ចិន)

របៀបរស់នៅ : ចិន (ខេត្ត Qinghai, Xingjiang) ឥណ្ឌា (ខេត្ត Jammu - Kashmir)

គំនិតភាគ : កំពស់ចាប់ពីចុងដើមរហូតដល់ស្មាមានប្រវែងរហូតដល់ ៨៥ ស.ម.
មានទម្ងន់រហូតដល់ ៤០ គីឡូក្រាម

ស្ថានភាពអភិរក្សអន្តរជាតិ : ស្ថិតក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ I នៃអនុសញ្ញាសាយតេស

ក្នុងបញ្ជីក្រហមនៃស្បែកសត្វរបស់ : អង្គការ IUCN: ជាប្រភេទកំពុងទទួលបានការគ្រោះថ្នាក់ (EN)

កិច្ចការពារស្របច្បាប់នៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជា : ត្រូវអនុវត្តអនុក្រឹត្យលេខ ០៥៣ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២៩ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០០៦ ស្តីពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិលើប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិព្រៃ ដែលកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់




ប្រភព: Tony Lynam

សម្គាល់ : លោកអ្នកគួរទាក់ទងអ្នកជំនាញប្រចាំមូលដ្ឋាន ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណអោយច្បាស់លាស់បន្ថែមទៀត

ពពែនីមេ

ផលិតផលដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាច្រើនបំផុត គឺជា Shahtoosh ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា Shahtoosh កន្លែងបង់ក Shahtoosh ស្ទើរទាំងស្រុង និងមិនហាមឃាត់ផលិតផលនេះទេ អ្នកលក់តែងបង្ហាញគុណសម្បត្តិរបស់កន្លែងនេះដោយអូសចិញ្ចៀនកាត់

- ភាគច្រើនពណ៌សក្បាល និងពណ៌ត្នោតខ្ចី (ប៉ុន្តែគេអាចជ្រលក់ពណ៌ផ្សេងៗទៀត) ពណ៌សមានតម្លៃថ្លៃជាងគេបំផុត :
- អ្នកត្បាញអាចបោះពុម្ពរូបសត្វនៅចុងជ្រុងម្ខាងនៃកន្លែង
- គេតែងតែឃើញមានប៉ាក់ជាប្លង់ត្នោតខ្ចីនៅពាក់កណ្តាល ឬគ្រាន់តែប៉ាក់នៅតាមជ្រុងម្ខាង
- ជាយកន្លែងភាគច្រើនមានប្រវែងខ្លី
- Shahtoosh មានក្រឡាស្តីតាមរូបរាងយ៉ាងវិចិត្រ (អាចមើលឃើញដោយប្រើកែវពង្រីក) ដេញពន្លឺដូចពេជ្រ



ប្រភព: WWF China




ប្រភព: US Fish & Wildlife



ប្រភព: US Fish & Wildlife

Shahtoosh ត្រូវបានផ្ទេរដោយប្រើរោមកែវហើយពុំមាន រោមវែងៗនោះទេប៉ុន្តែអាចមានលាយចំរុះរោមខ្លីៗ ពណ៌ ស្រាលខ្លះ ដែលត្រឹមជាងសក់មនុស្ស ហើយរូញ ឬ ខើចខ្លី



មានតែសត្វ Chiru ឈ្មោលប៉ុណ្ណោះ ដែលមានស្បែក ហើយស្បែកនេះមានលក្ខណៈប្លែកខុសពីសត្វដទៃ ប្រភព: Environment Canada

លក្ខណៈនៃការផ្សព្វផ្សាយ : ស្បែក និងផលិតផលកែច្នៃជាងកន្លែងបង់កម្ពុជាគ្មានគ្រប់ ប្រទេសឃើញជាតួស្បែក សម្រាប់តាំងលំអ និងដាក់តាំងលក់សម្រាប់យកទៅធ្វើឱសថ បុរាណផងដែរ ។



មានកន្លែងបង់កកែច្នៃពីរោម Chiru ដែលត្រូវគ្រប់គ្រងដោយ ប្រភព: NRECD, Thailand



ស្បែក និងលំអដ៏ក្រាស់ Chiru ដែលគេដាក់តាំងលំអរ ប្រភព: WWF China

លក្ខណៈស្រដៀងគ្នា :

- ផលិតផល Pashmina ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាច្រើនបំផុត គឺជា Cashmere មើលទៅស្រដៀងផលិតផល Shahtoosh ដែរប៉ុន្តែវាមានតម្លៃថោកជាង Shahtoosh
- អាចមានចំណុចស្រដៀងគ្នាដូចជា ទំងន់ស្រាល ទន់ មាន ឬគ្មានការដេញពន្លឺដូចពេជ្រ អាចអូសស្រពកាត់ចិញ្ចៀន ដោយរាមិន ស្ទើរមានជាតិក្រណាត់ (Fabric)
- ជាធម្មតា ជាយកន្លែង Pashmina រាងវែងជាង ហើយរមួលអង្កាញ់



ប្រភព: US Fish & Wildlife



ប្រភព: US Fish & Wildlife

Saiga tatarica - Saiga Antelope

(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ)

(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ: ពពួកតែ សាយឡា)

ពពួកតែ សាយឡា (Saiga Antelope)

ឈ្មោះម្យ៉ាងៗ: Saiga Antelope (អង់គ្លេស)

រាយការណ៍នៅ: ប្រទេសកាហ្សាស្ថាន ម៉ុងហ្គោលី សហព័ន្ធរុស្ស៊ី ទឹកមេននីស្ថាន និងប្រទេសអ៊ុយបេគីស្ថាន។

លក្ខណៈរូបរាង: ប្រវែងពីក្បាលទៅដងខ្នង: ១០៨-១៤៦ស.ម
កន្ទុយប្រវែង ៦-១៣ស.ម ទម្ងន់: ២១-៥១គ.ក

ស្ថានភាពអភិរក្សអន្តរជាតិ:

- ស្ថិតក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ II នៃអនុសញ្ញា ស្តីពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិលើប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិព្រៃ ដែលកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ (CITES)
- ប្រភេទរងគ្រោះថ្នាក់ជិតផុតពីបំផុត
- ជាប្រភេទរងគ្រោះជិតផុតពីបំផុត (IUCN: CR)

កិច្ចការការពារអន្តរជាតិ:

អនុក្រឹត្យ លេខ ៥៣ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៦ ស្តីពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិលើប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិព្រៃ ដែលកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ ឆ្នាំ២០០៦។




Illustration Credit: Environment Canada

លក្ខណៈសំគាល់ស្នែងពពួកតែ Saiga Antelope:



Credit: TRAFFIC SEA

ខុសពីស្នែងសត្វដទៃទៀត មានតែពពួកតែសាយឡាប៉ុណ្ណោះដែលដុះស្នែង និងលក្ខណៈទាំងនេះគឺ:

- គល់ស្នែងតានឹង
- ស្នែងពាក់កណ្តាលឆ្នាំ
- មានពណ៌ត្នោតខ្ចីដូចក្រូមួន
- មានកងអង្កាញ់ដុះពីគល់រហូតដល់ចុងស្នែង
- មានរាងកោងបន្តិច
- មានប្រវែងរហូតដល់ ៣០ស.ម (មានរាងកោង)



Credit: TRAFFIC SEA



Credit: Environment Canada



Credit: Environment Canada

លក្ខណៈពាណិជ្ជកម្ម: ស្នែងទាំងមូល និងស្នែងចិតជាចំណី



ស្នែងពពួកតែ ដាក់តាំងលក់
Credit: TRAFFIC SEA



Credit: TRAFFIC SEA



ស្នែងចិតជាចំណី
Credit: Claire Beastall



Credit: TRAFFIC SEA



Credit: TRAFFIC SEA



គំរូកញ្ចប់ថ្នាំស្នែងពពួកតែ Saiga Antelope
Credit: TRAFFIC SEA



ឈ្មោះដែលត្រូវប្រើជាទូទៅក្នុងការរៀបរាប់ពីពពួកតែ Saiga Antelope នៅលើកញ្ចប់ថ្នាំប្រភេទ។

Saiga Antelope Horn

តួអក្សរចិន

羚羊角

Pinyin:

Ling Yang Jiao

Multi-tined Antlers (ស្លែង ~ ក្រុមតិណាសីដ្ឋាភ័ក្ត្រ)

ផលប្រមាណនៃប្រភេទតិណាសីដ្ឋាភ័ក្ត្រ

ស្លែងក្រុមតិណាសីផ្សេងទៀត ក៏ត្រូវបានគេធ្វើការផ្សព្វផ្សាយផងដែរ ផលប្រមាណនៃប្រភេទតិណាសី ខាងក្រោមនេះ គេប្រទះឃើញកញ្ចប់ជាន់នៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនេះឃើញតែស្លែងក្រុមតិណាសីឈ្មោះពេញវ័យប៉ុណ្ណោះ ស្លែងក្រុមតិណាសីថ្នាក់តូចអាចជម្រុះ និងដុះឡើងវិញទៀងទាត់តាមរដូវកាល (ពុំដូច ស្លែងក្រុមគោសាទិសដែលពុំជម្រុះទេ)

ស្ថានភាពអភិរក្សអន្តរជាតិ : ប្រែប្រួលទៅតាមប្រភេទ

មានចុះបញ្ជីក្នុងឧបសម្ព័ន្ធសាយតេស្តខុសៗគ្នាទៅតាមប្រភេទ




គ្នាន់ Axis porcinus - Hog Deer IUCN កំពុងរងគ្រោះ ថ្នាក់ (EN) Axis porcinus annamiticus (នៅវៀតណាម) ជាប្រភេទរងគ្រោះថ្នាក់ជិតផុតពីបំផុត (CR)  ស្លែងមានខ្លែង (ក្តាំង) ធំមួយ ខ្លែងពីរនៅខាងចុងស្លែង ខ្លែងតូចមួយនៅ គល់ស្លែងរាង ខ្ទប់ខាងលើ ប្រវែងក្បាល-ដងខ្នង ១៤០-១៥០ ស.ម ប្រវែងកន្ទុយ ១៧-២១ ស.ម កំពស់ ៦៥-៧២ ស.ម ទម្ងន់ ៧០-១១០ គ.ក រចនាសម្ព័ន្ធនោះ : បង្កាដេស, កម្ពុជា, ចិន, ឥណ្ឌា, ភូមា, នេប៉ាល់, បាតាវីនី និងថៃ	ស៊ីកា Cervus nippon - Sika Deer បញ្ជីក្រហមនៃអង្គការ IUCN ប្រភេទថ្នាក់តិច (LC) Axis porcinus annamiticus (នៅវៀតណាម) ជាប្រភេទរងគ្រោះថ្នាក់ជិតផុតពីបំផុត (CR)  ប្រវែងក្បាល-ដងខ្នង ៩៥-១២០ ស.ម ប្រវែងកន្ទុយ ៧៥-១៥០ ស.ម កំពស់ ៦៥-១១០ ស.ម ទម្ងន់ ៨០-១២០ គ.ក រចនាសម្ព័ន្ធនោះ : ចិន, ជប៉ុន, សហភាពរុស្ស៊ី, តៃវ៉ាន់ និងវៀតណាម	ប្រើសណាសីឡា Rucervus (Cervus) duvaucelli - Barasingha Deer ចុះក្នុងបញ្ជីឧបសម្ព័ន្ធ I នៃអន្តរជាតិ CITES ក្រហមនៃអង្គការ IUCN កំពុងរងគ្រោះ ថ្នាក់ (EN)  ជាធម្មតាមានខ្លែង ១០ទៅ ១៥ ប្រហាក់ប្រហែលនឹង Rucervu ស្លែងមានសភាពរលោង បណ្តាខ្លែងនៅខាងចុង ស្លែងដុះកោងត្រង់ ទៅខាងលើ ប្រវែងក្បាល-ដងខ្នង ១៨០ ស.ម កំពស់ ១១៥-១២៤ ស.ម ទម្ងន់រហូត ៨១ គ.ក រចនាសម្ព័ន្ធនោះ : ឥណ្ឌា និងនេប៉ាល់ ប្រវែង ៧៥-១០៨ ស.ម	ប្រភេទនៃការជួញដូរ : តួស្លែងទាំងមូលសម្រាប់តាំងលំអរ និងជាវត្ថុផ្សេងៗសម្រាប់ឱសថប្រាណ  ប្រភព : TRAFFIC Southeast Asia
អេលីដ Rucervus (Cervus) eldii - Eld's Deer ចុះក្នុងបញ្ជីឧបសម្ព័ន្ធ I នៃអន្តរជាតិ CITES ក្រហមនៃអង្គការ IUCN កំពុងរងគ្រោះ ថ្នាក់ (EN)  វិជ្ជមានត្រ ១២.៥-១៥ ស.ម ផ្នែកគល់ស្លែងមានបែកខ្លែងពីរ មួយស្រួចដុះត្របលើ ចិញ្ចើម លយទៅមុខមួយទៀតដុះ ឡើងលើកោង ខ្ទប់ខាងលើ ប្រវែងក្បាល-ដងខ្នង : ១៥០-១៧០ ស.ម ប្រវែងកន្ទុយ ២២-៥០ ស.ម កំពស់ ១២០-១៣០ ស.ម ទម្ងន់ ៥៥-១៥០ គ.ក រចនាសម្ព័ន្ធនោះ : កម្ពុជា, ឥណ្ឌា, ឡាវ, ភូមា, ថៃ និងវៀតណាម	សំបារ Cervus unicolor - Sambar Deer ក្រហមនៃអង្គការ IUCN បានចាត់ទុកប្រភេទជា ប្រភេទរងគ្រោះថ្នាក់តិចតួច (VU)  ខ្លែងបះត្រង់ទៅលើ វិជ្ជមានត្រ ៨.៥ ស.ម-២៤ស.ម គន្លឹះស្លែង និងខ្លែងត្រង់ គល់មួយ ប្រើសណ្តាលអាជ្ញា ២ឆ្នាំ នៅចុងស្លែងមាន ខ្លែងមួយប្រើសណ្តាល អាជ្ញា ៣ឆ្នាំ នៅចុង ស្លែងមានបែកខ្លែងពីរ ប្រវែងក្បាល-ដងខ្នង : ១៧០-២៧០ ស.ម ប្រវែងកន្ទុយ ២២-៣៥ ស.ម កំពស់ ១២០-១៥០ ស.ម ទម្ងន់ ១៥០-៣០០ គ.ក រចនាសម្ព័ន្ធនោះ : កម្ពុជា, ចិន, ឥណ្ឌា, ភូមា, ហ្វីលីពីន, ស្រីលង្កា, ថៃ និងវៀតណាម	Cervus timorensis - Javan Deer IUCN: LR  ប្រវែងស្លែង : ៤៥-៥៨ ស.ម តួស្លែងបះ ត្រង់ទៅលើ ប្រវែងក្បាល-ដងខ្នង : ១៣០-២១០ ស.ម ប្រវែងកន្ទុយ ១០-៣០ ស.ម កំពស់ ៨០-១១០ ស.ម ទម្ងន់ ៥០-១១៥ គ.ក រចនាសម្ព័ន្ធនោះ : ឥណ្ឌូនេស៊ី	 ប្រភព : TRAFFIC Southeast Asia

Image Source: Environment Canada

“ សូមអានបន្ថែមអំពីស្ថានភាពអភិរក្សនៅលើទំព័រវេបសាយ www.cites.org និង www.iucnredlist.org

មីនា ២០០៨

Moschus spp. - Musk Deer Spp.

(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ)

(ឈ្មោះប្រើប្រាស់ ក្រុមរួម)

ពពួកក្រមុំសត្វ (Musk Deer spp.)

ឈ្មោះផ្សេងទៀត: Kado gaow (ភាសាភូមា) Musk Deer (ភាសាអង់គ្លេស)

រាយការណ៍នៅ: ប្រទេសអាហ្វហានីស្ថាន ប៊ុយតាន ចិន ឥណ្ឌា កូរ៉េខាងជើង និង ខាងត្បូង ឡាវ ភូមា នេប៉ាល់ ប៉ាគីស្ថាន ម៉ុងហ្គោលី រុស្ស៊ី និងប្រទេសវៀតណាម

លក្ខណៈរូបរាង: ប្រវែងពីក្បាល ទៅដងខ្នង: ៧០-១០០ស.ម កំពស់ស្មា: ៥០-៦១ស.ម ក្បាលប្រវែង ១,៨-៦ស.ម ទំងន់ ៧-១៧គ.ក

ស្ថានភាពរក្សាទុក្រុមរួម:

- ស្ថិតក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ I នៃអនុសញ្ញា ស្តីពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិលើ ប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិ ព្រៃ ដែលកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ (CITES): ប្រើសត្វក្រមុំសត្វមកពីប្រទេសអាហ្វហានីស្ថាន ប៊ុយតាន ឥណ្ឌា ភូមា នេប៉ាល់ និងប៉ាគីស្ថាន ។
- ស្ថិតក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ II ប្រើសត្វក្រមុំសត្វមកពីទីកន្លែងផ្សេងៗ
- ប្រើសត្វក្រមុំសត្វពីរយាររងគ្រោះថ្នាក់ ទៅកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់អាស្រ័យលើ ប្រភេទ (IUCN: EN-LC)

កិច្ចការពារថ្នាំកំប៉ាតិ (កម្ពុជា)

អនុក្រឹត្យលេខ ៥៣អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៦ ស្តីពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម អន្តរជាតិ លើប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិព្រៃ ដែលកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ ។



Credit: WWF-Canon / Gerald S. CUBITT

លក្ខណៈសំគាល់:



Credit: WWF-Canon / Grigori MAZMANIAN

- គ្មានស្បែក
- ត្រភ្នែកខ្ពស់ជាងស្មាប្រហែល៥ស.ម
- ខ្លួនត្របដណ្តប់ដោយរោមរឹងក្រព្យាងដែលគល់រោមពណ៌ស
- សម្បុរ: ប្រែប្រួល ជាទូទៅមានពណ៌ត្នោតចាស់ មានពណ៌ចម្រុះ និងចំណុច អុជជុះ លាយចម្រុះគ្នាដែលមានពណ៌ប្រផេះស្រាលនៅពិសេស និងពណ៌ស ព្រលែតនៅក្រោម
- ចង្ក្រាអាចមានចំណុចអុជពណ៌សនៅលើបំពង់ក ដែលផ្នែកក្នុងត្រចៀកទាំង សងខាង និងខាងក្នុងត្នោតពណ៌ស

ធ្មេញចង្ក្រាខាងលើប្រើសត្វឈ្មោល មានប្រវែងប្រហែល៧.៥ស.ម ចំងង់ប្រើសត្វ



Credit: WWF-Canon / Grigori MAZMANIAN

លក្ខណៈពាណិជ្ជកម្ម:

សារប្រើសត្វឱសថបុរាណ គេលក់ដូរក្រពេញទាំងមូល ឬយកទៅកែច្នៃ (ភាគច្រើន ធ្វើជាប្រេង វត្ថុរាវសំរាប់បាញ់ ថ្នាំឱសថបិទបង់ស៊ីម៉ង់ និងម្សៅសារនៅឆៅ)

ក្រពេញសារ
Credit: TRAFFIC



គំរូកញ្ចប់ថ្នាំប្រើសត្វរួម
Credit: TRAFFIC



ក្រពេញសារ: (The Musk Gland)

- ស្ថិតនៅចន្លោះរវាងរន្ធជិត និងអង្គជាតិប្រើសឈ្មោល ដែលមានអាយុ លើសពី ៣ឆ្នាំ
- នៅមិនឆ្ងាយពីដូរ ក្រពេញសារប្រវែងបណ្តោយពី ៤-៦ស.ម ទទឹង៣.៥-៤.៥ស.ម និងជំរៅ ៤-៥ស.ម
- ក្រពេញសារកាត់យកចេញពីសត្វ និងដាក់ហល់អោយស្ងួត
- សារដែលនៅក្នុងក្រពេញសារទៅជាកកដុតចុះ (មានពណ៌ត្នោតក្រហម និងប្រេងទៅជាខ្លា) និងម្សៅ



ភាសាដែលប្រើជាទូទៅសំរាប់រៀបរាប់ពីពណ៌នាប្រើសត្វក្រមុំសត្វដាក់ នៅលើកញ្ចប់ថ្នាំឱសថបុរាណ

	Musk Deer	Musk
អក្សរចិន	麝香	麝香
Pinyin:	She	Moschus, Cervi
Roman:	She Xiang	Moschus

Felidae - Cats

(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ) (ក្រុមសត្វខ្លា)

ក្រុមសត្វខ្លា (Cats)

លក្ខណៈរូបរាង: ប្រវែងពីក្បាលទៅដងខ្នង: អាចប្រែប្រួល ៣៧-២៨០ស.ម
ប្រវែងកន្ទុយ : ៥,១-១១០ស.ម ទម្ងន់ : ១,៥-៣០៦គ.ក

ស្ថានភាពអភិរក្សវិទ្យាសាស្ត្រ:

ពួកមីសាស៊ីទាំងអស់ (លើកលែងតែស្រូវ) ត្រូវបានចុះបញ្ជី ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ I ឬ II នៃអនុសញ្ញាស្តីពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិលើប្រភេទសត្វនិងរុក្ខជាតិព្រៃដែលកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់(CITES)

កិច្ចការពាររដ្ឋាភិបាល

ក្រុមសត្វខ្លាទាំងអស់ ត្រូវបានការពារដោយច្បាប់ ស្តីពីព្រៃឈើ ឆ្នាំ២០០២ ពួកខ្លាធំ និងខ្លាពពក ស្ថិតក្នុងក្រមប្រភេទជិតផុតបាត់ និងខ្លាដទៃទៀតស្ថិតក្នុងក្រមសត្វកម្រ (ខ្លាត្រី និងឆ្កាដាវ មានដោយបង្ការ) (កម្ពុជា)



ក្រុមសត្វខ្លា (ឆ្កាដាវ)
Credit: WWF-Canon / Alain COMPOST

លក្ខណៈសំគាល់:



ខ្លាឱន
Credit: WWF-Canon / Martin HARVEY

- ក្បាលមានរាងមូលហើយខ្លី
- ដងខ្នង: វែងស្រឡូនមានសាច់ជុំវិញមាំ និងដើមទ្រូងជ្រៅ
- ក្បាលដោះមាន ២-៤
- ជើងមុខមានម្រាម ៥ ជើងក្រោយមានម្រាម ៤ បាតជើងជាសាច់ទន់គ្មានរោម



- អណ្តាត: ប្រើសម្រាប់ជួយខាំហែកចំណី
- ខ្លាធំ ឬខ្លាដបង

ក្រញ៉ា: ប្រើសម្រាប់ខាំហែកចំណី
Credit: Claire Beastall



ក្រញ៉ាដៃឆ្កាត្រូវ
Credit: WWF-Canon / Gerald S. CUBITT

ត្រចៀក: មានមូល ឬស្រូចចុង
ភ្នែក: ប្រសើរភ្នែកមានរាងទ្រវែងបញ្ឈរ




ខ្លាឡើងមាស
Credit: Chris Shepherd / TSEA



ឆ្កាត្រូវ
Credit: WWF-Canon / Roger HOOPER

ផ្លូវលាងក្បាល:



ឆ្អឹងលាងក្បាល (អំបូរមីសាស៊ី)

- មានរាងមូលហើយខ្លី
- មានឆ្មេញពី ២៨-៣០



ឆ្អឹងលាងក្បាលខ្លាធំ ឬខ្លាដបង (រូបជិតច្បាស់)

Credit: Chris Shepherd/TSEA

ឆ្អឹងលាងក្បាល (អំបូរត្រូវ)

- មានរាងទ្រវែង
- មានឆ្មេញ ៤២



ឆ្អឹងលាងក្បាល (ក្រុមសំពោច)

- មានរាងទ្រវែង ហើយសំប៉ែត
- មានឆ្មេញពី ៣២-៤០




ឆ្អឹងលាងក្បាល (អំបូរខ្លាឃ្មុំ)

- មានទំងន់ធ្ងន់
- មានឆ្មេញចំនួន ៤០-៤២ឆ្មេញ



Image Credit: Environment Canada

ឆ្មេញ:



- ឆ្មេញមុខ: រាងតូចៗ និងដុះជាជួរ (ឆ្មេញមុខផ្នែកខាងលើ មាន៣ ឆ្មេញខាងក្រោមមាន៣) សងខាង
- ឆ្មេញមុខ: មានរាងវែងស្រួចកោងបន្តិច (ខាងលើមានឆ្មេញមុខ ១ ខាងក្រោមមានឆ្មេញមុខ១) សងខាង
- ឆ្មេញសំរាប់ទំពារ មានរាងធំ (ខាងលើមានឆ្មេញ ២-៣ ខាងក្រោមមានឆ្មេញ ២) សងខាង
- ឆ្មេញ: ឆ្មេញផ្នែកខាងលើ រាងតូចបន្តិច (ខាងលើមាន ឆ្មេញ១ ខាងក្រោមមាន១) សងខាង

Image Credit: Environment Canada

លក្ខណៈពាណិជ្ជកម្ម:

សត្វរស់ ស្បែក ឆ្អឹង សាច់ ឆ្មេញ ក្រចក ធ្វើជាគ្រឿងផ្សំ សំរាប់ឱសថបុរាណ

Southeast Asian Felidae (2) (Cats) listed in CITES Appendix I (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ)

ក្រុមសត្វមីសាសី (ខ្លា)
ខ្លាឈ្មោឺតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវបានបញ្ជូនបញ្ជីឧបសម្ព័ន្ធ I
របស់អនុសញ្ញា CITES
ក្រុមខ្លាដទៃទៀត ត្រូវបានបញ្ជូនបញ្ជីឧបសម្ព័ន្ធ II
របស់អនុសញ្ញា CITES ដែរ (លើកលែងតែឆ្កែ ឆ្កែក)

កិច្ចព្រមព្រៀងសាកល ៖

កិច្ចការការពារសត្វ លើកកម្ពស់សត្វ ៖

ក្រុមសត្វខ្លាទាំងអស់នៅកម្ពុជាត្រូវបានការពារក្រោមច្បាប់ ស្តីពី ព្រៃឈើ ឆ្នាំ ២០០២ និងអនុក្រឹត្យដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធ ។



ប្រភព: Chris Shepherd/TSEA

ខ្លាដំបង/ខ្លាធំ (*Panthera tigris* - Tiger)



ប្រភព: WWF-Canon / Mike GRIFFITHS

ប្រវែងក្បាល និងដងខ្នង :
 ១៤០-១៨០ ស.ម
 ប្រវែងកន្ទុយ : ៦០-៩៥ ស.ម
 ទម្ងន់ : ១៨០-២៤៥ គីឡូក្រាម



ប្រភព: Julia Ng/TSEA



ខ្លាខិន (*Panthera pardus* - Leopard)



ប្រភព: WWF-Canon / Gerald S. CUBITT

ប្រវែងក្បាល និងដងខ្នង :
 ៩១-១៩១ ស.ម
 ប្រវែងកន្ទុយ : ៤៥-៧៨ ស.ម
 ទម្ងន់ : ៤៥-៦៥ គីឡូក្រាម

ខ្លាខិនដែលមានរោមពណ៌ខ្មៅឃើញ
 មាននៅកន្លែងខ្លះ មានចំណុចអង្កាម
 មើលឃើញ ពេលមាន ពន្លឺថ្ងៃចាំងលើខ្នង



ប្រភព: TSEA



ប្រភព: WWF-Canon / Martin HARVEY

ខ្លាខិនមីកកក (*Uncia uncia* - Snow leopard)



ប្រភព: WWF-Canon / Martin HARVEY

ប្រវែងក្បាល និងដងខ្នង :
 ១០០-១៣០ ស.ម
 ប្រវែងកន្ទុយ : ៨០-១០០ ស.ម
 ទម្ងន់ : ៣០-៥៥ គីឡូក្រាម

មានរោមវែងជាងរោមខ្លាឆ្នាំតំបន់
 អាស៊ីអាគ្នេយ៍ មានស្បែកពោះស្ពើង



ប្រភព: Chris Shepherd/TSEA



ខ្លាពពក (*Neofelis nebulosa* - Clouded Leopard)



ប្រភព: WWF-Canon / Gerald S. CUBITT

ប្រវែងក្បាល និងដងខ្នង :
 ៦១-១០៦ ស.ម
 ប្រវែងកន្ទុយ : ៥៥-៩១ ស.ម
 ទម្ងន់ : ១៥-២៣ គីឡូក្រាម




ប្រភព: Chris Shepherd/TSEA



ប្រភព: WWF-Canon / Gerald S. CUBITT

ខ្លាឈ្លីមាស (*Catopuma temmincki* - Asian Golden Cat)



ប្រភព: WWF-Canon / Gerald S. CUBITT

- ស្បែកមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នា និងអាវរោមសត្វ
- រោមមានពណ៌ប្រផ្នែង ពីលើក្រហមទៅជា ប្រផ្នែង និងខ្មៅ
- ជាទូទៅរោមមានពណ៌ខ្មៅ នៅខាងក្នុង និងពណ៌ ស្រអាប់នៅខាងក្រៅ
- កន្ទុយមានខ្លាញ់នៅខាងលើ និងស្រអាប់នៅក្រោម ឈាមជាមួយចំណុចខ្មៅ

ប្រវែងក្បាល និងដងខ្នង :
 ៧៦-៨៤ ស.ម
 ប្រវែងកន្ទុយ : ៤៣-៥០ ស.ម
 ទម្ងន់ : ១២-១៥ គីឡូក្រាម

ខ្លាភ្លឺថ្មកែវ (*Pardofelis marmorata* - Marbled Cat)



ប្រភព: WWF-Malaysia / Ken SCRIVEN

- មានរោមខ្លីណាស់
- មានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទៅនឹង ខ្លាពពក ប៉ុន្តែស្លាកពណ៌ខ្មៅ តូចជាង និងមានចំណុចអង្កាម ច្រើនជាងនៅលើដង

ប្រវែងក្បាល និងដងខ្នង :
 ៤៥-៥៣ ស.ម
 ប្រវែងកន្ទុយ : ៤៧-៥៥ ស.ម
 ទម្ងន់ : ២-៤ គីឡូក្រាម

ខ្លាត្បាលសំប៉ែត (*Prionailurus planiceps* - Flat-headed Cat)



ប្រភព: Claire Beasall

- ត្រចៀកតូច ក្បាលខាងលើវែង និងរៀងសំប៉ែត
- រោមស្លេចចេញពីក្រហម ខ្លាំង រោមលើក្បាលពណ៌ត្នោត ឈាមប្រផ្នែង និងពណ៌ស្រអាប់ អង្កាម ជាច្រើន

ប្រវែងក្បាល និងដងខ្នង :
 ៤០-៥០ ស.ម
 ប្រវែងកន្ទុយ : ១៣-១៧ ស.ម
 ទម្ងន់ : ១.៥ - ២.២ គីឡូក្រាម

ឆ្កែដាវ (*Prionailurus bengalensis* - Leopard Cat)



ប្រភព: WWF-Malaysia / E.P. Gee

- មានពណ៌ក្រហមទឹកក្រូច ឬលឿងខ្លាំង ជាចំណុចខ្មៅ នៅផ្នែកខាងលើរួមទាំងកន្ទុយ និងមានចំណុច ស ឈាមខ្មៅ នៅផ្នែកខាងក្រោម
- ស្រដៀងគ្នាទៅនឹងខ្លាត្បាល ប៉ុន្តែ មានខ្លាតូចជាងប្រវែងក្បាល និងដងខ្នងខ្លាត្បាល ៧២-៧៨ស.ម

មានប្រវែងក្បាល និងដងខ្នង :
 ៤០-៥៥ ស.ម
 ប្រវែងកន្ទុយ : ២៣-២៩ ស.ម
 និងទម្ងន់ : ៣-៥ គីឡូក្រាម

ចំណាំ : មានតែប្រភេទនៅតំណាង បង្ការសត្វ និងចែប៉ុណ្ណោះ ដែល ចាត់ថ្នាក់ប្រភេទនេះទៅក្នុង ឧប សម្ព័ន្ធ I របស់អនុសញ្ញា CITES ក្រៅពីនេះប្រភេទទាំងឡាយបាន ចាត់ថ្នាក់ទៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ II របស់ អនុសញ្ញា CITES

Felidae (3) - Cat Parts and Derivatives

(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ) (បំណែងសត្វ និងផលិតផលបំប៉នរបស់វា)

ក្រុមមីសាសី (ខ្លា) ផ្នែកនៃសារពាង្គកាយ និងផលិតផល
ដែលគេតែងតែប្រើប្រទេសនៅក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម

ប្រភេទនៃការជួញដូរ : ឆ្កែ, ចង្កូម, ក្រញ៉ាំ, គ្រឿងផ្សំសម្រាប់ផលិតឱសថបុរាណ។
 (ព័ត៌មានលម្អិត ស្តីពីការធ្វើអត្តសញ្ញាណស្បែករបស់ក្រុមសត្វមីសាសីនេះ សូមអានឯកសារ
 សាយគេសុបសម្ព័ន្ធ ។ នៃប្រភេទខ្លា នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ។)

ស្ថានភាពអភិរក្សអន្តរជាតិ^១ : គ្រប់ប្រភេទខ្លាទាំងអស់លើកលែង (ឆ្មាស្រុក) ត្រូវបាន
 ចាត់ថ្នាក់ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ I ឬ II នៃអនុសញ្ញាសាយគេសុបសម្ព័ន្ធ
កិច្ចការការស្របច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា : សំណាក និងសត្វនៅរស់នៃក្រុមមីសាសី
 (ពពួកសត្វខ្លា) ត្រូវបានការពារដោយច្បាប់ ស្តីពី ព្រៃឈើ ឆ្នាំ ២០០២



កូនឆ្មាដាវ
 ប្រភព: WWF-Canon / Alain COMPOST

ឆ្កែ

ឆ្កែក្នុងទម្រង់មូល

ឆ្កែលំដាប់ក្បាលខ្លាធំ

ប្រភព: Chris Shepherd/TSEA

ឆ្កែខ្លាដែលគេរឹបអូសបាន

ប្រភព: Chris Shepherd/TSEA

បាតុភូតសម្រាប់ផលិតឱសថបុរាណ

គួរអក្សរជាភាសាចិនដែលគេតែងប្រើនៅលើកញ្ចប់
 ឱសថបុរាណដែលផ្សំចេញពីឆ្កែខ្លា និងឆ្កែខ្លាខិន

គូអក្សរចិន

Pinyin:

ឆ្កែខ្លា 虎骨 Hu Gu

ឆ្កែខ្លាខិន 豹骨 Bao Gu

គំរូផ្ទាំងកសិកម្មកញ្ចប់ផលិតផលផ្សំពីឆ្កែខ្លាធំ

ប្រភព: TRAFFIC

ចង្កូម

ចង្កូមខ្លាដំពិត

មានស្នាមលក់
 ១ ឬច្រើន

ចង្កូមដែលដុះ
 ចេញមកក្រៅ
 អញ្ចាញធ្មេញ

ចង្កូមខ្លាដំក្លែងក្លាយ

ប្លង់ធ្មេញអាច
 មានស្នាមប្រេះ
 នៅពេលស្ងួត

ផ្នែកដែលស្ថិត
 នៅខាងក្នុង
 អញ្ចាញធ្មេញ

ចង្កូមខ្លាធំ ពិត និង ក្លែងក្លាយ

ប្រភព: Chris Shepherd/TSEA

ចង្កូមដែលគេធ្លាក់ចេញជាប្រភេទដទៃ

ប្រភព: Chris Shepherd/TSEA

ក្បាលខ្លាខាងលើនេះស្បែកពិតប៉ុន្តែគ្រោង
 ធ្មេញក្លែងក្លាយគ្រោងធ្មេញពិតត្រូវបាន
 ដាក់ដោយឡែក

ប្រភព: Chris Shepherd/TSEA

ក្រញ៉ាំ

- រាងស្ទើរពាក់កណ្តាលរង្វង

- មិនថ្លា (ល្អក់)

- ពណ៌លឿងព្រលែត

- នៅគល់ក្រញ៉ាំមានរាងរាបស្មើ

នៅគល់ក្រញ៉ាំមានរាងរាបស្មើ

ប្រភព: USFWS Photo

អន្តរជាតិ (ស៊ីន)

អន្តរជាតិខ្លាធំសម្រាប់ផលិតឱសថ ប្រសិនបើ

១- នៅលើក្រញ៉ាំអន្តរជាតិមានរោមរឹង ដែលអាចមើលឃើញច្បាស់

២- មានឆ្អឹងស្រស់មួយដែលអាចមើលឃើញនៅពេលដាក់ម៉ាស៊ីន X-Ray

៣- មានប្រវែងវែងជាង ២០ ស.ម

អន្តរជាតិខ្លាធំ

ប្រភព: C. Beasall

អន្តរជាតិខ្លាធំពិតត្រូវបានដាក់
 មានរោមរឹង ដែល
 ពិតប្រាកដមើលឃើញ

អន្តរជាតិរបស់សត្វខ្លាខិន
 ដែលមើលឃើញបានសម្រាប់

ប្រភព: Chris Shepherd/TSEA

ស៊ីនខ្លាខ្លា

ប្រភព: Leong/TSEA

Southeast Asian Otters

(ប្រភេទតេឡាវ៉ាស៊ីអាគ្នេយ៍)

តេឡាវ៉ាស៊ីអាគ្នេយ៍ Southeast Asian Otters

ឈ្មោះផ្សេងទៀត : Memerang (ម៉ាមេរ៉ាង)

លក្ខណៈរូបរាង : ពណ៌ត្នោត ពណ៌ព្រៃលេចជាងត្រង់បំពង់ក រោមក្រាស់ រាងតូចវែង ម្រាមជ្រាប កន្ទុយវែង ហើយមាំ។ ភេទអាស៊ីអាគ្នេយ៍

- ក្បាល និងដងខ្លួនប្រវែង៣៦ - ៨០សម
- កន្ទុយប្រវែង ២២,៥ - ៤៨សម

លក្ខណៈសំគាល់ :

ភេទតូច *Aonyx cinerea*
Asian Small-clawed Otter

អនុសញ្ញា **CITES** ឧបសម្ព័ន្ធ II

បញ្ជីក្រហម **IUCN** : ជាប្រភេទងាយរងគ្រោះថ្នាក់ (VU)

ក្បាល និងដងខ្លួនប្រវែង ៣៦ - ៥៥សម
កន្ទុយប្រវែង ២៥ - ៣៥សម

- ខ្លួនតូច
- ពណ៌ត្នោតចាស់ ទៅពណ៌ត្នោតប្រផេះ
- បំពង់ក និងចំហៀងកពណ៌ព្រៃលេច
- ក្រព្យាជើងតូច មិនលូតឆ្ងាយពីម្រាមជើង



Credit: Gerald S CUTBITT/WWF-Canon

រាយការណ៍ : ទីបំបាំង - នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ : ប្រទេសប្រ៊ុយណេ កម្ពុជា ឥណ្ឌូនេស៊ី ឡាវ ម៉ាឡេស៊ី ភូមា ហ្វីលីពីន សាំងហ្គាពួរ ថៃ និងវៀតណាម

ភេក្បាលសំប៉ែត *Lutra lutra*
Eurasian Otter

អនុសញ្ញា **CITES** ឧបសម្ព័ន្ធ II

បញ្ជីក្រហម **IUCN** : ជិតទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ (NT)

ក្បាល និងដងខ្លួនប្រវែង ៥៥ - ៧២សម
កន្ទុយប្រវែង ៣៧,៥ - ៤៨សម

- នៅចន្លោះរោមនៅលើមុខ និងច្រមុះមាន រោមរាងអក្សរ " W "
- រោមខ្លី និងពណ៌ព្រៃលេចជាងធ្វើអោយវា មានពណ៌ប្រផេះ
- ភេទខ្លួនរលោង



Credit: Sanchez & Lopez/WWF-Canon

រាយការណ៍ : ទីបំបាំង និងអាស៊ី។

នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ : ប្រទេសកម្ពុជា ឥណ្ឌូនេស៊ី ឡាវ ភូមា ថៃ និងវៀតណាម

ស្ថានភាពអភិរក្សអន្តរជាតិ :

ប្រភេទទាំងអស់ក្នុងស្ថាន *Lutrinae* spp ។ ចុះក្នុងបញ្ជី អនុសញ្ញា **CITES** ឧបសម្ព័ន្ធ II លើកលែងតែ ភេក្បាលសំប៉ែត ដែលបានចុះក្នុងបញ្ជី អនុសញ្ញា **CITES** ឧបសម្ព័ន្ធ I

កិច្ចការពារថ្នាក់ជាតិ :

Lutra lutra : ច្បាប់ព្រៃលើ ឆ្នាំ ២០០២ (ចុះបញ្ជីក្នុង ក្រមប្រភេទកម្រ)

Lutra sumatrana : ច្បាប់ព្រៃលើ ឆ្នាំ ២០០២ (ចុះបញ្ជី ក្នុងក្រមប្រភេទកម្រ)

Lutra perspicillata : អនុក្រឹត្យលេខ៥៣ ន ក្រ ប ក (ថ្ងៃទី ២៩ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០០៦)

ស្តីពីពាណិជ្ជកម្ម អន្តរជាតិលើ ប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិព្រៃរងគ្រោះថ្នាក់

ភេរោមច្រមុះ *Lutra sumatrana*
Hairy-nosed Otter

អនុសញ្ញា **CITES** ឧបសម្ព័ន្ធ II

បញ្ជីក្រហម **IUCN** : ជាប្រភេទជិតផុតពូជ (EN)

ក្បាល និងដងខ្លួនប្រវែង ៥០-៨០សម
កន្ទុយប្រវែង ៣៧-៥០សម

- ផ្នែកខាងលើ រួមមានចំហៀងកពណ៌ ត្នោតចាស់
- ស្មាមអុជៗ មិនប៉ុនគ្នានៅលើចង្កា និងបំពង់ក។
- កន្ទុយមូល ពេលកាត់ទទឹង
- ចុងច្រមុះមានរោម



Credit: Annette Olsson/CI Cambodia

រាយការណ៍ : ប្រទេសកម្ពុជា ម៉ាឡេស៊ី ថៃ និងវៀតណាម

ភេទខ្លួនរលោង *Lutra perspicillata*
Smooth-coated Otter

អនុសញ្ញា **CITES** ឧបសម្ព័ន្ធ II

បញ្ជីក្រហម **IUCN** : ជាប្រភេទងាយរងគ្រោះថ្នាក់ (VU)

ក្បាល និងដងខ្លួនប្រវែង ៦៥-៧៥សម
កន្ទុយប្រវែង ៤០-៤៥សម

- រោមរលោង ហើយខ្លី
- បំពង់ក និងចំហៀងកពណ៌ព្រៃលេច
- មានផ្ទាំងត្រង់ចន្លោះរោមលើមុខ និងច្រមុះដែលគ្មានរោម
- កន្ទុយសំប៉ែតពេលកាត់ទទឹង



Credit: Claire Beasall

រាយការណ៍ : បង់ក្តាដែស ប៊ូតាន ប្រ៊ុយណេ ដាវូសាឡីម កម្ពុជា ចិន ឥណ្ឌា ឥណ្ឌូនេស៊ី អ៊ីរ៉ាក់ ឡាវ ម៉ាឡេស៊ី ភូមា នេប៉ាល់ ថៃ និងវៀតណាម



Lutra perspicillata (Smooth Otter)

Credit: Claire Beasall

ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម :

ស្បែកសត្វរស់សម្រាប់យកធ្វើសត្វចិញ្ចឹម



ស្បែកភេ - រូបខាងស្តាំ : ភេរោមច្រមុះ (*Lutra sumatrana*)
ខាងឆ្វេង : ភេខ្លួនរលោង (*Lutra perspicillata*)

Credit: Annette Olsson/CI Cambodia

ស្រដៀងទៅនឹង:

***Cynogale benettii* - Otter Civet**

អនុសញ្ញា **CITES** ឧបសម្ព័ន្ធ II

បញ្ជីក្រហម **IUCN** : ជាប្រភេទជិតផុតពូជ

- ពណ៌ត្នោតចាស់ទាំងអស់
- កន្ទុយខ្លី
- អុជពណ៌ព្រៃលេចតិចៗ នៅលើភ្នែកនីមួយៗ



Credit: WWF_PHKA_VATech

រោមតំពណ៌ស ពុកមាត់ពណ៌ស្លឹកវែង

ក្បាល និងដងខ្លួនប្រវែង ៥៧,៥ - ៦៨សម
កន្ទុយប្រវែង ១២ - ២០,៥សម

រាយការណ៍ : ប្រទេសប្រ៊ុយណេ ឥណ្ឌូនេស៊ី ម៉ាឡេស៊ី និងថៃ។

វត្តមានមិនពិតប្រាកដនៅប្រទេសចិន សាំងហ្គាពួរ និងវៀតណាម

Helarctos malayanus - Sun Bear (ខ្លាឃ្មុំតូច)


ខ្លាឃ្មុំតូច (Sun Bear)

ឈ្មោះម្យ៉ាងទៀត: Malay weh wan (ភាសាកម្ពុជា) Sun Bear (ភាសាអង់គ្លេស)


របាយរស់នៅ: បង្ការដៃស ប្រិយណេ កម្ពុជា ចិន ឥណ្ឌា ឥណ្ឌូនេស៊ី (សូម៉ាត្រា និងកាលីម៉ាន់តាន់) ឡាវ ម៉ាឡេស៊ី ភូមា និងថៃ។

លក្ខណៈរូបរាង: ប្រវែងក្បាលទៅដងខ្នង: ១០០-១៤០ស.ម ប្រវែងកន្ទុយ ៣-៧ស.ម ។

លក្ខណៈសំគាល់:



លក្ខណៈស្រដៀងទេវនីម្ខាងៗ: ខ្លាឃ្មុំធំ (Asiatic Black Bear) អនុសញ្ញា CITES ឧបសម្ព័ន្ធ I



ស្ថានភាពអភិរក្សអន្តរជាតិ:

- ចុះក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ I នៃអនុញ្ញា ស្តីពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ លើសត្វ និងរុក្ខជាតិព្រៃ ដែលកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ (CITES)
- ប្រភេទងាយរងគ្រោះថ្នាក់ (IUCN:VU)

កិច្ចការពាររដ្ឋាភិបាល:

ខ្លាឃ្មុំតូចជាប្រភេទសត្វក្នុងក្រុមដែលកម្រ និងខ្លាឃ្មុំធំជាប្រភេទសត្វក្នុងក្រុម ជិតផុតពូជ ការពារដោយច្បាប់ ស្តីពីព្រៃឈើ ឆ្នាំ២០០២។ (កម្ពុជា)



Credit: Gabriella Fredriksson

លក្ខណៈពាណិជ្ជកម្ម:

សត្វរស់ សំណាកសត្វ សាច់ ក្រញ៉ាជើង ប្រអប់ជើង ធ្មេញ ស្បែក ថង់ប្រមាត់ ប្រមាត់ ត្រូវបានគេយកទៅផ្សព្វផ្សាយនៅតាមទីផ្សារ ។



Ursus thibetanus - Asiatic Black Bear

(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ) (ខ្មែរឃ្មុំ)


ខ្មែរឃ្មុំ (Asiatic Black Bear)

ឈ្មោះម្យ៉ាងទៀត: Web wan gyi (ភាសាភូមា) Asiatic Black Bear (ភាសាអង់គ្លេស)

របាយរស់នៅ: អាហ្គានីស្ថាន បង់ក្លាដែស ប៊ុយតាន កម្ពុជា ចិន ឥណ្ឌា អេរីង ជប៉ុន កូរ៉េ ឡាវ ភូមា នេប៉ាល់ ប៉ាគីស្ថាន រុស្ស៊ី តៃវ៉ាន់ ថៃ និងវៀតណាម


លក្ខណៈរូបរាង: ប្រវែងពីក្បាលទៅដងខ្នង: ១២០-១៥០ស.ម ប្រវែងកន្ទុយ : ៦-១០ស.ម

លក្ខណៈសំគាល់:



លក្ខណៈស្រដៀងទេវតា:

ខ្មែរឃ្មុំតូចក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ I អនុសញ្ញាសាយតេស



ស្ថានភាពអភិរក្សវិទ្យាសាស្ត្រ:

- ស្ថិតក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ I នៃអនុសញ្ញា ស្តីពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ លើប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិព្រៃ ដែលកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ (CITES)
- ជាប្រភេទរងគ្រោះថ្នាក់ IUCN: VU (ចំពោះអនុប្រភេទរងគ្រោះជិតផុតពូជ ដែលគេប្រទះ ឃើញនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ និងប៉ាគីស្ថាន)

កិច្ចការពាររដ្ឋាភិបាល:

ខ្មែរឃ្មុំស្ថិតក្នុងក្រុមប្រភេទជិតផុតពូជ និងត្រូវបានការពារដោយច្បាប់ ស្តីពីព្រៃឈើ ឆ្នាំ ២០០២ ។



Credit: Claire Beasall

លក្ខណៈអាវិវត្តន៍: សត្វរស់ សាច់ ក្រញាំជើង ប្រអប់ជើង ធ្មេញ ស្បែក ថង់ប្រមាត់ និងប្រមាត់



ប្រអប់ជើង និងថង់ប្រមាត់ខ្មែរឃ្មុំ
Credit: Chris Shepherd / TSEA



ប្រអប់ជើងខ្មែរឃ្មុំ និងផ្នែកផ្សេងៗនៃរាងកាយរបស់ដែលគេចាប់ផ្តើមប្រេង
Credit: Chris Shepherd / TSEA



ថង់ប្រមាត់ខ្មែរឃ្មុំ
Credit: Chris Shepherd / TSEA



ការវះកាត់ថង់ប្រមាត់ខ្មែរឃ្មុំ
Credit: Chris Shepherd / TSEA

ឈ្មោះជាទូទៅដែលគេប្រើរៀបរាប់ ពិពណ៌នាប្រមាត់ខ្មែរឃ្មុំ

អក្សរចិន 熊胆

Pinyin: Xiong Dan

Hemigalus derbyanus - Banded Palm Civet & Chrotogale owstoni - Owston's Civet

សំពោចបង្កង់ Banded Palm Civet

- ឈ្មោះផ្សេងទៀត :** Musang belang (ម៉ាឡេស៊ី)
- របាយ :** ប្រទេសប្រ៊ុយណេ (?) ឥណ្ឌូនេស៊ី (កាស៊ីម៉ាន់តាន់ និងស៊ូម៉ាត្រា) ម៉ាឡេស៊ី ភូមា និងថៃ
- លក្ខណៈរូបរាង :** ក្បាល និងដងខ្លួនប្រវែង ៤៥-៥៥សម ។ កន្ទុយប្រវែង២៥-៣៦សម

កំពិចដូង Owston's Civet

- ឈ្មោះផ្សេងទៀត :** Cay van (វៀតណាម)
- របាយ :** ប្រទេសកម្ពុជា (?) ចិន ឡាវ និងវៀតណាម
- លក្ខណៈរូបរាង :** ក្បាល និងដងខ្លួនប្រវែង ៥១-៦៣សម ។ កន្ទុយប្រវែង៣៨-៤៨សម

កិច្ចការពារថ្នាក់ជាតិ :

Hemigalus derbyanus: អនុក្រឹត្យលេខ៥៣ ន ក្រ ប ក (ថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៦) ស្តីពីពាណិជ្ជកម្ម អន្តរជាតិលើប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិព្រៃរងគ្រោះថ្នាក់

Chrotogale owstoni: (សរសេរជា *Hemigalus owstoni*) ច្បាប់ព្រៃឈើ ឆ្នាំ ២០០២ (ចុះបញ្ជីក្នុងក្រមប្រភេទសត្វពាណិជ្ជកម្ម)

លក្ខណៈសំគាល់ :

- សំពោចបង្កង់ - *Banded Palm Civet*
- អនុសញ្ញា CITES ឧបសម្ព័ន្ធ II**
- បញ្ជីក្រហម **IUCN**: ជាប្រភេទងាយរងគ្រោះថ្នាក់ (VU)
- ដងខ្លួនជាទូទៅពណ៌ត្នោតត្រលែត ទៅពណ៌ត្នោតមាស ខាងក្រោមពណ៌ត្រលែតជាង
 - មានឆ្នុតវែងៗពណ៌ត្នោតចាស់ ឬពណ៌ខ្មៅនៅលើខ្នង
 - ឆ្នុតបណ្តោយខ្នង ពណ៌ក្រមៅលើ ក និងមុខ ។
 - កន្ទុយ ភាគច្រើនពណ៌ត្នោតក្រមៅ បង្កង់តូចវែងមានតែនៅចុងកន្ទុយ ។



Credit: Chan Ah Lak

កំពិចដូង Owston's Palm Civet

- មិនចុះក្នុងបញ្ជី អនុសញ្ញា **CITES**
- បញ្ជីក្រហម **IUCN** : ជាប្រភេទងាយរងគ្រោះថ្នាក់ (VU)
- ដងខ្លួនមានពណ៌ប្រែប្រួលពី ប្រផេះ-ស ទៅពណ៌ត្នោត រាងត្រលែតនៅខាងក្រោម
 - បង្កង់ខ្មៅពណ៌ខ្មៅកាត់ទទឹងខ្លួន
 - ឆ្នុតនៅលើក និងមុខ
 - ពណ៌ប្រែប្រួលតាមសត្វនីមួយៗ
 - គល់កន្ទុយមានឆ្នុត ពណ៌ខ្មៅនៅខាងចុង



ស្នាមអុជពណ៌ក្រមៅនៅចំ ហៀងក និងជើង ។

Credit: Scott Robertson

ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម :

ជួញដូររោម និងតុក្កតាជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍



Credit: Barney Long/FFI Vietnam

Prionodon pardicolor - Spotted Linsang & Prionodon linsang - Banded Linsang

កំពិលដូងរុស្សី Spotted Linsang

ឈ្មោះផ្សេងទៀត : Càyl gám (វៀតណាម)
របាយ : ប្រទេសកម្ពុជា ចិន ឥណ្ឌា ឡាវ ភូមា នេប៉ាល់ ថៃ និងវៀតណាម
លក្ខណៈរូបរាង : ក្បាល និងដងខ្លួនមានប្រវែង ៣៥-៣៧សម កន្ទុយមានប្រវែង ៣១-៣៤សម

កំពិលដូងបង្កង Banded Linsang

ឈ្មោះផ្សេងទៀត : Linsang (ម៉ាឡេស៊ី)
របាយ : ប្រទេសប្រ៊ុយណេ ឥណ្ឌូនេស៊ី ម៉ាឡេស៊ី ភូមា និងថៃ
លក្ខណៈរូបរាង : ក្បាល និងដងខ្លួនមានប្រវែង ៣៥-៤៥សម កន្ទុយមានប្រវែង ៣០-៤២សម

កិច្ចការពារថ្នាក់ជាតិ :

Prionodon pardicolor: ច្បាប់ព្រៃឈើ ឆ្នាំ២០០២
 (ចុះបញ្ជីក្នុងក្រមប្រភេទកម្រ)
Prionodon linsang: អនុក្រឹត្យលេខ៥៣ ន ក្រ
 ប ក (ថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៦)
 ស្តីពីពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិលើ ប្រភេទសត្វ
 និងរុក្ខជាតិព្រៃរងគ្រោះថ្នាក់

ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម :
 សម្រាប់យកមេរោម និងប្រើជាតុក្កតាសត្វ
 សម្រាប់លក់ជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍

លក្ខណៈសំគាល់ :

កំពិលដូងរុស្សី *Prionodon pardicolor* - Spotted Linsang

អនុសញ្ញា CITES ឧបសម្ព័ន្ធ I
បញ្ជីក្រហម IUCN : ជាប្រភេទរងគ្រោះថ្នាក់តិចតួច (LC)

- ពណ៌ស ទៅពណ៌ត្នោតខ្ចី ដល់ពណ៌លឿង
- ស្នាមអុជខ្មៅរាយប៉ាយលើខ្នង និងចំហៀងខ្លួន
- ឆ្មុតខ្មៅនៅចំហៀងក
- ស្នាមអុជទំនងជាដាច់ៗពីគ្នា



Credit: Barney Long/WWF

ឆ្មុតពណ៌ក្រមៅ
ចំនួន៨ ឬ៩ ព័ទ្ធជុំវិញកន្ទុយ

ស្នាមអុជនៅលើខ្នង
និងចំហៀងខ្លួន

កំពិលដូងបង្កង *Prionodon linsang* - Banded Linsang

អនុសញ្ញា CITES ឧបសម្ព័ន្ធ II
បញ្ជីក្រហម IUCN : ជាប្រភេទរងគ្រោះថ្នាក់តិចតួច (LC)

- ពណ៌ស ទៅពណ៌មាស ឬពណ៌ត្នោត
- ខ្លួនមានស្នាមអុជធំៗ ពណ៌ត្នោតចាស់ ដែលបង្កើតបានជាឆ្មុតពណ៌ក្រមៅ៥ កាត់ទទឹងខ្លួន ផ្នែកខាងលើ និងឆ្មុតតូចៗវែងតាមបណ្តោយចំហៀងក ។
- មានឆ្មុតចំនួន៧ ពណ៌ខ្មៅ និងព្រលែតជុំវិញកន្ទុយ



Credit: Sergio Baffoni

ស្នាមអុជធំៗ ដែលលេច
ចេញជាឆ្មុត វែងខ្លះចំនួន៥

ឆ្មុតវែងខ្លះចំនួន៧
នៅជុំវិញកន្ទុយ

Arctictis binturong - Binturong

ឈ្មោះប្លែង ឬ សំពៅឆ្កៀរ Binturong

ឈ្មោះផ្សេងទៀត : Bear Cat (អង់គ្លេស)

របាយ : ប្រទេសបង់ក្លាដែស ប៊ូតាន ប្រ៊ុយណេ កម្ពុជា ចិន ឥណ្ឌា ឥណ្ឌូនេស៊ី ឡាវ ម៉ាឡេស៊ី ភូមា នេប៉ាល់ ហ្វីលីពីន ថៃ និង វៀតណាម

លក្ខណៈរូបរាង : ក្បាល និងដងខ្លួនប្រវែង ៦៥ - ៩៥សមៈ កន្ទុយប្រវែង៥០ - ៨០សមៈ ទម្ងន់ ៦ - ៩គីឡូ

ស្ថានភាពអភិរក្សអន្តរជាតិ : ។

ចុះក្នុងអនុសញ្ញា CITES ឧបសម្ព័ន្ធ III ដោយប្រទេសឥណ្ឌា

បញ្ជីក្រហម IUCN : ងាយទទួលបានគ្រោះថ្នាក់ (VU)

កិច្ចការពារថ្នាក់ជាតិ :

ច្បាប់ព្រៃឈើ ឆ្នាំ២០០២ (ចុះបញ្ជីក្នុងក្រុមប្រភេទសត្វល្អិត)



Credit: David Lawson/WWF-Canon

លក្ខណៈសំគាល់ :

- រោមរឹងវែងពណ៌ខ្មៅ មានរោមពណ៌ស ឬ ក្រហមខ្លះៗ
- ភាគច្រើនរោមនៅក្បាលមានលក្ខណៈភ្លឺជាង ធ្វើអោយក្បាលភ្លឺជាងដងខ្លួន



Credit: Claire Beasall

កន្ទុយខ្លីចូលក្នុង (អាច ចាប់យកវត្ថុនានាបាន) កន្ទុយវែងមានរោមយ៉ាង ក្រាស់ពិសេសនៅក្បែរគល់



Credit: Claire Beasall

ត្រចៀករាងមូល តែម្លឹកត្រចៀក ពណ៌ស និងមានរោមក្រាស់នៅចុង ត្រចៀក

ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម :

ជាស្បែក និងសត្វរស់ ជាកូនសត្វតូចៗ សម្រាប់សត្វ ចិញ្ចឹម



Credit: TRAFFIC Southeast Asia

Rhinocerotidae spp. – Rhinoceros spp.

(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ) (ក្រុមសត្វរមាស)

វិទ្យាសត្វរមាស


ឈ្មោះផ្សេងៗទៀត : Badak (ភាសាម៉ាឡេស៊ី)

ឈ្មោះសំនៀង : មាសរមាស ៣ ប្រភេទដែលរស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ី


- ប្រភេទ *Dicerorhinus sumatrensis* – Sumatran Rhinoceros ប្រភេទឥណ្ឌូនេស៊ី (កោះកាលីម៉ាន់តាន់ និងស៊ូមាត្រា) ថៃ និងម៉ាឡេស៊ី
- ប្រភេទ *Rhinoceros sondaicus* – Javan Rhinoceros ប្រភេទឥណ្ឌូនេស៊ី (កោះជាវ៉ា) ម៉ាឡេស៊ីប្រហែលផុតពូជ ប្រភេទវៀតណាម
- ប្រភេទ *Rhinoceros unicornis* – Indian/One-horned ប្រភេទស៊ីប៊ុយតាន់ នេប៉ាល់ និងឥណ្ឌា និងមានពីរប្រភេទទៀតដែលរស់នៅក្នុងអាហ្វ្រិក
- ប្រភេទ *Diceros bicornis* និង *Ceratotherium simum* – White Rhinoceros រមាសស

គំនិតគាត់ : កំពស់ត្រឹមស្នា ១០០-១៨០ សម, ទម្ងន់ : ០.៦-២.៧ តោន


លក្ខណៈសម្គាល់ : បើមើលពីក្រៅវាមិនដូចគ្នាទៅនឹងសត្វដទៃទៀតឡើយ



Dicerorhinus sumatrensis - ប្រភេទ កំពស់ស្នា ១០០-១៥០សម, ទម្ងន់ ០.៦-០.៩៥តោន, ក្មួយពីរ : ក្មួយមុខ ២៥-៧៩ សម, ក្មួយទីពីរតែងតែខ្លីជាងក្រោយ ១០ សម



Rhinoceros sondaicus - ប្រភេទ កំពស់ត្រឹមស្នា : ១៥០-១៧០ សម, ទម្ងន់ ០.៩-២.៣ តោន, ក្មួយមួយ : ២៥ ស.ម សត្វឈ្មោស, សត្វញីមានក្មួយតូច ឬគ្មានក្មួយទេ



Rhinoceros unicornis - ប្រភេទរមាសក្មួយមួយឥណ្ឌា : កំពស់ស្នា ១៧៥-២០០ សម, ទម្ងន់ : ១.៨-២.៧ តោន, ក្មួយតែមួយ : ២០-៦១ ស.ម

កិច្ចអភិរក្សវិទ្យាសាស្ត្រ :

ស្ថិតនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ ១ នៃអនុសញ្ញា សាយតេស (១) *Dicerorhinus sumatrensis* (២) *Rhinoceros sondaicus* (៣) *Diceros bicornis* (៤) *Rhinoceros unicornis* ចំនួនសត្វរមាស (៥) *Ceratotherium simum* នៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូង និងប្រភេទស្លាបប្រឡូនត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ ១ សាយតេស

ស្បៀវភៅអង្គការ IUCN ប្រភេទ (១) (២) (៣) ជាប្រភេទសត្វរងគ្រោះថ្នាក់ឈានទៅរកការវិនាសផុតពីជំនុំផុត (CR) ។ ប្រភេទ (៤) (៥) ជាប្រភេទរងគ្រោះថ្នាក់ជិតផុតពីជំនុំផុត (NT) (ចំនួនសត្វរមាសនៅភាគខាងជើងនៃប្រភេទ *Ceratotherium simum simum*) ជាប្រភេទជិតផុតពីជំនុំផុត (CR) ។

កិច្ចការការពារសត្វរមាសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានការពារដោយច្បាប់ស្តីពីរំលោភបំពាន ២០០២

លក្ខណៈពាណិជ្ជកម្ម : កុយ, ស្បែក និងវត្ថុដែលបានពីការបរិច្ចាគត្រូវបានគេយកទៅជួញដូរ

ចំណាំ : ពាណិជ្ជករតែងតែចូលទិញកុយដែលមានជាប់ស្បែក ដើម្បីបញ្ជាក់ថា ជាសត្វរមាសពិតប្រាកដ កុយរមាសអាចផលិតជាការ៉ែស (ដូចគ្នាគឺរោម និងក្រចក) ស្បែករមាសអាចមានកំរាស់ដល់ ៥ ស.ម

តួអក្សរចិនដែលមានសរសេរលើកញ្ចប់ ថ្នាំប្រឆាំងជំងឺដែលផ្សំចេញពីកុយរមាស

កុយរមាស

តួអក្សរចិន

犀牛角

犀角



ប្រអប់ជើងកុយរមាស
Credit: Environment Canada



កុយរមាស សូមសំគាល់ត្រង់កន្លែងស៊ីកិរិចរិលរបស់កុយ
Credit: WWF-Canon / Martin HARVEY



Dicerorhinus sumatrensis
Credit: Claire Beastall



Confiscated Rhinoceros Horn
Credit: WWF-Canon / Mark ATKINSON



កុយរមាសដែលប្រើជាដង និងស្រោមកាបតរបស់ជនជាតិយេម៉េន
Credit: WWF-Canon / Esmond Bradley MARTIN

Manis spp. - Pangolin spp. (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ) (សត្វល្អិត)

ពង្សាវតារ (Pangolin)

ឈ្មោះផ្សេងៗទៀត: Thing kway jut (ភាសាកម្ពុជា) និង Tê Tê (ភាសាវៀតណាម)

របាយការណ៍: នៅតំបន់អាហ្វ្រិក និងអាស៊ី

លក្ខណៈរូបរាង: ប្រវែងក្បាលទៅដងខ្លួន: ៤២៥-៥៥០ម.ម ប្រវែងកន្ទុយ: ១៦០-៤៧០ម.ម ទំងន់: ៥-៧គ.ក ក

លក្ខណៈសំគាល់:



Credit: WWF-Malaysia / Stephen Hogg

តួខ្លួនផ្ទៃក្រៅមានស្រទាប់ស្រក់ដោយស្រក់ដុះត្រួតគ្នា



Credit: Chris Shepherd / TSEA

កន្ទុយច្រើនជាងចំណី

គ្មានឆ្មេញ

ក្បាលមានរាងជាសាជីជ្រុង

លក្ខណៈស្រដៀងគ្នា: មិនមានស្រដៀងទៅនឹងក្រុមសត្វណាឡើយ ។ ពង្សាវតារ ៨ប្រភេទ ហើយ៤ប្រភេទ ត្រូវបានគេរកឃើញនៅអាហ្វ្រិក និង១ប្រភេទ រកឃើញនៅអាស៊ីខាងត្បូង ។ ចំណែកនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍មាន ២ប្រភេទដើមកំណើត ពាហ្វ្រិក ។ **ចំណាំ:** ពិបាកបែងចែកពង្សាវតារដាច់ស្រឡះគ្នារវាង *Manis javanica* និងពង្សាវតារ *Manis culionensis* ។

ពង្សាវតារ (Manis pentadactyla)

- ក្រព្វាជើងក្រោយតិចជាងក្រព្វាជើងមុខដល់ទៅ២ដង
 - នៅតាមជាយកន្ទុយមានស្រក់ប្រហែល ២០ ឬតិចជាងនេះ
- របាយការណ៍:** កម្ពុជា ចិន ហុងកុង ឥណ្ឌូ ឡាវ ភូមា នេប៉ាល់ តៃវ៉ាន់ វៀតណាម និងថៃ

ពង្សាវតារ Manis javanica និងពង្សាវតារ Manis culionensis*

- ក្រព្វាជើងក្រោយច្រើនជាងក្រព្វាជើងមុខដល់២ដង
- នៅតាមជាយកន្ទុយមានស្រក់ប្រហែល ២០

របាយការណ៍: ប្រ៊ុយណេ កម្ពុជា ឥណ្ឌូនេស៊ី ឡាវ ម៉ាឡេស៊ី ភូមា សិង្ហបុរី វៀតណាម និងថៃ

របាយការណ៍: ប៉ាឡាវ៉ាន់ និងកោះតូលេស្យែន ប្រទេស ហ្វីលីពីន

ស្ថានភាពអភិរក្សសត្វជាតិ:

- ស្ថិតក្នុងបឋមប្រភេទ II នៃអនុសញ្ញា ស្តីពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិលើ ប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិព្រៃ ដែលកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ (CITES) មានក្នុងតារាងស្បៀង: ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ លើសត្វពង្សាវតារត្រូវហាមឃាត់ ។

- ស្បៀងនៅក្របខណ្ឌអង្គការ IUCN ជាប្រភេទកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ជិតផុតពូជ (EN)

កិច្ចការការពារសត្វជាតិ:

- ពង្រួលស្ថិតក្នុងក្រុមប្រភេទដែលកម្រ និងការពារដោយច្បាប់ ស្តីពីព្រៃឈើឆ្នាំ ២០០២ ។



Credit: Chris Shepherd / TSEA

លក្ខណៈអាវិច្ឆកម្ម: ជាទូទៅគេដឹកជញ្ជូនសត្វរស់ ហើយនិងក៏ឃើញផងដែរនូវការត្រាស់តាមទាំងមូល ស្រកា ស្បែក កូនក្នុងផ្ទៃសាច់ និងថ្នាំ ។



សត្វពង្សាវតារដែលគេកំពុងរត់ចង្អុលកាត់
Credit: Royal Thai Police



គេកំពុងបកស្រកាពីស្បែកពង្សាវតារ
Credit: TRAFFIC SEA



ស្រកាសត្វពង្សាវតារ
Credit: Julia Ng / TSEA



ពង្សាវតារក្នុងផ្ទៃ
Credit: Chris Shepherd / TSEA



ការប្រើប្រាស់ស្បែកសត្វពង្សាវតារ
Credit: Chris Shepherd / TSEA



ការប្រើប្រាស់ស្បែកសត្វពង្សាវតារ
Credit: Chris Shepherd / TSEA

Primates – Apes and Monkeys

ក្រុមស្វា ឬពាឡ

កិច្ចអភិរក្សជាសកល ៖

គ្រូបប្រភេទសត្វរំលោភ យ៉ាងហោចណាស់មានចុះក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ II របស់អនុសញ្ញា CITES

សូមមើលរូបភាពខាងក្រោម ចំពោះពួកស្វា ឬពាឡក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដែលបានចុះក្នុងបញ្ជី ឧបសម្ព័ន្ធសាយតេស I

លក្ខណៈសម្គាល់ ៖

- គ្រូបប្រភេទស្វាមាន ៖
- ភ្នែកប្រឈមមុខ ឆ្អឹង ១ គូ
 - ច្រមុះខ្លី មុខរាងសំប៉ែត
 - ក្រចកជំនួសក្រញាំស្រួច
 - មានជើងនិងដៃបួន



រឿ (Nycticebus coucang)
ប្រភព: Claire Beastall



ស្វាព្រាម (Trachypithecus cristatus)
ប្រភព: Claire Beastall



ស្វាអង្កត់ (Macaca nemestrina)
ប្រភព: WWF Malaysia / Chew Yen Fook



ទោចផ្កាល់ឈ្លើង (Nomascus gabriellae)
ប្រភព: Claire Beastall



កូនស្វាអ៊ូរ៉ាំងអ៊ូតាំង (Pongo abelii)
ប្រភព: Chris Shepherd/TSEA

ពួកសត្វទោច និងអ៊ូរ៉ាំងអ៊ូតាំង ពុំមានកន្ទុយទេ

ក្រុមស្វាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានចុះក្នុងបញ្ជីឧបសម្ព័ន្ធ I

របស់អនុសញ្ញា CITES

គ្រូបប្រភេទរឿ (Nycticebus spp.) ស្ទើរតែក្រហមអង្គការ IUCN ប្រែប្រួលរហូតដល់ប្រភេទកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ជិតផុតពូជ (EN)

របាយសេនេវ៉ា ៖ ប្រទេសបង់ក្លាដេស ព្រុយណេ កម្ពុជា ចិន ឥណ្ឌា ឥណ្ឌូនេស៊ី ឡាវ ម៉ាឡេស៊ី ភូមា ហ្វីលីពីន ថៃ និងវៀតណាម ។

ស្វា Mentawai (Presbytis potenziani) ៖

ស្ទើរតែក្រហមអង្គការ IUCN ជាប្រភេទកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ជិតផុតពូជ (EN)

របាយសេនេវ៉ា ៖ ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី (កោះ)

ស្វាអង្កត់ (Simias concolor) ៖

ស្ទើរតែក្រហមអង្គការ IUCN ជាប្រភេទកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ជិតផុតពូជ (CR)

របាយសេនេវ៉ា ៖ ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី (កោះ)

ស្វា Nasalis (Nasalis larvatus) ៖

ស្ទើរតែក្រហមអង្គការ IUCN ជាប្រភេទកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ជិតផុតពូជ (EN)

របាយសេនេវ៉ា ៖ ប្រទេសព្រុយណេ ឥណ្ឌូនេស៊ី (កាលីម៉ាន់តាន់) ម៉ាឡេស៊ី (រដ្ឋសាបា និងសារ៉ាវ៉ាក់)

ក្រុមស្វាច្រមុះឈ្មុយ (Rhinopithecus spp.) ស្ទើរតែក្រហមអង្គការ IUCN ប្រែប្រួលរហូតដល់ប្រភេទកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ជិតផុតពូជបំផុត (CR)

របាយសេនេវ៉ា ៖ ប្រទេសចិន និងវៀតណាម

ពួកស្វាព្រាម (Pygathrix spp.) ស្ទើរតែក្រហមអង្គការ IUCN ប្រែប្រួលរហូតដល់ប្រភេទកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ជិតផុតពូជបំផុត (CR)

របាយសេនេវ៉ា ៖ ប្រទេសកម្ពុជា ឡាវ និង វៀតណាម

ក្រុមទោច និង Siamang (Hylobatidae spp.):

ស្ទើរតែក្រហមអង្គការ IUCN ៖ ប្រែប្រួលរហូតដល់ប្រភេទកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ជិតផុតពូជបំផុត (CR)

របាយសេនេវ៉ា ៖ ប្រទេសបង់ក្លាដេស ព្រុយណេ កម្ពុជា ចិន ឥណ្ឌា ឥណ្ឌូនេស៊ី ឡាវ ម៉ាឡេស៊ី ភូមា ថៃ និង វៀតណាម

ពួកស្វាមាឌីមេនរ៉ាវ៉ូប្រភេទអ៊ូរ៉ាំងអ៊ូតាំង (Hominidae spp.) ៖

ស្ទើរតែក្រហមអង្គការ IUCN ៖ ប្រែប្រួលរហូតដល់ប្រភេទកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ជិតផុតពូជបំផុត (CR)

របាយសេនេវ៉ា ៖ ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី (កោះស៊ូមាត្រា និងកោះកាលីម៉ាន់តាន់) ម៉ាឡេស៊ី (រដ្ឋសាបា និងសារ៉ាវ៉ាក់)

លក្ខណៈពាណិជ្ជកម្ម ៖ ធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើសត្វនៅរស់ សាច់ លាងដីក្បាល បំណែកសំរាប់ ទុកធ្វើ ឧសថបូរាណ ។



ស្វាប្រូប៊ូស៊ី (Nasalis larvatus)
ប្រភព: WWF - Canon / Alain COMPOST



ស្វាព្រាមកន្ទុយក្រហម (Pygathrix nemaeus)
ប្រភព: WWF - Canon / Martin HARVEY



ស្វាទៅ Siamang ទីផ្សារ
ប្រភព: Chris Shepherd/TSEA



ស្វាអ៊ូរ៉ាំងអ៊ូតាំងនៅ Theme Park
ប្រភព: Chris Shepherd/TSEA



លាងដីក្បាលស្វាតាំងលក់
ប្រភព: Claire Beastall

Nycticebus spp. - Loris spp.

(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ)

(ក្រុមឈ្មោះ)

ឡូរី (Loris)

ឈ្មោះម្យ៉ាងទៀត: Kongkang (ភាសាម៉ាឡេស៊ី), Culi (ភាសាវៀតណាម)

របាយរស់នៅ: បង់ក្តាដេស ប្រិយណេ កម្ពុជា ចិន ឥណ្ឌា ឥណ្ឌូនេស៊ី ឡាវ ម៉ាឡេស៊ី ភូមា ហ្វីលីពីន ថៃ វៀតណាម

លក្ខណៈរូបរាង: ប្រវែងក្បាលទៅដងខ្លួន: ២១-៣៨ស.ម ប្រវែងកន្ទុយរហូតដល់ ២.៥ស.ម

លក្ខណៈសំគាល់:



Credit: Claire Beasall

- ភ្នែកធំៗ
- រង្វង់ភ្នែកទាំងពីរពណ៌ខ្មៅ
- ច្រមុះសើម
- ត្រចៀកតូចៗ
- ជើងនីមួយៗមានម្រាមប្រាំ
- កន្ទុយខ្លី ឬមើលមិនឃើញ



Credit: WWFM / MPS

លក្ខណៈស្រដៀងគ្នា:

ពពួករឿញី *Tarsius* spp. (Tarsier)
នៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ II នៃអនុសញ្ញា

- ប្រវែងក្បាលទៅដងខ្លួន: ៩.៥-១៥ស.ម
- ប្រវែងកន្ទុយ: ២០-២៤ស.ម

របាយរស់នៅ:

ប្រិយណេ ឥណ្ឌូនេស៊ី ម៉ាឡេស៊ី ហ្វីលីពីន



Credit: WWF-Canon / Jürgen FREUND

- ភ្នែកធំៗ
- ត្រចៀកធំៗ
- ជើងមានម្រាមប្រាំ
- កន្ទុយវែងជាងដងខ្លួនច្រើន

ស្ថានភាពអភិរក្សប្រភេទ:

- ស្ថិតក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ I នៃអនុសញ្ញា ស្តីពី ការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម អន្តរជាតិ លើប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិព្រៃ ដែលកំពុងរង គ្រោះថ្នាក់ (CITES)
- អង្គការ IUCN: ជាប្រភេទកំពុងទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ (EN)



Credit: WWFM / M. Kavanagh

កិច្ចការពារភ្នំភ្នំ:

រឿញីស្ថិតក្នុងក្រុមប្រភេទសត្វដែលកម្រ និងការពារដោយ ច្បាប់ ស្តីពីព្រៃឈើ ឆ្នាំ២០០២ ។

លក្ខណៈអាវិវត្តន៍: សត្វរស់ ស្បែក សាច់ត្រៀមរៀបចំធ្វើអាហារ ឬថ្នាំបូរាណ



សត្វរឿញីដែលត្រៀមរៀបចំធ្វើថ្នាំបូរាណ
Credit: Chris Shepherd / TSEA



សត្វរឿញីនៅមីផ្សារ
Credit: Chris Shepherd / TSEA



ស្បែកសត្វរឿញី
Credit: Chris Shepherd / TSEA



សត្វរឿញីដែលត្រៀមរៀបចំធ្វើថ្នាំបូរាណ
Credit: Chris Shepherd / TSEA



សត្វរឿញីនៅមីផ្សារ
Credit: Chris Shepherd / TSEA

Macaca fascicularis – Long-tailed Macaque

(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ)

(ស្វាគ្គាម)

ស្វាគ្គាម (Long-tailed Macaque)

ឈ្មោះផ្សេងៗទៀត : Kera (ភាសាម៉ាឡេស៊ី) Miao tangar (ភាសាកូម៉ា) Long-tailed Macaque (អង់គ្លេស)

របាយការណ៍ : ប្រទេសបង់ក្លាដេស ព្រុយណេ កម្ពុជា ហុងកុង ឥណ្ឌា ឥណ្ឌូនេស៊ី ឡាវ ម៉ាឡេស៊ី កោះមីរីឌីល

ប្រទេសភូមា ប្រទេសប៉ាឡូ ហ្វីលីពីន សិង្ហបុរី ថៃ និងវៀតណាម

តំបន់ភាគ : ប្រវែងក្បាល និងដងខ្លួន ៣៨-៦៥ ស.ម ប្រវែងកន្ទុយ ៤០-៥៥ ស.ម, ទម្ងន់សត្វពេញវ័យ

សត្វឈ្មោល មានទម្ងន់ ៤,៧-៨,៣ គីឡូក្រាម សត្វញី មានទម្ងន់ ២,៥-៥,៧ គ.ក

កិច្ចអភិរក្សសាគរល ១ : ៦

ស្វាគ្គាស្ថិតក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ II របស់អនុសញ្ញា CITES

បញ្ជីក្រហមសៀវភៅអន្តរជាតិ IUCN : ចាត់ថ្នាក់ជាប្រភេទទទួល

រងគ្រោះថ្នាក់តិចតួច (LC)

កិច្ចការពារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា : ស្វាគ្គាមត្រូវបានការពារស្រប

តាមច្បាប់ ស្តីពី ព្រៃឈើ ឆ្នាំ ២០០២ និងអនុក្រឹត្យពាក់ព័ន្ធ ។



Credit: WWFM / Chew Yen Fook

លក្ខណៈសម្គាល់ :



ប្រភព: WWFM / Stephen Hogg

រោមនៅលើក្បាលច្រើនដុះបញ្ចូលទៅក្រោយ មុខមានពណ៌ដូចផ្កាឈូក (ស៊ីជម្ពូរ)

កន្ទុយវែង : ឈ្មោល មានព្រួយថ្ពាល់ ពុកមាត់ ញីមានពុកចង្ការ (រោមចង្ការ) កូនតូចទើបកើត មានរោមខ្មៅ

រោមខ្លួន : ប្រែប្រួលពីពណ៌ប្រផេះទៅក្រហមត្នោត រោមពោះមានពណ៌ត្នោតស្រាលជាង



ប្រភព: WWFM / Gerald Cubitt

លក្ខណៈពាណិជ្ជកម្ម :



កូនស្វាគ្គាម

ប្រភព: Chris Shepherd/TSEA



សត្វពេញវ័យ និងកូន ជំនង់អាចត្រូវបានគេដឹក តាមកញ្ជ្រោយកទៅលក់ នៅតាមផ្សារកូនស្វាគ្គាម ប្រភព: Chris Shepherd/TSEA

លក្ខណៈស្រដៀងគ្នានឹងស្វាគ្គាមត្នោតដៃនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ :

ស្វាអន្តត៍



ប្រភព: Tilo Nadler

កន្ទុយប្រវែង ១,៤-៦,៥ ស.ម កន្ទុយភាគច្រើនមានរោមតិច មុខ : រោមតិច និងដុះលាយពណ៌ ក្រហមខ្មៅចម្រុះគ្នា កូន : ទើបកើតពណ៌ស, ពេញវ័យមានទម្ងន់ ឈ្មោល : ៤,៧-៨,៣ គីឡូក្រាម, ញី : ២,៥-៥,៧ គីឡូក្រាម

ស្វាតំបន់អាសាម



ប្រភព: Tilo Nadler

ប្រវែងកន្ទុយ : ២០-២៩ ស.ម រោមប្រៃពណ៌លឿងទៅក្រហមត្នោតចាស់ មុខ : មានរោមតិច និងក្រហម តិចចំពោះស្វាពេញវ័យ ភ្លៅក្រោយ មានពណ៌ប្រផេះ សត្វពេញវ័យមានទម្ងន់ : ឈ្មោល : ៧,៩-១៥ គីឡូក្រាម ញី : ៤,៩-៨,៦គីឡូក្រាម

ប្រភេទ Macaca mulatta – Rhesus Macaque



ប្រភព: WWF-Canon / Martin HARVEY

កន្ទុយប្រវែង : ១៩-៣០ ស.ម រោមពណ៌ត្នោត មុខក្រហមបន្តិច ត្រភ្លៀកក្រហម សត្វជំនង់មានទម្ងន់ ឈ្មោល : ៥,៦-១០ គីឡូក្រាម ញី : ៤,៤-១០,៥ គីឡូក្រាម

ស្វាត្រាស Macaca nemestrina* and Macaca leonina – Southern* & Northern Pig-tailed Macaques



ប្រភព: WWFM / Stephen Hogg

កន្ទុយប្រវែង : ១៣-២៤,៥ ស.ម កន្ទុយតែងតែកោងទៅលើ និង មានរោមខ្លី ឬ គ្មានរោមតែម្តង រោមខ្លួនខាងលើមានពណ៌ត្នោត ខាងក្រោមស ក្បាល : ពណ៌ត្នោតចាស់, ទម្ងន់ សត្វពេញវ័យ ឈ្មោល : ៦,២-១៤,៥ គីឡូក្រាម ញី : ៤,៧-១០,៩ គ.ក

Elephas maximus & Loxodonta africana - Elephant

(ឈ្មោះសាស្ត្រនិងឈ្មោះសាមញ្ញ)

ដំរី (Elephant)

ឈ្មោះផ្សេងៗទៀត : Gajah (ភូមា) Voi (វៀតណាម) Elephant (អង់គ្លេស)

ឈ្មោះសំនេរ : ដំរីអាស៊ី : បង្កក្លាដេស, ប៊ុយតាន, ប្រុយណេ, កម្ពុជា, ចិន, ឥណ្ឌា,

ឥណ្ឌូនេស៊ី, ឡាវ ម៉ាឡេស៊ី, ភូមា, នេប៉ាល់, ស្រីលង្ការ, ថៃ និងវៀតណាម

ដំរីអាហ្វ្រិក : អង់ហ្គូឡា, បេនីន, ប៊ូតង្វាណា, បួតីណាហ្វាសូ, កាម៉ារ៉ូន, សាធារណៈរដ្ឋ អាហ្វ្រិក, ឆាដ, កុងហ្គូ, សាធារណៈរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គូ, កូរ៉េត, អេក្វាទ័រ, អ៊ីនឌី, អេរីទ្រី, អេទ្យីប, ហ្គាប៉ូន, ហ្គាណា, ជូអីនី, ជូហ្គីវេ, ប៊ុសសាវ៉ា, គំនយា, លីប៊ីរី, ម៉ាឡាវី, ម៉ាលី, ម៉ូហ្សាំបិច, ណាមីប៊ុប, នីជី, នីជឺរៀ, រ៉ាវ៉ានដា, សេនេហ្គាល់, សេរ៉ា លេអូន, សូម៉ាលី, អាហ្វ្រិកខាងត្បូង, សូដង់, តង់ហ្សានី, យូហ្គង់ដា, តូហ្គូ និងប្រទេសប្រទេសប្រទេសប្រទេស

តំណភ្ជាប់ : កំពស់រហូតដល់ ៤ ម, ទម្ងន់រហូតដល់ ១០ តោន មានទម្ងន់រហូតដល់ ៤០ គីឡូក្រាម

ភាពស្រដៀងគ្នា : គ្មានសត្វណាដែលអាចប្រដូចបានឡើយជាភ្នំក្នុងមូល ឬភ្នំក្នុងក្បាល (ធម្មជាតិ) ជំនួស :

ភ្នំក្នុងមាត់ (ដំរីបូរណ៍ផុតពូជ តាំងពី១០០០០ឆ្នាំមកហើយ) ភ្នំក្នុងក្បាល Narwal ភ្នំក្នុងក្បាល Walrus ធ្មេញត្រីបាឡែន,

ភ្នំក្នុងក្បាល Wart Hog ធ្មេញដំរីទឹក, ឆ្អឹង ចំពុះសត្វព្យាង្គ គម្ពីរ ដំរីចាត់ម្នាក់

ឧបសគ្គសត្វ (សិប្បនិម្មិត) : ដំរីលើ ឆ្នាំស្លឹក

ការកំណត់ភាពខុសគ្នារវាងដំរី និងឧបសគ្គសត្វ :


- ពេលឆ្លងកាត់ពន្លឺមានពណ៌ស្វាយ (ultra violet) :
- ភ្នំក្នុងដំរី និងភ្នំក្នុងមាត់ប្រែពណ៌ទៅជាពណ៌ស ឬពណ៌ខៀវ
 - ភ្នំក្នុងមាត់មានបង្ហាញស្នាមជ្រាបពណ៌ត្នោត ឬពណ៌ខៀវចំពុះបែតង
 - ភ្នំក្នុងដំរីមិនមានស្នាមជ្រាប

ក្រឡាស្រូតខ្លួន :

ក្រឡាខ្សែបន្ទាត់ដោយធម្មជាតិដូចខ្លួន គេអាចមើលឃើញនៅពេលយកភ្នំក្នុងដំរី ឬភ្នំក្នុងមាត់មកខាត់ឱ្យ រលោងត្រង់ផ្នែកពន្លឺកាត់ទទឹង

ពិនិត្យមើលទម្ងន់ក្រឡាខ្សែបន្ទាត់ ដើម្បីកំណត់ភាពខុសគ្នារវាងភ្នំក្នុងដំរី និងភ្នំក្នុងមាត់

- ១- ប្រើម៉ាស៊ីនថតចម្លង ដើម្បីចម្លងរូបភាពត្រង់ ផ្នែកពន្លឺកាត់ទទឹងនៃភ្នំ
- ២- ដាក់ក្រដាសថ្នាំនៅចន្លោះរូបភាពថតចម្លង និង កញ្ចក់ហើយពង្រីកវាអោយធំដើម្បីងាយស្រួលមើល
- ៣- នៅលើក្រដាសថតចម្លង តាមរយៈក្រឡាខ្សែបន្ទាត់ជ្រើសរើសមុំក្នុងមូលចំនួន ហើយត្រូវចេញជា មុំដើម្បីងាយស្រួលវាស់
- ៤- វាស់ដីក្រមុំក្នុងមូល ២ ឬ ៣ ហើយគណនា រក ដីក្រមុំមធ្យម (មើលរូបភាព)



ភ្នំក្នុងដំរី



ភ្នំក្នុងមាត់

ស្ថានភាពអភិរក្សសត្វជាតិ : ស្ថិតក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ I នៃអនុសញ្ញា CITES

សៀវភៅក្រហម IUCN ដំរីអាស៊ី ជាប្រភេទកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ (EN)

ដំរីអាហ្វ្រិក ជិតទទួលរង គ្រោះថ្នាក់ (NT)

ដំរីអាហ្វ្រិកនៅប្រទេសបូស្វាណា, ណាមីប៊ុប, អាហ្វ្រិកខាងត្បូង និងប្រទេសប្រទេស

ស្ថិតក្នុងបញ្ជីឧបសម្ព័ន្ធ II នៃអនុសញ្ញា CITES

កិច្ចការពារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា : ដំរីអាស៊ី ត្រូវបានការពារក្រោមច្បាប់ ស្តីពី

ព្រៃឈើ ឆ្នាំ ២០០២



ប្រភព: Chris Shepherd/TRAFFIC Southeast Asia

ប្រភេទនៃការប្រើប្រាស់ : តួខ្លួនសត្វនៅរស់ (សម្រាប់ធ្វើជាឈាសជំនិះ និងឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍) ភ្នំក្នុងមូល ឬផលិតផលធ្វើចេញពីភ្នំក្នុងមូល, ធ្មេញ, ឆ្អឹងលាងក្បាល និងគ្រោងឆ្អឹងផ្សេងទៀត រោម ស្បែក វត្ថុ ជ័យភ័ណ្ឌ ត្រូវបានគេយកទៅលក់



រោមកន្ទុយដំរី និងចិញ្ចៀន ធ្វើពីរោមកន្ទុយដំរី

ប្រភព: Chris Shepherd/TSEA



ធ្មេញដំរី

ប្រភព: Chris Shepherd/TSEA



ស្បែកដំរី

ប្រភព: Chris Shepherd/TSEA



ចង្កើនដែលធ្វើពីភ្នំក្នុងដំរី

ប្រភព: Chris Shepherd/TSEA



វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដែលធ្វើពីភ្នំក្នុងដំរី

ប្រភព: Chris Shepherd/TSEA



ភ្នំក្នុងមូល

ប្រភព: Chris Shepherd/TSEA

ភ្នំក្នុងដំរីដែលគេឆ្លាក់រូបហើយ

ប្រភព: Chris Shepherd/TSEA

Dendrocygna javanica - Lesser Whistling Duck and Dendrocygna arcuata - Wandering Whistling Duck

ប្រភេទ Lesser Whistling Duck


ឈ្មោះផ្សេងទៀត : Itek Belibis, Belibis Kembang (ម៉ាឡេស៊ី)

រហាយ : ប្រទេសប្រ៊ុយណេ កម្ពុជា ចិន ឥណ្ឌា ឥណ្ឌូនេស៊ី ជប៉ុន ឡាវ
ម៉ាឡេស៊ី ភូមា នេប៉ាល់
ប៉ាគីស្ថាន សាំងហ្គាពួរ ស្រីឡាំងកា តៃវ៉ាន់ ថៃ និងវៀតណាម

លក្ខណៈរូបរាង : បណ្តោយប្រវែង ៣៨ - ៤១សម

លក្ខណៈសំគាល់ :

ប្រីក
Dendrocygna javanica - Lesser Whistling Duck



Credit: Choy Wai Mun

Wandering Whistling Duck


ឈ្មោះផ្សេងទៀត :

រហាយ : ប្រទេសអូស្ត្រាលី ឥណ្ឌូនេស៊ី ព្យូប៊ីតាន
ប៉ាពួញូឌីនី ហ្វីលីពីន និងសាំងហ្គាពួរ

លក្ខណៈរូបរាង : បណ្តោយប្រវែង ៤០ - ៤៥សម

លក្ខណៈសំគាល់ :

Dendrocygna arcuata -
Wandering Whistling Duck



Credit: Lynn and Brad Weinert

ស្ថានភាពអភិរក្សអន្តរជាតិ : ១

មិនចុះក្នុងអនុសញ្ញា CITES

បញ្ជីក្រហម IUCN :

ប្រីក : ជាប្រភេទរងគ្រោះថ្នាក់តិចតួច (LC)

Dendrocygna arcuata: ជាប្រភេទរងគ្រោះថ្នាក់តិចតួច (LC)

កិច្ចការពារថ្នាក់ជាតិ :

ប្រីក (*Dendrocygna javanica*): ច្បាប់ព្រៃឈើ ឆ្នាំ២០០២

(ចុះបញ្ជីក្នុងក្រុមប្រភេទសត្វល្អិត)

Dendrocygna arcuata: មិនចុះបញ្ជី

ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម :

សត្វរស់




Dendrocygna javanica
Credit: Chris Shepherd/TSEA

Leptoptilos spp. - Adjutant Storks

ត្រីដក់ធំ Greater Adjutant Stork

- ឈ្មោះផ្សេងៗ : Gio đẫy lớn (វៀតណាម)
- របាយ : ប្រទេសកម្ពុជា និងឥណ្ឌា
ទីជម្រក: បង់ក្លាដែស នេប៉ាល់ ថៃ និងវៀតណាម។
ប្រហែលផុតពូជនៅប្រទេសឡាវ និងភូមា
- លក្ខណៈរូបរាង : បណ្តោយខ្លួនប្រវែង ១៤៥ - ១៥០ សម


លក្ខណៈសំគាល់ :
ត្រីដក់ធំ *Leptoptilos dubius* -
Greater Adjutant Stork



ត្រីដក់តូច Lesser Adjutant Stork

- ឈ្មោះផ្សេងៗ : Botak Kecil (ម៉ាឡេស៊ី), Gio đẫy glava (វៀតណាម)
- របាយ : បង់ក្លាដែស ប្រ៊ុយណេ កម្ពុជា ឥណ្ឌូនេស៊ី ឡាវ ម៉ាឡេស៊ី ភូមា
នេប៉ាល់ ស្រីឡាងកា ថៃ និង វៀតណាម
- លក្ខណៈរូបរាង : បណ្តោយខ្លួនប្រវែង ១២២.៥ - ១២៩ សម
- លក្ខណៈសំគាល់ :

លក្ខណៈសំគាល់ :
ត្រីដក់តូច *Leptoptilos javanicus* -
Lesser Adjutant Stork



ស្ថានភាពអភិរក្សអន្តរជាតិ :
មិនចុះក្នុងបញ្ជី **CITES**

បញ្ជីក្រហម **IUCN** :

- ត្រីដក់ធំ : ជាប្រភេទជិតផុតពូជ (EN)
- ត្រីដក់តូច : ងាយទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ (VU)

កិច្ចការពារថ្នាក់ជាតិ : ច្បាប់ព្រៃឈើ ឆ្នាំ២០០២

Leptoptilos dubius: ចុះបញ្ជីក្នុងក្រុមប្រភេទរងគ្រោះថ្នាក់
Leptoptilos javanicus: ចុះបញ្ជីក្នុងក្រុមប្រភេទក្រុម

ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម :
សត្វរស់



Leptoptilos javanicus (ត្រីដក់តូច)

Credit: Chris Shepherd/TSEA

Bucerotidformes - Hornbills

(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ)

(ក្រុមសត្វព្រៃ)

ព្រំទី (Hornbills)

ឈ្មោះផ្សេងៗទៀត : Hornbills (ភាសាអង់គ្លេស)

រចនាសម្ព័ន្ធ : មានរស់នៅតំបន់អាហ្វ្រិក និងអាស៊ី

តំណភ្ជាប់ : មានប្រវែង ៣២០ សម

ការអភិរក្សជីវិតសត្វព្រៃសត្វព្រៃ ១ :

ក្រុមសត្វព្រៃទាំងនេះតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មាន ៤ ប្រភេទដែលបានចុះក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ ។

និងក្រៅពីនេះបានចុះក្នុង ឧបសម្ព័ន្ធ ១ របស់អនុសញ្ញា CITES

កិច្ចការការពារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា :

ពួកសត្វព្រៃទាំងនេះត្រូវបានការពារក្រោមច្បាប់ ស្តីពី ព្រៃឈើ ឆ្នាំ ២០០២ ។



លក្ខណៈសម្គាល់ :



ប្រភេទកងកងតូច (Oriental Pied Hornbill)

ប្រភព: Claire Beasly

ស្រដៀងគ្នា :

ប្រភេទ Toucans ដែលមាននៅអាមេរិកខាងត្បូង



ប្រភេទ (Toco toucan) ស្ថិតក្នុងក្រុមសត្វព្រៃ ។ របស់អនុសញ្ញា

ប្រភព: WWF-Canon / Michel GUNTHER

ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានប្រភេទ ៤ ដែលបានចុះក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ ។ របស់អនុសញ្ញា CITES

Rhinoplax vigil (Helmeted Hornbill)

IUCN: ជាប្រភេទកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ (NT)



មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
រចនាសម្ព័ន្ធ : ប្រទេសប្រូយណេ ឥណ្ឌូនេស៊ី
ម៉ាឡេស៊ី ភូមា និងថៃ

Rhyticeros subruficollis (Plain-pouched Hornbill)

IUCN: ជាប្រភេទងាយរងគ្រោះថ្នាក់ (VU)



រចនាសម្ព័ន្ធ : ម៉ាឡេស៊ី ភូមា និងថៃ

Buceros bicornis (Great Hornbill)

IUCN: កងកងធំ - ជាប្រភេទ


កំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ (NT)



រចនាសម្ព័ន្ធ : ប្រទេសប្រូយណេ ឥណ្ឌូនេស៊ី
ម៉ាឡេស៊ី ភូមា និងថៃ

Aceros nipalensis (Rufous-necked Hornbill)

IUCN: ជាប្រភេទងាយរងគ្រោះថ្នាក់ (VU)



រចនាសម្ព័ន្ធ : ប្រទេសប៊្រូយណេ ឥណ្ឌូ ឡាវ
ភូមា ថៃ និងវៀតណាម

លក្ខណៈពិសេស :

ក្បាលជាប់ចំពុះ និងសត្វនៅលើដីត្រូវបានគេជួញដូរសម្រាប់យកទៅចិញ្ចឹមកំសាន្ត



កងកងតូច (Oriental Pied Hornbill)

ប្រភព: TRAFFIC Southeast Asia



ចំពុះកងកងធំ (Great Hornbill)

ប្រភព: Chris Shepherd/TRAFFIC SEA



ចំពុះដែលដាក់តាំងលក់ (កងកងធំ)

ប្រភព: Chris Shepherd/TRAFFIC Southeast Asia

Copsychus malabaricus - White-rumped Shama

ឈ្មោះត្រព្រឹត្យ White-rumped Shama

ឈ្មោះផ្សេងទៀត : Murai Batu, Murai Hutan (ម៉ាឡេស៊ី)

រាយ : ប្រទេសបង់ក្លាដែស ប៊ូតាន ប្រ៊ុយណេ កម្ពុជា ចិន ឥណ្ឌា ឥណ្ឌូនេស៊ី ឡាវ ម៉ាឡេស៊ី ភូមា នេប៉ាល់ សំរងហ្គាពួរ ស្រីឡាំងការ ថៃ និងវៀតណាម (នាំចូលមកហាវី សហរដ្ឋអាមេរិក)

លក្ខណៈរូបរាង : បណ្តោយខ្លួន ប្រវែងរហូតដល់ ២៥សម

ស្ថានភាពអភិរក្សអន្តរជាតិ : ។

ចុះក្នុងបញ្ជីអនុសញ្ញា **CITES**

បញ្ជីក្រហម **IUCN** : ជាប្រភេទទទួលរងគ្រោះថ្នាក់តិចតួច (LC)

កិច្ចការពារថ្នាក់ជាតិ :

ច្បាប់ព្រៃឈើ ឆ្នាំ២០០២ (ចុះបញ្ជីក្នុងក្រុមប្រភេទសម្បូណ៍)



Credit: John Steed

លក្ខណៈសំគាល់ :

- ចុងខ្នងពណ៌ស
- ឈ្មោះ : ពណ៌ខ្មៅរលោង និងទ្រូងពណ៌ត្នោតក្រហមជាំ
- ញី : ពណ៌ប្រផេះ និងទ្រូងពណ៌ត្នោតក្រហមជាំ



លើខ្នងក្បែរកន្ទុយពណ៌ស

ស្វាចេកព្រៃញី
Credit: Suppala Klabdee



ស្វាចេកក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រពណ៌ស
ទាំងនេះប្រហែលជាអាចមើល
ឃើញពីចម្ងាយពីខាងលើ

ស្វាចេកព្រៃឈ្មោះ
Credit: Lee Kip Yang



ស្វាចេកព្រៃមកពីសា
បា និងម៉ាឡេស៊ី មាន
កំប៉ោយពណ៌ស

ស្វាចេកព្រៃឈ្មោះ (សាបា ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី)

ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម :

សត្វរស់ សម្រាប់ចិញ្ចឹមយកសំឡេងច្រៀង ។

សំគាល់ : សត្វញី មិនច្រៀង
ដូច្នេះហើយគេកំរើញមានការលក់ដូរណាស់



អ្នករត់ពន្ធដែលគេចាប់បាននៅសហរដ្ឋអាមេរិក
ជាមួយនឹងសត្វច្រៀង រួមមានស្វាចេកព្រៃ ។

Credit: US Fish & Wildlife Service

ស្រដៀងទៅនឹង :

Copsychus saularis
Maggie Robin

បញ្ជីក្រហម **IUCN** : ជាប្រភេទទទួលរង
គ្រោះថ្នាក់តិចតួច មិនចុះក្នុងបញ្ជី
អនុសញ្ញា **CITES**

- ពណ៌ខ្មៅរលោង
- ទ្រូង និងកន្ទុយខាងក្រោមពណ៌ស
- ឆ្មុតស្លាបពណ៌ស

បណ្តោយខ្លួនប្រវែងរហូតដល់ ២១.៦សម

រាយ : ប្រទេសបង់ក្លាដែស ប៊ូតាន ប្រ៊ុយណេ កម្ពុជា ចិន ឥណ្ឌា ឥណ្ឌូនេស៊ី ឡាវ ម៉ាឡេស៊ី ភូមា នេប៉ាល់ ប៉ាគីស្ថាន ហ្វីលីពីន សំរងហ្គាពួរ ស្រីឡាំងការ ថៃ និងវៀតណាម



Credit: John Steed

Trichixos pyrropyga
Rufous-tailed Shama

បញ្ជីក្រហម **IUCN** : ជិត
ទទួលរងគ្រោះថ្នាក់មិនចុះក្នុង
បញ្ជីអនុសញ្ញា **CITES**

បណ្តោយខ្លួនប្រវែងរហូតដល់
២១-២២.៥សម

រាយ : ប្រទេសប្រ៊ុយណេ
ឥណ្ឌូនេស៊ី និងថៃ



Credit: Lim Kim Chye



Credit: Wouter Thijs

Copsychus luzoniensis
White-browed Shama

បញ្ជីក្រហម **IUCN** : ជិតទទួល
រងគ្រោះថ្នាក់មិនចុះក្នុងបញ្ជី
អនុសញ្ញា **CITES**

មិនសូវមានគេជួញដូរទេ

ត្រូវតែកម្រិត
មែនពណ៌សរទេ

បណ្តោយខ្លួនប្រវែងរហូតដល់
១៨សម

រាយ : ហ្វីលីពីន

Falconiformes – Birds of Prey

(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ) (ក្រុមបក្សីព្រៃ)

ក្រុមបក្សីព្រៃ

រួមាន: ពពួកអក, ឥន្ទ្រីយ៍, ត្នាត, ស្នាំង, ខ្លែង.....ជាដើម

ឈ្មោះផ្សេងៗ :

ឈ្មោះសំនៀង : មានរស់នៅទូទាំងសាកលលោក

តំណភ្ជាប់ : កំពស់ ១៤-១១៨ ស.ម ទំហំស្មាបពេលហើរប្រវែង ២៦-៣០០ ស.ម
ទម្ងន់ ៣៥ ក្រាម ទៅ ១៤ គីឡូក្រាម

ស្ថានភាពអភិរក្សភ្នំជ្រៅ : បក្សីព្រៃទាំងអស់ស្ថិតក្នុងបញ្ជីឧបសម្ព័ន្ធ II នៃអនុសញ្ញា CITES លើកលែង ១៥ប្រភេទ ស្ថិតក្នុងបញ្ជីឧបសម្ព័ន្ធ I នៃអនុសញ្ញា CITES ក្នុងនោះ មាន៥ប្រភេទ តែជួបប្រទះឃើញនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍

Aquila heliaca - Eastern Imperial Eagle

Haliaeetus albicilla - White-tailed Eagle

Pitheophaga jefferyi - Philippine Eagle

Falco jugger - Laggar Falcon

Falco peregrinus - Peregrine Falcon

ប្រភេទសត្វស្លាត្នីរបស់ពិភពលោក : មួយប្រភេទស្ថិតក្នុងបញ្ជីឧបសម្ព័ន្ធ III នៃអនុសញ្ញា CITES ប៉ុន្តែប្រភេទទៀតមិនស្ថិតក្នុងឧបសម្ព័ន្ធណាមួយនៅឡើយទេ

ស្បៀងក្រៅក្រហមរបស់អង្គការ : IUCN ជាប្រភេទដែលបានចាត់ថ្នាក់ប្រែប្រួលរហូតដល់ប្រភេទកំពុងរងគ្រោះ ថ្នាក់ឈានទៅការវិនាសផុតពីដំបូង (CR)

កិច្ចការពារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា : ក្រុមបក្សីព្រៃត្រូវបានការពារដោយច្បាប់ ស្តីពី ព្រៃឈើ ឆ្នាំ ២០០២



Falco peregrinus - Peregrine Falcon
ប្រភព: WWF-Canon / John S. MITCHELL

លក្ខណៈសំគាល់ :

- ស្ថិតក្នុងតំបន់បរិយាកាស
- ក្រព្យាជើងវែងមុតស្រួច
- ទំពុកក្នុងដួចផ្លែស្លឹក
- សំបុកក្រមៅ



សំគាល់ :
ការកំណត់ភាពខុស
គ្នារវាងកូនបក្សី
ប្រភេទផ្សេងៗ
គឺពីពណ៌ស

ចំពោះកោងខ្ទប់
រាងដូចផ្លែស្លឹក

ក្រព្យាជើងវែង
មុតស្រួច



កូនបក្សី ប្រភេទ *Spizaetus bartelsi* - Javan Eagle (juvenile)
ប្រភព: TRAFFIC Southeast Asia

ប្រភេទជួរជួរ : តួនាទីសត្វនៅរស់ ផ្នែកនៃរាងកាយសម្រាប់ធ្វើជាឱសថបូរាណ ឬសម្លៀកបំពាក់



ដែលគេដាក់តាំងលក់នៅទីផ្សារ
ប្រភព: Chris Shepherd/TSEA



ដែលគេដាក់តាំងលក់នៅទីផ្សារ
ប្រភព: Chris Shepherd/TSEA



បក្សីព្រៃដែលគេដាក់តាំងលក់នៅទីផ្សារ
ប្រភព: Chris Shepherd/TSEA

Pycnonotus zeylanicus - Straw-headed Bulbul

(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ) (សត្វមានពិការភាពលើស)


បាបពិការភាពលើស (Straw-headed Bulbul)

ឈ្មោះម្យ៉ាងទៀត: Cangkurawa (ភាសាឥណ្ឌូនេស៊ី) Barau-barau (ម៉ាឡេស៊ី សាបា)

រាយការណ៍នៅ: ប្រ៊ុយណេ ឥណ្ឌូនេស៊ី ម៉ាឡេស៊ី ភូមា សិង្ហបុរី ថៃ

លក្ខណៈរូបរាង: កំពស់: ៣៧.៥ ទៅ ៥០ មម ទម្រង់ប្រភេទចាបពិការភាពលើសគេបំផុត

លក្ខណៈសំគាល់:



Credit: Mervin Quah

លក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទៅនឹង: ទៅនឹងចាបពិការភាពលើសផ្សេងៗ

- នេះគឺជាប្រភេទសត្វចាបពិការភាពលើសដែលធំជាងគេបំផុត
- មិនមានប្រភេទចាបពិការភាពលើសណាមួយមានក្បាលរោមពណ៌លឿងទេ

ស្ថានភាពអភិរក្សវិទ្យាសាស្ត្រ:

- ស្ថិតក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ II នៃអនុសញ្ញា ស្តីពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ លើប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិព្រៃ ដែលកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ (CITES)
- ជាប្រភេទងាយទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ IUCN: VU

កិច្ចការការពារជាតិ:

អនុក្រឹត្យស្តីពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិលើប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិព្រៃដែលកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ ឆ្នាំ២០០៦ ។



Credit: Mervin Quah

លក្ខណៈអាជីវិក្ស: សត្វរស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រភេទចាបពិការភាពលើស និងលក់ដូរជាចិញ្ចឹមកំសាន្ត



ពិការភាពលើសដាក់លក់នៅផ្សារ

Credit: Chris Shepherd / TSEA

^a សូមអានបន្ថែមពីស្ថានភាពអភិរក្សនៅលើទំព័រវេបសាយ www.cites.org និង www.iucnredlist.org

Gracula religiosa - Hill Mynah

(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ) (សារិកាកែវឆ័យ)

សារិកាកែវឆ័យ (Hill Mynah)

ឈ្មោះផ្សេងៗទៀត: Tiong Emas (ភាសាម៉ាឡេស៊ី) Hill Mynah (ភាសាអង់គ្លេស)

រាយការណ៍នៅ: ប៊ុយតាន ប៊្រុយណេ កម្ពុជា ចិន ឥណ្ឌា ឥណ្ឌូនេស៊ី ឡាវ ម៉ាឡេស៊ី ភូមា នេប៉ាល់ ហ្វីលីពីន សិង្ហបុរី ស្រីលង្ការ ថៃ វៀតណាម

លក្ខណៈរូបរាង: កំពស់: ៣០សម ទំងន់: ៤០០ក្រាម

លក្ខណៈសំគាល់:



លក្ខណៈស្រដៀងគ្នា:



ស្ថានភាពអភិរក្សសត្វជាតិ:

- ស្ថិតក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ II នៃអនុសញ្ញា ស្តីពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម អន្តរជាតិលើប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិព្រៃ ដែលកំពុងរងគ្រោះ ថ្នាក់ (CITES)
- ជាប្រភេទរងគ្រោះថ្នាក់តិចតួច (IUCN: LC)

កិច្ចការពារសត្វជាតិ(កម្ពុជា)

ស្ថិតក្នុងក្រមមានដោយបង្អួច នៃច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើ ឆ្នាំ២០០២



Credit: WWF-Malaysia / Oon Swee Hock

លក្ខណៈអាជីវិក្ស: សត្វរស់ លក់ធ្វើជាសត្វចិញ្ចឹមកំសាន្ត



សារិកាកែវរឹង ដាក់តាំងលក់នៅផ្សារ
Credit: Chris Shepherd / TSEA



សារិកាកែវរឹង ដាក់តាំងលក់នៅផ្សារ
Credit: Chris Shepherd / TSEA

Psittaciformes spp. - Parrots

(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ)

(ពាក្យស្រដៀង Parrots)

សេះក (Parrot)

ឈ្មោះម្យ៉ាងទៀត:

រាយការណ៍នៅ: អាហ្វ្រិក អាមេរិកកណ្តាល និងខាងត្បូង អាស៊ី អូស្ត្រេលី

លក្ខណៈសំគាល់:

កំពស់: ៨-១០០ស.ម ភាគច្រើនមានពណ៌បៃតង ខ្លះពណ៌ស ឬពណ៌ ក្រហមនិងខៀវ


ក្បាលធំ

ក្បាល

ជើងខ្លី



គល់ចំពុះធំ




ចំពុះខាងលើ រាងកោងធំ ខាងចុងស្រួច

ចំពុះខាងក្រោម រាងដូចមុខកាត់ ពន្លាក

ម្រាមជើង២ ឆាតទៅក្រោយ

ម្រាមជើង២ ឆាតទៅមុខ



សេះកដែលមានលក្ខណៈពិសេស: *Agapornis roseicollis* Peach-faced Lovebird

រាយការណ៍នៅ: អាហ្វ្រិកភាគនិរតី
ប្រវែង: ១៦ស.ម

លក្ខណៈពិសេសសំគាល់:

- ខ្សែឆ្នុតពណ៌ក្រហមនៅពីលើចំពុះ (1)
- ចំពុះពណ៌សប្រផែត (2)
- ផ្កាពណ៌សខាងលើដៃ (3)
- កខាងក្រោយពណ៌បៃតង (4)
- ផ្នែកក្រោយពណ៌ខៀវ (5)

ចំណាំ: មានពណ៌ផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនចំពោះប្រភេទដែលបង្កើតឡើងក្នុងពេលថ្មីៗនេះ ផ្អែកខាងក្រោយវា ខ្លះពណ៌ស ខ្លះពណ៌ខៀវ ឬខៀវ។ ប្រភេទសេះកដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាបេះបិទត្រូវបានការពារ (សាកសួរការពារបញ្ជាក់ប្រសិនបើមិនច្បាស់)



សេះក *Melopsittacus undulatus* Budgerigar

រាយការណ៍នៅ: អូស្ត្រាលី
ប្រវែង: ១៨ ស.ម

លក្ខណៈពិសេសសំគាល់:

- ផ្កាពណ៌សាត់ម្នាក់ (1)
- ខ្លួនពណ៌សាត់ម្នាក់ (2)
- មានឆ្នុតអង្កត់នៅលើស្បែកខាងលើ និងខាងក្រោយពណ៌ខៀវ (3)

លក្ខណៈពិសេសសំគាល់:

- រូបរាងតូច
- ស្បែក និងកន្ទុយស្រួច

ចំណាំ: ប្រភេទសេះកដែលគេទុកបង្កាត់ពូជមានពណ៌ចម្រុះជាច្រើនដូចជា ខៀវ បៃតង ឬ ស



ស្ថានភាពការពារអន្តរជាតិ:

គ្រប់ប្រភេទសេះកទាំងអស់ស្ថិតក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ I និង II នៃអនុសញ្ញា ស្តីពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ លើប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិព្រៃ ដែលកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ (CITES) លើកលែងតែ សេះកប្រភេទខាងក្រោមនេះមិនទាន់ត្រូវបានការពារ។

- *Agapornis roseicollis* – Peach-faced Lovebird
- *Melopsittacus undulatus* – Budgerigar
- *Nymphicus hollandicus* – Cockatiel
- *Psittacula krameri* – Ring-necked Parakeet

កិច្ចការពារថ្នាក់ជាតិ(កម្ពុជា):

គ្រប់ប្រភេទសេះកត្រូវបានការពារតាមច្បាប់ ស្តីពីព្រៃឈើឆ្នាំ២០០២ ។

- សេកក្រិច
- សេកសក
- សេកសោម
- សេកកន្ទុយខៀវ
- សេកអាត់
- សេកញី

លក្ខណៈពាណិជ្ជកម្ម: សត្វរស់ និងពងរស់ លក់បន្តធ្វើជាសត្វចិញ្ចឹមកំសាន្ត



Female Eclectus Parrot
Credit: Chris Shepherd / TSEA

សេះក *Nymphicus hollandicus* Cockatiel

រាយការណ៍នៅ: អូស្ត្រាលី
ប្រវែង: ២៩-៣៣ស.ម


លក្ខណៈពិសេសសំគាល់:

- កំពែងប៉ះចំពុះលើ (1)
- ក្បាលពណ៌ខៀវ (2)
- គំបូត្រចៀកពណ៌ទឹកក្រូច (3)
- ចំណាត់ស្បែកពណ៌ស (4)

លក្ខណៈពិសេសសំគាល់:

- ស្បែក និងកន្ទុយស្រួចវែង (1)
- ស្បែករាងក្របីប៉ះលើស្បែកមានពណ៌ឈាមជ្រូក (2)

ចំណាំ: មានពណ៌ចម្រុះចំពោះប្រភេទដែលគេទុកបង្កាត់ពូជ



សេះក *Psittacula krameri* Ring-necked Parakeet

រាយការណ៍នៅ: អាហ្វ្រិក អាស៊ី
ប្រវែង: ៤០ស.ម

លក្ខណៈពិសេសសំគាល់:

- ពណ៌បៃតងព្រៃលេត (1)
- ក្បាលពណ៌បៃតង (2)
- ផ្កាពណ៌ខ្មៅ បំពង់កពណ៌ផ្កាឈូកក្រមៅកញ្ចែងពណ៌ស្វាយ (3)
- កន្ទុយពណ៌ខៀវ ខាងចុងវាពណ៌ខៀវ (4)

លក្ខណៈពិសេសសំគាល់:

- កន្ទុយស្រួចវែង
 - ស្បែករាងក្របីប៉ះលើស្បែកមានពណ៌ឈាមជ្រូក
- ចំណាំ:** ពណ៌វាមានផ្សេងៗគ្នាចំពោះប្រភេទ ដែលគេបង្កាត់ពូជ ដូចជា ពណ៌ខៀវ ឬលឿង។ ប្រភេទសេះកដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាបេះបិទ ត្រូវបានការពារ (សាកសួរការពារបញ្ជាក់ ប្រសិនបើមិនច្បាស់)



Cacatua spp. - White Cockatoos

(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ) (ក្រុមសត្វសត្វ Cockatoos)

សត្វក្រហម (White Cockatoo)

- ឈ្មោះម្យ៉ាងទៀត:** Kakatua (ភាសាឥណ្ឌូនេស៊ី) White Cockatoo (ភាសាអង់គ្លេស)
- រាយការណ៍នៅ:** អូស្ត្រាលី ឥណ្ឌូនេស៊ី ប៊្រាហ្ស៊ីល ប៉ាពួញូហ្គីណេ ហ្វីលីពីន សិង្ហបុរី និងកោះសូលូម៉ុង
- លក្ខណៈរូបរាង:** ដងខ្លួនមានរោមពណ៌ស ឬពណ៌ផ្កាឈូកព្រលែត សត្វធំ-មធ្យមមានរោមកន្ទុយខ្លី រាងបួនជ្រុង និងចុងស្មាបរាងមូលទ្រវែង ។ សត្វព្យាបាលមានរាងប្រហាក់ប្រហែល គ្នា កំពស់ខ្ពស់រហូតដល់ ៥១ស.ម

ស្ថានភាពអភិរក្សអន្តរជាតិ:



មានបួនប្រភេទបានចុះក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ I អនុសញ្ញា ស្តីពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិលើប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិព្រៃ ដែលកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ (CITES) ប្រភេទផ្សេងទៀត ចុះក្នុងបញ្ជីឧបសម្ព័ន្ធ II សាយតេស ។

វិធានការការពារជាតិ(កម្ពុជា)

អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ លើប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិព្រៃដែលកំពុង រងគ្រោះថ្នាក់ ឆ្នាំ២០០៦ ។

លក្ខណៈពាណិជ្ជកម្ម: សត្វរស់ និងស្លឹក (បន្តដោយមនុស្ស) លក់ដូរធ្វើជាសត្វចិញ្ចឹម

លក្ខណៈសំគាល់: Cockatoo ទាំងបួនប្រភេទ ដែលបានចុះបញ្ជីក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ I សាយតេស:

Cacatua goffini Tanimbar Cockatoo  មានពណ៌ផ្កាឈូកនៅ ចន្លោះភ្នែក និងចំពុះ រង្វង់ភ្នែកពណ៌ស ផ្នែកខាងក្រោមស្មាប និងកន្ទុយពណ៌លឿង រាយការណ៍នៅ: ឥណ្ឌូនេស៊ី កំពស់: ៣២ស.ម	សេកង្វីលីពីន Cacatua haematuropygia Philippine Cockatoo  រោមក្រោមស្មាប និងកន្ទុយពណ៌លឿង រោមខាងក្រោម កន្ទុយពណ៌ក្រហម រាយការណ៍នៅ: ហ្វីលីពីន កំពស់: ៣១ស.ម
សេកកំប៉ែតលឿង Cacatua sulphurea Yellow-crested Cockatoo  មានកំប៉ែតលឿង មានរោមលឿងនៅលើ រោមក្រោមស្មាប និងកន្ទុយមានលឿងស្រអាប់ រាយការណ៍នៅ: ឥណ្ឌូនេស៊ី កំពស់: ៣៣ស.ម	Cacatua moluccensis Salmon-crested Cockatoo  មានកំប៉ែតពណ៌ផ្កាឈូកទឹកក្រូច កំប៉ែត ខាងក្រោមស្មាបពណ៌ផ្កាឈូកក្រហម មានរោមពណ៌សលាយពណ៌ផ្កាឈូក រាយការណ៍នៅ: ឥណ្ឌូនេស៊ី កំពស់: ៥០ស.ម



សេក Tanimbar Cockatoos ដាក់តាំងលក់នៅលើទីផ្សារ
Credit: Chris Shepherd / TSEA



សេកកំប៉ែតលឿង
Credit: Chris Shepherd / TSEA



សេកហ្វីលីពីន
Credit: Chris Shepherd / TSEA



សេក Moluccan Cockatoo
Credit: Chris Shepherd / TSEA

© TRAFFIC Southeast Asia 2008
Photo Credit: WWF-Campan/Lan ORAVEN

Drawings adapted from: Environment Canada

សូមអានបន្ថែមពីស្ថានភាពអភិរក្សតាមទំព័រវេបសាយ www.cites.org និង www.iucnredlist.org

មករា ២០០៨



Probosciger aterrimus - Palm Cockatoo

(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ) (សេក Palm Cockatoo)

សេក Palm Cockatoo

ឈ្មោះម្យ៉ាងទៀត: Kakatua raja, Kakatua hitam (ភាសាឥណ្ឌូនេស៊ី)

រាយការណ៍នៅ: ប្រទេសអូស្ត្រាលី ប្រទេសប៉ាពួញូនីថ កោះអារូ ឥណ្ឌូនេស៊ី និងប៉ាពួញូហ្គីណេ

លក្ខណៈរូបរាង: ប្រវែងក្បាល ទៅដងខ្លួន: ៥១-៦៤ស.ម

លក្ខណៈសំគាល់:




Image Adapted from: Environment Canada

លក្ខណៈស្រដៀងគ្នា:

- ពពួកសេក Black Parrots ដទៃទៀត
ស្ថិតក្នុងឧបសម្ព័ន្ធសាយតេស II
- មានប្រភេទនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីប៉ូណ្តោះ
 - មិនមានស្បែកមុខទេពណ៌ផ្កាឈូកក្រហម
 - មិនមានរោមស្លាបពណ៌ខ្មៅប្រផេះលាតស្មើ

- ពពួកសេក Black Parrots ដទៃទៀត
ស្ថិតក្នុងឧបសម្ព័ន្ធសាយតេស II
- សេកខ្មៅ មាននៅតែប្រទេសម៉ាដាហ្គាស្ការ កោះ Comoros និង Seychelles
 - មិនមានស្បែកមុខទេពណ៌ផ្កាឈូកក្រហម
 - មិនមានកំបោលដុះឆ្អឹង

ស្ថានភាពអភិរក្សវិទ្យាសាស្ត្រ:

- ស្ថិតក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ I នៃអនុសញ្ញាស្តីពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ លើប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិព្រៃដែលកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ (CITES)
- ជាប្រភេទដែលរងគ្រោះថ្នាក់តិចតួច (IUCN: LC)

កិច្ចការការព្រឹទ្ធវិទ្យាសាស្ត្រ:

ពុំមាននៅប្រទេសកម្ពុជាទេ ប៉ុន្តែត្រូវអនុវត្តអនុក្រឹត្យលេខ ៥៣ អនក្របក ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៦ ។



Credit: Mark Auliya/TSEA

លក្ខណៈពាណិជ្ជកម្ម:

សត្វរស់ និងស៊ីត សំរាប់លក់យកទៅចិញ្ចឹមកំសាន្ត



កូនសេក Palm Cockatoo កំពុងនៅក្នុងក្រឡា



សេក Palm Cockatoo ពេញវ័យ

Credit: Mark Auliya/TSEA

Eos spp. - Indonesian Lories

(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ)

(ក្រុមសេត Lory ឥណ្ឌូនេស៊ី)

ក្រុមសេត Lories ឥណ្ឌូនេស៊ី

ឈ្មោះផ្លូវភេទ : Nuri Sangir (Lory ក្រហម និងខៀវ ភាសាឥណ្ឌូនេស៊ី)

រាយការណ៍ : នៅភាគខាងកើតប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី

តំបន់ភាគ : មានប្រវែង២៤ ដល់ ៣១ស.ម

ស្ថានភាពអភិរក្សសត្វជាតិ :

ប្រភេទ *Eos histrio* ស្ថិតក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ I នៃអនុសញ្ញា CITES

ក្រៅពីនេះជាប្រភេទស្ថិតក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ II របស់អនុសញ្ញា CITES

បញ្ជីស្បែកសត្វ របស់អង្គការ IUCN ចាត់ថ្នាក់ជាប្រភេទរងគ្រោះថ្នាក់តិចតួច (LC)

កិច្ចការពារស្បែកសត្វ របស់អង្គការ IUCN ចាត់ថ្នាក់ជាប្រភេទរងគ្រោះថ្នាក់តិចតួច (LC)

អនុក្រឹត្យលេខ ០៥៣ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០០៦ ស្តីពី ការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម

អន្តរជាតិលើប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិព្រៃដែលកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ ។



Blue-streaked Lory
Credit: Chris Shepherd/TSEA

លក្ខណៈសម្គាល់ :

លក្ខណៈពាណិជ្ជកម្ម : សត្វរស់សម្រាប់តាំងលក់ និងយកទៅចិញ្ចឹមកំសាន្ត

Lory ក្រហម និងខៀវ (<i>Eos histrio</i>) ស្ថិតក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ I នៃអនុសញ្ញា CITES ស្បែកក្រហម របស់អង្គការ IUCN ជាប្រភេទកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ជិតផុតពូជ (EN) ក្បាល ១- មានស្លាកពណ៌ខៀវនៅខាងលើក្បាលផ្នែកខាងក្រោយថ្ពល (អាចប្រែប្រួលតាមឆ្នាំ) ខ្លួន ២- ស្លាកពណ៌ខៀវនៅលើជើងដើមទ្រូង កន្ទុយ ៣- កន្ទុយពណ៌ក្រហម ស្លាបស្វាយពេល 1. → 2. → 3. → រាយការណ៍ : តំបន់ Sangir និងកោះទាំងឡាយនៅក្នុងតំបន់ Talaud and Nanusa នៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី	Lory ក្រហម (<i>Eos bornea</i>) ស្ថិតក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ II នៃអនុសញ្ញា CITES ស្បែកក្រហម របស់អង្គការ IUCN ជាប្រភេទកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់តិចតួច (LC) ក្បាល ១- មានរោមពណ៌ខៀវនៅលើជើងដើមទ្រូង និងគ្មានរោមពណ៌ស្វាយនៅលើក្បាលទេ ខ្លួន ២- គ្មានរោម ពណ៌ខៀវនៅលើខ្លួនទេ ស្លាប ៣- រោមមានស្លាកដុំតូចនៅដើមស្លាបទាំងពីរ 1. → 2. → 3. → រាយការណ៍ : តំបន់ Moluccas ដែលមានប្រជុំកោះ Buru Seram កោះកែ Kai ប្រទេស ឥណ្ឌូនេស៊ី	Lory ត្រចៀកខៀវ (<i>Eos semilarvata</i>) ស្ថិតក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ II នៃអនុសញ្ញា CITES ស្បែកក្រហម របស់អង្គការ IUCN ជាប្រភេទកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់តិចតួច (LC) ក្បាល ១- មានរោមពណ៌ខៀវនៅលើផ្ទៃខាងក្រោមដុំតូចត្រចៀកចុះទៅបំពង់ក ខ្លួន ២- មានរោមពណ៌ខៀវនៅលើពោះ និងក្រោមគល់កន្ទុយ រាយការណ៍ : មាននៅតំបន់ Seram ប្រទេស ឥណ្ឌូនេស៊ី 1. → 2. →	Lory ក្រហមក្រហម (<i>Eos squamata</i>) ស្ថិតក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ II នៃអនុសញ្ញា CITES ស្បែកក្រហម របស់អង្គការ IUCN ជាប្រភេទកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់តិចតួច (LC) ក្បាល ១- មានរោមពណ៌ខៀវនៅលើជើងដើមទ្រូង ជុំវិញក្បាលប្រហែលជាបើកមើលមុខ ខ្លួន ២- រោមពណ៌ខៀវនៅលើពោះនិងក្រោមគល់កន្ទុយ 1. → 2. → រាយការណ៍ : ប្រជុំកោះភាគខាងជើងតំបន់ Moluccas និងក្រុមកោះភាគខាងលិច Papuan ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី	Lory ស្លាបខៀវ (<i>Eos cyanogenia</i>) ស្ថិតក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ II នៃអនុសញ្ញា CITES ស្បែកក្រហម របស់អង្គការ IUCN ជាប្រភេទរាយការណ៍ គ្រោះថ្នាក់ (VU) ក្បាល ១- មានរោមពណ៌ស្វាយខៀវដុះចេញពីភ្នែកទៅចំហៀងបំពង់ក ខ្លួន ២- រោមចំហៀងខ្លួន និងក្បាលពណ៌ខៀវ កន្ទុយ ៣- ស្លាបមានពណ៌ព្យាបាល - ប្រផេះ 1. → 2. → 3. → រាយការណ៍ : ប្រជុំកោះ Geelvink Bay តំបន់ភាគខាងលិច Papua ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី	Lory រោមស្លាបខៀវ (<i>Eos reticulata</i>) ស្ថិតក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ II នៃអនុសញ្ញា CITES ស្បែកក្រហម របស់អង្គការ IUCN ជាប្រភេទជិតទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ (NT) ក្បាល ១- រោមមានដុំពណ៌ស្វាយខៀវដុះចេញពីភ្នែកចុះទៅក្រោមក ខ្លួន ២- ផ្ទៃខាងលើដើមទ្រូងមានរូបគូរពណ៌ខៀវក្រម៉ៅ 1. → 2. → រាយការណ៍ : ក្រុមកោះ Tanimbar ប្រទេស ឥណ្ឌូនេស៊ី
---	--	--	--	---	--

Loriculus galgulus - Blue-crowned Hanging Parrot

(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ) (សេកកំដាយខ្សែវង់)

សេកកំដាយខ្សែវង់ Blue-crowned Hanging Parrot

ឈ្មោះម្យ៉ាងទៀត: Burung Serindit (ម៉ាឡេស៊ី)

រាយការណ៍នៅ: ប្រទេសប្រ៊ុយណេ ឥណ្ឌូនេស៊ី ម៉ាឡេស៊ី សិង្ហបុរី និងថៃ

លក្ខណៈរូបរាង: មានប្រវែង ១២ស.ម

លក្ខណៈសំគាល់:




Image Source: Environment Canada

លក្ខណៈស្រដៀងគ្នា:

សេកដទៃទៀត ស្ថិតក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ II នៃអនុសញ្ញា សាយតេស

- មិនមានកំពែងខ្មៅវង់ទេ
- មិនមានរោមបន្ទុះរាងត្រីកោណ ពណ៌មាសគ្របពិសេស

សេក Budgerigar

Melopsittacus undulatus

- ប្រវែង: ១៨ស.ម
- ប្រហែលជាបានចុះក្នុងបញ្ជីនៃ ក្រុមបក្សី Budgerigar



Image Source: Environment Canada

ស្ថានភាពអភិរក្សអន្តរជាតិ:

- ស្ថិតក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ II នៃអនុសញ្ញា ស្តីពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិលើប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិព្រៃ ដែលកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ (CITES)
- ជាប្រភេទដែលរងគ្រោះថ្នាក់តិចតួច IUCN: LC

កិច្ចការការថ្នាក់ជាតិ (កម្ពុជា)

ពុំមានវត្តមានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេ តែត្រូវអនុវត្តអនុក្រឹត្យលេខ ៥៣ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៦ ។



Credit: Lean Yen Yoong

លក្ខណៈពាណិជ្ជកម្ម: សត្វរស់ លក់ដូរធ្វើជាសត្វចិញ្ចឹមកំសាន្ត



Credit: Chris Shepherd / TSEA

Lorius garrulus - Chattering Lory

(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ) (សត្វ)

សត្វ Chattering Lory

ឈ្មោះម្យ៉ាងទៀត: Nuri Ternate (ភាសាឥណ្ឌូនេស៊ី)

រាយការណ៍នៅ:

- តំបន់ហាលម៉ាហោរ៉ា វ៉េដា កោះតឺណេត ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី *Lorius garrulus garrulus*
- តំបន់កោះ Bacan និងកោះអូប៊ី ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី *Lorius garrulus flavopalliatius*
- តំបន់កោះម៉ូរ៉ូតៃ និងកោះរ៉ូ ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី *Lorius garrulus morotaianus*

លក្ខណៈរូបរាង: មានប្រវែង ៣០សម

លក្ខណៈសំគាល់:




Image Source: Environment Canada (adapted)

Lorius garrulus garrulus:
មានរោមបន្ទុះរាំងគ្រប់ដណ្តប់ពណ៌លឿងដុះ លាយឡំតិចតួចខ្លួនជាមួយរោមបៃតង រោម បន្ទុះរាំងគ្រប់ដណ្តប់ខ្លួនពណ៌លឿងនេះមាន ទំហំប្រែប្រួល

Lorius garrulus flavopalliatius:
រោមបន្ទុះរាំងគ្រប់ដណ្តប់ខ្លួនពណ៌លឿងមាន ច្រើន ប៉ុន្តែរោមពណ៌បៃតងមានតិចជាងសេក ប្រភេទ *Lorius garrulus garrulus*

Lorius garrulus morotaianus:
រោមបន្ទុះរាំងគ្រប់ដណ្តប់ខ្លួនពណ៌លឿងតិច តួចដុះលាយឡំជាមួយនឹងរោមពណ៌បៃតង

លក្ខណៈស្រដៀងគ្នា:

សេកសម្រង់កលៀង (*Lorius chlorocercus*)
ស្ថិតក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ II នៃអនុសញ្ញាសាយតេស



ស្ថានភាពអភិរក្សវិទ្យាសាស្ត្រ:

- ស្ថិតក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ II នៃអនុសញ្ញា ស្តីពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ លើប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិព្រៃដែលកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ (CITES)
- IUCN: EN ជាប្រភេទកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ជិតផុតពូជ

អិច្វីការពាររដ្ឋាភិបាល (កម្ពុជា)

ពុំមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេ តែត្រូវអនុវត្តតាមអនុក្រឹត្យលេខ ៥៣ អន.ក្របក ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៦ ។



Credit: Chris Shepherd / TSEA

លក្ខណៈពាណិជ្ជកម្ម: សត្វសំលក់ដូរសំរាប់ចិញ្ចឹមកំសាន្ត



Credit: Chris Shepherd / TSEA



Kredit Foto: Mark Auliya / TSEA

Lorius lory – Black-capped Lory

(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ) (សេកទ្វីរីកំប៉ោយខ្មៅ)

សេកទ្វីរីកំប៉ោយខ្មៅ

ឈ្មោះផ្សេងទៀត : Black-capped Lory (អង់គ្លេស)

រចនាសម្ព័ន្ធ : មាននៅប្រទេសអេរីវ៉ាភាគខាងលិច, ឥណ្ឌូនេស៊ី, ប៉ាពួញូញីណេ

រចនាសម្ព័ន្ធ : ប្រវែងដងខ្លួន ៣១ ស.ម

ស្ថានភាពអភិរក្សអន្តរជាតិ : ស្ថិតក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ II នៃអនុសញ្ញាសាយតេស


ស្បៀងនៅក្នុងប្រភេទ : របស់អង្គការ IUCN ជាប្រភេទរងគ្រោះថ្នាក់តិចតួច LC

កិច្ចការការពារបច្ចុប្បន្នក្នុងប្រទេសកម្ពុជា : អនុវត្តអនុក្រឹត្យលេខ ៥៣ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០០៦ ស្តីពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិលើ ប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិព្រៃដែលកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់




ប្រភព: Lory Brent Stilton - Getty Images - WWF-UK

លក្ខណៈសម្គាល់ :



លក្ខណៈស្រដៀងគ្នា : ប្រភេទ *Lorius hypoinochrous* - Purple-bellied Lory ឧបសម្ព័ន្ធ II នៃអនុសញ្ញាសាយតេស Lory



លក្ខណៈនៃការជួញដូរ :



សេកទ្វីរីកំប៉ោយខ្មៅដែលតែងលក់នៅទីផ្សារ
Credit: Chris Shepherd/TSEA

សេកទ្វីរីកំប៉ោយខ្មៅ (Black-capped Lory)
ប្រភព: James Compton/TSEA

© TRAFFIC Southeast Asia 2008

Image Adapted from: Environment Canada

^a សូមអានបន្ថែមអំពីស្ថានភាពអភិរក្សនៅលើទំព័រវេបសាយ www.cites.org, www.iucnredlist.org and www.birdlife.org/datazone/search/species_search.html

Strigiformes - Owls

(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ) (ពួកខ្លែងស្រោក)

ពួកខ្លែងស្រោក (Owls)

ឈ្មោះផ្សេងទៀត : Burung Hantu (ភាសាឥណ្ឌូនេស៊ី និងម៉ាឡេស៊ី)

របាយរស់នៅ : មាននៅគ្រប់ទ្វីប លើកលែងតែ ទ្វីបអង់តាក់ទិច

គិតត្រឹម : កំពស់ ១៦-៨៤សម ប្រវែងស្បែក ៣៨-១៦០សម ទំងន់ ៤០ក-១,៨គក

ស្ថានភាពអភិរក្សអន្តរជាតិ :

គ្រប់ពួកខ្លែងស្រោកមានចុះក្នុងបញ្ជីឧបសម្ព័ន្ធ II នៃអនុសញ្ញា CITES លើកលែងតែ ៥ប្រភេទខាងក្រោម នេះដែលបានចុះបញ្ជីឧបសម្ព័ន្ធ I របស់អនុសញ្ញា CITES

Heteroglaux blewitti - Forest Owlet (India) ខ្លែងស្រោកព្រៃនៅឥណ្ឌា *Mimizuku gumei* - Giant Scops Owl (Philippines)

ខ្លែងស្រោកនៅហ្វីលីពីន *Ninox natalis* - Christmas Island Hawk-Owl (Christmas Island) ខ្លែងស្រោកនៅកោះគ្រីសម៉ាស

Ninox novaeseelandiae undulata - Boobook Owl (Norfolk Island) ខ្លែងស្រោកនៅកោះណូវហ្វុក *Tyto soumagnei* ខ្លែងស្រោកនៅម៉ាដាហ្គាស្ការ

កិច្ចការការពារស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា : ពួកខ្លែងស្រោកត្រូវបានការពារស្របតាមច្បាប់ ស្តីពី ព្រៃឈើ ឆ្នាំ ២០០២ និងការអនុវត្តអនុក្រឹត្យលេខ ៥៣អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០០៦ ស្តីពី ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិលើប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិព្រៃដែលកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ជិតផុតពូជ



Bubo sumatranus (Barred Eagle Owl)
Credit: Claire Beastall

លក្ខណៈសម្គាល់ :

មានរោមទន់
មានឥរិយាបថឈរត្រង់ទៅលើ
ក្បាលមូលហើយធំ
កន្ទុយខ្លី
មានជើងវែងដែលបង្ហាញដោយរោម
មានភាពវាងវៃអាចមើលពីមុខ និងក្រោយបានច្បាស់
សំបុរមានរឿងស្រអាប់ខ្លាំង
សំបុរមានរឿងស្រអាប់ខ្លាំង



ចំណាំ :
កូនសត្វខ្លែងស្រោក
ពិបាកវិនិច្ឆ័យណាស់



Credit: Chris Shepherd/TSEA

លក្ខណៈពាណិជ្ជកម្ម : សត្វនៅរស់ និងកូនសត្វប្រើសំរាប់ធ្វើឱសថបូរាណ និងយកទៅសម្លែងឆាកនិមិត្ត



ប្រភេទ *Tyto alba* ត្រូវបានតាំង
និងដាក់លក់នៅក្នុងទីផ្សារ
ប្រភព : Chris Shepherd/TSEA



ប្រភេទ *Ninox scutulata*
ដែលបានតាំងលក់នៅទីផ្សារ
ប្រភព : Chris Shepherd/TSEA




ប្រភេទ *Ketupa ketupu*
ដែលបានតាំងលក់នៅទីផ្សារ
ប្រភព : Chris Shepherd/TSEA

Alligators & Caiman (អាស៊ីកាទី និងខេមែន (ក្រពា-ក្រពើនេវអាមេរិកខាងត្បូង))


ក្រពើអាស៊ីកាទី និង ខេមែន

មានឆ្មេរទីបួននៃផ្តាមក្រោមបាំងនៅក្នុងរន្ធផ្ទៃពេញនៃផ្តាមលើ នៅពេលវាបិទមាត់



ក្រពើ

មានឆ្មេរទីបួននៃផ្តាមក្រោម គេអាចមើលឃើញដោយវាបិទនៅក្នុងខាងក្រៅ នៃផ្តាមលើនៅពេលវាបិទមាត់



ក្រពើអាមេរិក

Alligator mississippiensis

CITES II: ក្រពើប្រភេទ *Alligator mississippiensis*

ស្ថិតក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ - II នៃអនុសញ្ញាសាយតេស


បញ្ជីក្រហមរបស់អង្គការ **IUCN: LC** ជាប្រភេទរងគ្រោះថ្នាក់តិចតួច

ឈ្មោះផ្សេងទៀត : American Alligator, Gator (អង់គ្លេស)


របាយរស់នៅ : សហរដ្ឋអាមេរិក

តំណភាគ : ប្រវែងដងខ្លួនមានរហូតដល់ ៦ ម ជាមួយប្រវែង ៤.៨ ម

សកានៅតាមក្រឡាទទឹងដង
ខ្លួនមានពី ៨ ទៅ ១០ ស្រកា



មានបន្ទះស្បែកនៅតាម
ចន្លោះម្រាមជើង



ស្រកា ធំៗចេញ
ជាចំរុះពីគ្នា

នៅលើក្បាលមានស្រកាដូច
ជំរុំប្រដាប់ ២-៣ ជួរទទឹង

ផ្នែកខាងលើច្រមុះមិន
មានទ្រនុងទេ

នៅលើក្បាលមានស្រកាដូច
ជំរុំប្រដាប់ ២-៣ ជួរទទឹង

- កែវភ្នែកពណ៌បៃតងខ្ចី

ក្រពើចិន

Alligator sinensis

CITES I: ក្រពើប្រភេទ *Alligator sinensis*

ស្ថិតក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ - I នៃអនុសញ្ញាសាយតេស


បញ្ជីក្រហមរបស់អង្គការ **IUCN: CR** ជាប្រភេទកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ឈាន
ទៅរកការវិនាសផុតពីបំផុត

ឈ្មោះផ្សេងទៀត : Chinese Alligator, Yangtze Alligator
(អង់គ្លេស) អ៊ីយ៉ូ, ទូ, ទូលុង, យ៉ូវ៉ាឡាំង


របាយរស់នៅ : ប្រទេសចិន (ខេត្តអានអ៊ី, ជាំងស៊ូ, ជីហ្គាំង)

តំណភាគ : ប្រវែងដងខ្លួនមានរហូតដល់ ១.៨ ម

ស្រកានៅតាមក្រឡាទទឹងដង
ដងខ្លួនមាន ៦ ស្រកា



គ្មានបន្ទះស្បែកនៅតាម
ចន្លោះម្រាមជើង



ស្រកាធំៗ
ដូចជាប្រដាប់

នៅលើក្បាលមានស្រកាដូចជំរុំប្រដាប់មួយជួរ

មានទ្រនុងនៅផ្នែកខាងលើច្រមុះ

- កែវភ្នែកពណ៌ត្នោតខ្ចី

នៅលើក្បាលមានស្រកាដូច
ជំរុំប្រដាប់ ២-៣ ជួរទទឹង

ក្រពើខេមែន

Caiman crocodilus

CITES II: ក្រពើប្រភេទ *Caiman crocodilus*

ស្ថិតក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ - II នៃអនុសញ្ញាសាយតេស



បញ្ជីក្រហមរបស់អង្គការ **IUCN: LR** ជាប្រភេទរងគ្រោះថ្នាក់តិចតួច

ឈ្មោះផ្សេងទៀត : Spectadled Caiman, Common Caiman (ភាសាអង់គ្លេស)

របាយរស់នៅ : ប្រទេសប្រេស៊ីល, កូឡុំប៊ី, កូស្តារីកា, អេក្វាទ័រ, អែសសាវ៉ាដា
ប្រូង់ហ្គីយ៉ាណា, ហ្គាតេម៉ាឡា, ហ្គុយយ៉ាណា, ហុងដុយរ៉ាម, មិចស៊ិកូ, នីកាវ៉ាហ្គា,
ប៉ាណាម៉ា, ប៊េរី, ស៊ីរីនាម, ទ្រីណីដាត និងតូចាហ្គូ, វេណេហ្គុយអេឡា

តំណភាគ : ប្រវែងដងខ្លួនមានរហូតដល់ ២.៧ ម

ស្រកានៅតាមក្រឡាទទឹងដង
ខ្លួនមានពី ៨-១០ ស្រកា



ស្រកាធំៗ ដូច
តំរូវប្រដាប់ជាបួនជួរ

នៅលើក្បាលមានស្រកាដូច
តំរូវប្រដាប់ ២-៤ជួរ

មានដុំកក់តូចមួយ
នៅលើត្របកភ្នែក

ស្រកាធំៗ ដូច
តំរូវប្រដាប់ ២-៣ ជួរទទឹង

មានទ្រនុងនៅផ្នែកខាងលើច្រមុះ

នៅខាងក្រោមមានស្រកាមួយជួរ

Crocodylus novaeguineae & Crocodylus mindorensis

Crocodylus novaeguineae (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ)

New Guinea Crocodile ក្រពើព្នូហ្គីណេ

ស្ថិតក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ II របស់អនុសញ្ញា CITES


ស្បៀវកៅក្រហមរបស់អង្គការ IUCN ជាប្រភេទរងគ្រោះថ្នាក់តិចតួច **LC**

ឈ្មោះផ្សេងទៀត : New Guinea Crocodile (អង់គ្លេស) Buaya air tawar, Pukpuk, Wahne huala (ភាសាឥណ្ឌូ ណេស៊ី និងប៉ាពួញូហ្គីណេ)

រងាយរស់នៅ : ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី (ភាគខាងលិច Irian) ប្រទេសប៉ាពួញូហ្គីណេ

គិលកាគ : មានប្រវែងរហូតដល់ ៣,៥ម៉ែត្រ

លក្ខណៈសម្គាល់ :



Crocodylus mindorensis (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ)

Philippine Crocodile ក្រពើហ្វីលីពីន

ស្ថិតក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ I របស់អនុសញ្ញា CITES


ស្បៀវកៅក្រហមរបស់អង្គការ IUCN កំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ឈានទៅរកការវិនាសផុតពីបំផុត **CR**

ឈ្មោះផ្សេងទៀត : Philippine Crocodile (ជាភាសាអង់គ្លេស)

រងាយរស់នៅ : ប្រទេសហ្វីលីពីន

គិលកាគ : មានប្រវែងរហូតដល់ ៣ម

លក្ខណៈសម្គាល់ :



កិច្ចការការពារស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា :
ត្រូវអនុវត្តអនុក្រឹត្យលេខ ០៥៣ អនក្រ.បក
ចុះថ្ងៃទី ២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០០៦ ។

សក្ខីភាពពាណិជ្ជកម្ម : ពាណិជ្ជកម្មលើស្បែក
និងសត្វរស់ត្រូវបានសម្រាប់ការយក
ទៅចិញ្ចឹមកំសាន្ត និងធ្វើវិវិប្បកម្ម



ស្បែកក្រពើដែលដាក់តាំងលក់
ប្រភព : Traffic Southeast Asia

Crocodylus porosus & Crocodylus siamensis

(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ ក្រពើទឹកស្វយ័ត និងក្រពើឆ្នាំង)

ក្រពើទឹកស្វយ័ត Crocodylus porosus

ស្ថិតក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ I នៃអនុសញ្ញា CITES

លើកលែងតែប្រភេទនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី ឥណ្ឌូនេស៊ី និងប៉ាពួញូហ្គីណេ ដែលស្ថិតនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ II នៃ CITES


បញ្ជីក្រហម របស់អង្គការ IUCN ជាប្រភេទរងគ្រោះថ្នាក់តិចតួច LC

ឈ្មោះផ្សេងទៀត : Estuarine crocodile, Saltwater crocodile (ភាសាអង់គ្លេស) Buaya muara (ភាសាឥណ្ឌូនេស៊ី) Baya Pukpuk (ភាសាប៉ាពួញូហ្គីណេ) Jara Kaenumkem (ថៃ)

រង្វាយសំនេរ : ប្រទេសអូស្ត្រាលី, បង់ក្លាដេស, ប្រូយណេ, កម្ពុជា, ឥណ្ឌា, ឥណ្ឌូនេស៊ី, ម៉ាឡេស៊ី, ភូមា, ប៉ាឡូ, ប៉ាពួញូហ្គីណេ, ហ្វីលីពីន, សិង្ហបុរី, កោះសូឡូម៉ុង, ស្រីលង្ការ, ថៃ, វ៉ាណូឌូ និងវៀតណាម

គិលាន : ប្រវែងរហូតដល់ ៧ ម៉ែត្រ

លក្ខណៈសម្គាល់ :



ក្រពើឆ្នាំង Crocodylus siamensis

ស្ថិតក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ I នៃអនុសញ្ញា CITES


បញ្ជីក្រហមរបស់អង្គការ IUCN ចាត់ជាប្រភេទរងគ្រោះថ្នាក់ឈានទៅរកការវិនាសផុតពីជម្រក CR

ឈ្មោះផ្សេងទៀត : Siamese crocodile (អង់គ្លេស) Buaya Kodok (ឥណ្ឌូនេស៊ី) Jara Kaenumchued (ភាសាថៃ)

រង្វាយសំនេរ : មាននៅប្រទេសកម្ពុជា, ឥណ្ឌូនេស៊ី, (កាលីម៉ាន់តាន់), ប្រទេសឡាវ, ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី, (តំបន់សារ៉ាវ៉ាក់) ប្រទេសថៃ និងវៀតណាម

គិលាន : មានប្រវែងរហូតដល់ ៤ ម៉ែត្រ

លក្ខណៈសម្គាល់ :



កិច្ចការការពារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា :

ក្រពើត្រូវបាន ការពារដោយច្បាប់

ជលផល ឆ្នាំ ២០០៦

លក្ខណៈធ្វើពាណិជ្ជកម្ម :

ធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ ស្បែកនិងសត្វរស់ដាក់លក់សម្រាប់យកទៅ ចិញ្ចឹម



កូនក្រពើដែលដាក់លក់នៅលើទីផ្សារ

ប្រភព : TRAFFIC Southeast Asia



កាបូបដែលធ្វើពីស្បែកក្រពើ

ប្រភព : Mark Auliya

Tomistoma schlegelii - False Gharial

(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ) (ក្រពើ Gharial)

ក្រពើ Gharial

ឈ្មោះផ្សេងទៀត : Tomistoma (ភាសាអង់គ្លេស)

Buaya sumpit ឥណ្ឌូនេស៊ី Julong ម៉ាឡេស៊ី Takong ថៃ

របាយការណ៍ : ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី (កោះកាលីម៉ាន់តាន់, ស៊ូមាត្រា) ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី (ម៉ាឡេកណ្តាល និងសារ៉ាវ៉ាក់)

ភិក្ខុភាគ : មានប្រវែងរហូតដល់ ៥ម៉ែត្រ

ស្ថានភាពអភិរក្សសត្វ : “

ស្ថិតក្នុងបញ្ជីឧបសម្ព័ន្ធ របស់អនុសញ្ញា CITES ស្បែកក្រហម របស់អង្គការ ជណ្តើរ ជាប្រភេទកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ជិតផុតពូជ (ណែ)

កិច្ចការពារស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា :

ច្បាប់ ស្តីពី ជលផលឆ្នាំ ២០០៦ អនុក្រឹត្យលេខ ០៥៣ អនក្រ.ប.ក ចុះថ្ងៃទី ២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០០៦ ស្តីពីការ ធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិលើប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិព្រៃ ដែលកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់



Credit: Mark Auliya

លក្ខណៈសម្គាល់ :




Credit: Mark Auliya/TSEA

- មានស្មាមខ្មៅជានៅជាប់ជាមួយនឹងពណ៌ត្នោតបៃតងពីក្រ អូមមាត់ទៅកន្ទុយ (ស្មាមជាំអាចប្រែតាមអាយុរបស់វា)



ភ្នែកមានពណ៌លឿងត្នោត

Credit: Mark Auliya/TSEA



មានចំណុចតូចៗស្ទើរគ្នា

មានស្រកាធំមួយជួរនៅត្រង់បំពង់ក

មានស្រកាចំនួន ១៧ នៅជួរចុងកន្ទុយ

មានស្រកាមូល ឬ រាងពងក្រពើនៅចំហៀងពោះ

មានស្រកាតូចៗពីរជួរ



មានស្រកាធំៗបីជួរ



មានធ្មេញពី ១៩-២០ នៅលើក្រអូមផ្តាមខាងក្រោម

លក្ខណៈពាណិជ្ជកម្ម :

សត្វសំស្រាប់ទិញយកទៅចិញ្ចឹម ភាគច្រើនកូនតូចៗ



កូនក្រពើ Gharial

ប្រភព : WWF-Canon / Alain COMPOST



ក្រពើ អហារិល ញីពេញវ័យ

ប្រភព : Claire Beastall

Image Source: Environment Canada

“ សូមអានបន្ថែមអំពីស្ថានភាពអភិរក្សនៅលើទំព័រវេបសាយ www.cites.org និង www.iucnredlist.org

ឧសភា ២០០៨



Uromastyx spp. - Spiny-tailed Lizards

បង្ហាញក្នុងបន្ទាត់ Spiny-tailed Lizards

ឈ្មោះផ្សេងទៀត : Dab Lizard, Mastigure (អង្គក្ដើស)

រាយ : ប៉ែកពាយ័ព្យប្រទេសឥណ្ឌា ដល់ អាស៊ីនីរតី និងឧបទ្វីប
អាវ៉ាប៉េ ដល់សមុទ្រខ្សាច់សាហារាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិក។

លក្ខណៈរូបរាង : បណ្តោយប្រវែងរហូតដល់៩១.៥សម

ស្ថានភាពអភិរក្សអន្តរជាតិ :

ប្រភេទទាំងអស់ក្នុងស្ថាន Uromastyx spp.
ចុះក្នុងបញ្ជីអនុសញ្ញា CITES ឧបសម្ព័ន្ធ II

បញ្ជីក្រហម IUCN : ប្រែប្រួលពីកំពុងរងគ្រោះ
ថ្នាក់ឈានទៅកាការីនាសផុតពីបំផុត
ដល់រងគ្រោះថ្នាក់តិចតួច


កិច្ចការពារថ្នាក់ជាតិ :

អនុក្រឹត្យលេខ៥៣ ន ក្រ ប ក (ថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា
ឆ្នាំ២០០៦) ស្តីពីពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិលើប្រភេទសត្វ



Credit: Mark Auliya/TSEA

លក្ខណៈសំគាល់ :



ចន្លោះពីរនូវច្រមុះ
ទៅចុងច្រមុះខ្លី

- រាងសំប៉ែត កន្ទុយមានបន្ទាត់
- ខ្នងសំប៉ែត
- អាចមានផ្នត់ស្បែកតាមតែម្តង



Credit: Mark Auliya/TSEA

ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម :

សត្វរស់សម្រាប់ធ្វើជាសត្វចិញ្ចឹម ហើយក៏សម្រាប់ធ្វើឱសថបុរាណផងដែរ



Credit: Mark Auliya/TSEA

ស្រដៀងទៅនឹង :

កន្ទ្រង់កន្ទុយបន្ទា នៅទ្វីបអាមេរិក
និងម៉ាដាហ្គាស្ការ

មិនបង្ហាញគ្រប់លក្ខណៈសំគាល់ទាំង
អស់ ដែលចុះក្នុងបញ្ជីខាងលើ



Credit: Anthony B. RATH/WWF-Canon

បង្កួយអូស្ត្រាលី

មិនបង្ហាញគ្រប់លក្ខណៈសំគាល់ទាំង
អស់ ដែលចុះក្នុងបញ្ជីខាងលើ



Credit: Claire Beastall



Credit: Mark Auliya/TSEA

Phelsuma spp. - Day Gecko species

ប្រភេទត្រីក្រពើថ្ងៃ Day Gecko species

ឈ្មោះផ្សេងទៀត :

រាយ : កោះអាន់ដាម៉ាន់ (ឥណ្ឌា) កោះកូម៉ូរ៉ូ កេនយ៉ា ម៉ាដាហ្កាស្កា មូរីទីយ៉ា រីនីយ៉ុង រ៉ុងវីឌី សេឡេស តាន់ហ្សានីយ៉ា

លក្ខណៈរូបរាង : បណ្តោយខ្លួនប្រវែង ៧.៦-៣០.៥សម

ស្ថានភាពអភិរក្សអន្តរជាតិ : “

ប្រភេទទាំងអស់ក្នុងស្ថាន *Phelsuma spp.*

ចុះក្នុងអនុសញ្ញា **CITES** ឧបសម្ព័ន្ធ II

បញ្ជីក្រហម IUCN : ប្រែប្រួលពីកំពុងរងគ្រោះ

ថ្នាក់ឈានដល់ការវិនាសផុតពីបំផុត

ដល់ប្រភេទរងគ្រោះថ្នាក់តិចតួច

កិច្ចការពារថ្នាក់ជាតិ :

អនុក្រឹត្យលេខ៥៣ ន ក្រ ប ក (ថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៦)

ស្តីពីពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិលើប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិព្រៃរងគ្រោះថ្នាក់




Credit: Eugène Bruins

លក្ខណៈសំគាល់ :


- ភាគច្រើនមានពណ៌ភ្លឺ ជាទូទៅមានពណ៌បៃតង
- ភាគច្រើនមានសកម្មភាពនៅពេលថ្ងៃ ភ្លែតចំ និងមានរន្ធប្រស្រីខ្មៅ និងមូល
- ម្រាមជើងក្នុងរួមតូច

ភ្នែកធំ និងមានរន្ធប្រស្រីខ្មៅ និងមូល



Credit: Eugène Bruins

ម្រាមជើងក្នុងរួមតូច




Credit: Eugène Bruins

ស្រដៀងទៅនឹង :


ត្រីក្រពើស្រុក

- ជាទូទៅមានពណ៌ស្រអាប់
- ភាគច្រើនមានសកម្មភាពនៅពេលយប់
- រន្ធប្រស្រីភ្នែកមិនមូល
- ម្រាមជើងក្នុងមិនរួមតូច



Leopard Gecko (*Eublepharis macularius*). Credit: Mark Auliya/TSEA

រន្ធប្រស្រីភ្នែកមិនមូល



Tokay Gecko (*Gekko gekko*). Credit: Mark Auliya/TSEA

ម្រាមជើងក្នុងមិនរួមតូច

ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម :

សត្វរស់ សម្រាប់ជាសត្វចិញ្ចឹម



អាចជ្រើសរើសប្រភេទក្នុងស្ថាន *Phelsuma spp.* សម្រាប់ទិញក្នុងហាងលក់សត្វចិញ្ចឹម

Credit: Mark Auliya/TSEA



Phelsuma quadricellata តាំងលក់នៅហាងលក់សត្វចិញ្ចឹម

Credit: Mark Auliya/TSEA

Gekko gekko - Tokay Gecko

(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ) (តុកកែ)


តុកកែ (Tokay Gecko)

ឈ្មោះម្យ៉ាងទៀត:

រាយរស់នៅ : រស់នៅគ្រប់ទីកន្លែងនៃតំបន់អាស៊ីត្រូពិកភាគខាងកើត ។

លក្ខណៈរូបរាង: ប្រវែងទាំងមូល ២០-៤០ស.ម ទំងន់: ១៥០-៣០០ក្រាម

លក្ខណៈសំគាល់:



Credit: Mark Auliya / TSEA

លក្ខណៈសំគាល់:

- ប្រភេទតុកកែផ្សេងទៀតមិនមានពណ៌អុជទឹកក្រូចទេ
- តុកកែនេះជាប្រភេទដែលធំគេបំផុត

ស្ថានភាពអភិរក្សអន្តរជាតិ:

គ្មាន

កិច្ចការការថ្លាក់ជាតិ:

ប្រកាសលេខ២០២០ ប្រក.កសក របស់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ស្តីពីចំណាត់ថ្នាក់ និងបញ្ជីឈ្មោះប្រភេទសត្វព្រៃ ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ។



Credit: Mark Auliya / TSEA

លក្ខណៈពាណិជ្ជកម្ម: ហាសថ្លៃក្រៀម ឬត្រាំទឹករាវសំរាប់ប្រើធ្វើជាឱសថបុរាណ



តុកកែ Tokay សំរាប់ធ្វើជាឱសថបុរាណ
Credit: TRAFFIC Southeast Asia



តុកកែ Tokay ត្រាំទ្រោ
Credit: TRAFFIC Southeast Asia



តុកកែ Tokay សំរាប់ធ្វើជាឱសថបុរាណ
Credit: TRAFFIC Southeast Asia



តុកកែ Tokay សំរាប់ធ្វើជាឱសថបុរាណ
Credit: Mark Auliya / TSEA



Varanus spp. - Monitor Lizard spp.

(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ) (ក្រុមសត្វត្រកូត)

ក្រុមសត្វត្រកូត :

ឈ្មោះផ្សេងៗទៀត : Biawak (ភាសាម៉ាឡេស៊ី) សត្វត្រកូត Monitor lizard (អង់គ្លេស)

រាយការណ៍សំនុំ : តំបន់អាហ្វ្រិក, អាហ្វ្រិក, អាស៊ីខាងត្បូង, អាស៊ីអាគ្នេយ៍, ឥណ្ឌាខាងកើត, អូស្ត្រាលី, ម៉ាសហ្សង់, ខាហ្គីណូ និងប្រទេសហ្វីលីពីន

តំណភ្ជាប់ : មានប្រវែងពី ១៥ស.ម ទៅ ៣ម៉ែត្រ

ស្ថានភាពអភិរក្សវិទ្យាសាស្ត្រ : ជាប្រភេទសត្វក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ II របស់អនុសញ្ញា CITES លើកលែងតែប្រភេទ *Varanus bengalensis*, *V. flavescens*, *V. griseus*, *V. komodoensis*, *V. nebulosus* ដែលស្ថិតនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ I របស់អនុសញ្ញា CITES

បញ្ជីក្រុមរបស់អង្គការសហភាពអភិរក្សធម្មជាតិពិភពលោក IUCN មានតែប្រភេទប៉ុណ្ណោះ គឺ *V. komodoensis*, *V. olivaceus* ជាប្រភេទងាយរងគ្រោះថ្នាក់ (VU) និងប្រភេទ *V. flavescens* ជាប្រភេទកំពុងជួបការប្រថុយប្រថាន (LR)

កិច្ចការការស្របច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា : ក្រុមសត្វត្រកូតត្រូវបានការពារក្រោមច្បាប់ស្តីពី ព្រៃឈើ ឆ្នាំ ២០០២ និងអនុក្រឹត្យលេខ ០៥៣ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០០៦ ស្តីពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិលើប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិព្រៃដែលកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ ។



Credit: Mark Auliya

លក្ខណៈសម្គាល់ :



អាចមើលឃើញត្រចៀកបើកចំហ

មានអណ្តាតព្រែកជាពីររាងដូចមុខសម

អន្សូងចាស់ (ពេញវ័យ) *Varanus salvator* Credit: Claire Beastall



អន្សូងពេញវ័យ Credit: Claire Beastall

- មានសាច់ដុំក្នុង
- អវយវៈដៃជើងខ្លាំង និងក្រចកស្រួច
- មានកវែង
- ក្បាលរៀងស្អាត និងច្រមុះមានរន្ធច្រូង

លក្ខណៈពាណិជ្ជកម្ម :




ស្បែកខ្លះត្រកូតដែលផលិតជាធាតុរយៈកែវពង្រីកទំហំស្រកាជាក់ស្តែង : សត្វពេញវ័យមានទំហំ ១មម សត្វចាស់មានទំហំពី ២-៣មម

ត្រកូតបៃតង *Varanus prasinus* ដែលមាននៅប្រទេសអូស្ត្រាលី ឥណ្ឌូនេស៊ី (ខាងលិច Irian) និងប្រទេសប៉ាពួហ្គីណូត្រូវបានគេរកឃើញមានការលក់



Credit: Mark Auliya/TSEA

ស្បែករបស់អន្សូង *Varanus salvator* ត្រូវបានគេឃើញមានលក់ជាសាធារណៈ ទីផ្សារ



ស្រកាដែលមានលក្ខណៈរីករួមដូចជាទ្រូងរីករួមស្រកាតូច ដែលមើលឃើញនៅលើស្បែកខ្លះរបស់សត្វ



អន្សូងដែលដាក់ត្រាំក្នុងស្រា Credit: Claire Beastall



ស្បែកជើងដែលធ្វើពីស្បែកសត្វត្រកូត Credit: TRAFFIC Southeast Asia



សត្វអន្សូងដែលដាក់តាំងលក់ Credit: Mark Auliya

Ptyas mucosus - Oriental Rat Snake

(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ)

(ពស់ព្រៃ)

ពស់ព្រៃ (Oriental Rat Snake):

ឈ្មោះផ្សេងទៀត : Banded Ratsnake (ភាសាអង់គ្លេស)

រចនាសម្ព័ន្ធ : មាននៅប្រទេសអាហ្វហានីស្ថាន, បង់ក្លាដេស, កម្ពុជា, ចិន, ឥណ្ឌា, ឥណ្ឌូនេស៊ី, អ៊ីរ៉ង់, ឡាវ, នេប៉ាល់, ម៉ាឡេស៊ី, ភូមា, ប៉ាគីស្ថាន, តៃវ៉ាន់, ថៃ, វៀតណាម

តំបន់ : មានប្រវែង ៣២០ស.ម

ស្ថានភាពអភិរក្សសត្វ : :

ស្ថិតក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ II របស់អនុសញ្ញា CITES
ស្បែកនៅក្រុមហ៊ុនរបស់អង្គការ IUCN ពុំមានចុះក្នុងបញ្ជី
របស់អង្គការ IUCN ទេ

កិច្ចការការពារប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់ : :

ប្រភេទនេះត្រូវបានការពារក្រោមច្បាប់ ស្តីពីព្រៃឈើ ឆ្នាំ ២០០២
(អនុក្រឹត្យលេខ ៥៣-២០០៦)




ពស់ព្រៃ (Ptyas mucosus)
ប្រភព : Mark Auliya/TSEA

លក្ខណៈសម្គាល់ :



មានក្រឡាវង្សនៅលើខ្នង
(ពិតជាមើលនៅពេលសត្វនៅទីនីមួយៗ)
ស្បែកនៅជុំវិញមាត់មានខ្សែឆ្នុត



ស្បែកនៅជុំវិញមាត់
មានខ្សែឆ្នុត

ស្រដៀងគ្នាទៅនឹង : Ptyas korros – Indochinese Rat Snake ពស់ព្រៃតំបន់ឥណ្ឌូចិន



ពុំមានក្រឡាវង្ស
នៅលើខ្នងទេ



ស្បែកជុំវិញមាត់ពុំមាន
ក្រឡាឆ្នុតទេ

របាយការណ៍ : ប្រទេសបង់ក្លាដេស កម្ពុជា ចិន ឥណ្ឌា ឥណ្ឌូនេស៊ី ឡាវ ម៉ាឡេស៊ី ភូមា សិង្ហបុរី តៃវ៉ាន់ ថៃ និងប្រទេសវៀតណាម

លក្ខណៈពាណិជ្ជកម្ម : ស្បែក សាច់ និងប្រមាត់ ត្រូវបានដាក់តាំងលក់សម្រាប់យកទៅធ្វើឱសថបូរាណ



ការប្រើប្រាស់ស្បែកស្បែកពស់ព្រៃ
(Ptyas mucosus leather)
ប្រភព : Mark Auliya/TSEA



ស្បែកពស់ព្រៃ (Ptyas mucosus)
ប្រភព : Mark Auliya/TSEA



សាច់ពស់ព្រៃ (Ptyas mucosus meat)
ប្រភព : Mark Auliya/TSEA



ប្រមាត់ពស់ព្រៃ (Ptyas mucosus gall bladders)
ប្រភព : Mark Auliya/TSEA

Ophiophagus, Naja spp. - Cobras

(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ) (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ) (ក្រុមពស់វែក)


ក្រុមពស់វែក Cobras

ឈ្មោះផ្សេងទៀត :

រោងរស់នៅ : មាននៅទូទាំងអាហ្វ្រិក និងទ្វីបអាស៊ី

តំបន់ភាគ : ប្រវែងដងខ្លួនមានរហូតដល់ ៥៨៥ ស.ម

លក្ខណៈសំគាល់ :



ប្រភព: Mark Auliya

ក្រុមពស់វែក ពស់ស្រកាចាស់ ពស់ផ្កាថ្មសមុទ្រ មានទីតាំងភ្នែក និងរន្ធច្រមុះនៅជិតគ្នាជាង ក្រុមពស់ផ្សេងទៀត

បាត់ស្រកាចនោះភ្នែក និងច្រមុះ ចំពោះពពួកពស់វែក ពស់ស្រកាចាស់ និងពស់ផ្កាថ្មសមុទ្រ



រូបភាព: US Fish and Wildlife

មានតែក្រុមពស់វែកប៉ុណ្ណោះដែល អាចធ្វើឱ្យក្រពើបង្ហាញសំបើត ឬ ដែលហៅថាបើកវែកតាមរបៀប ដូចក្នុងរូបភាពនេះ



ពស់ពពួកក្រពើ ធ្វើត្រាប់តាមពស់វែកដោយ ធ្វើឱ្យក្រពើបង្ហាញសំបើត តាមរបៀបដូចក្នុងរូបភាពនេះ

ប្រភព: Claire Beastall



ពស់វែកក្របីមានស្នាមត្រារាងជាអក្សរ O ស្ថិតនៅផ្នែកខាងខ្នងតំបន់ ក្បាលត្រង់កញ្ជើងក ឬ ជួនកាលជាអក្សរ U ឬន្ន័ស្នាមនេះភាគច្រើន ប្រភព: Mark Auliya



ប្រភព: Mark Auliya

ពស់វែករនាមមានស្រកា ក្រឡាធំៗនៅត្រង់តំបន់ក្បាល

ស្ថានភាពអភិរក្សអន្តរជាតិ :

ឈ្មោះផ្សេងទៀត : ប្រភេទពស់វែកនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ខាងក្រោមនេះ

ត្រូវបានចុះ បញ្ជីក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ II នៃអនុសញ្ញាសាយតេស :

Ophiophagus hannah (King Cobra), ពស់វែករនាម

Naja kaouthia (Monocellate Cobra), ពស់វែកក្របី

Naja mandalayensis (Burmese Spitting Cobra),

Naja philippinensis (Northern Philippine Cobra),

Naja samarensis (Southeastern Philippine Cobra),

Naja siamensis (Indochinese Spitting Cobra), ពស់វែកដំបូក

Naja sputatrix (Javan Spitting Cobra),

Naja sumatrana (Equatorial Spitting Cobra)

ពុំមានចុះក្នុងបញ្ជីក្រហមរបស់អង្គការ IUCN: ទេ

អិច្វីតារពារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា : ក្រុមពស់វែកនៅប្រទេសកម្ពុជា

ត្រូវបានការពារក្រោមច្បាប់ ស្តីពីព្រៃឈើ ឆ្នាំ២០០២



Naja sputatrix (Javan Spitting Cobra)
Credit: Mark Auliya

ប្រភេទនៃការថ្លងថ្លុះ : ស្បែក សាច់ ប្រមាត់ សម្រាប់ផលិតជាឱសថបុរាណ



ពស់វែកដែលគេកំពុងបកស្បែក



ពស់វែករនាមដែលគេកំពុងសរកយកយោង



សំណាកពស់វែកដែលគេ តាំងលកនៅលើទីផ្សារ



ស្បែកពស់វែក



ប្រមាត់ពស់វែកស្រស់



ប្រមាត់ពស់វែកដែលគេបោសស្អាត

All photographs credit to: Mark Auliya/TSEA

Pythonidae – Pythons

(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ)

(ពួកពស់ខ្លាំង)

ពួកពស់ខ្លាំង (Pythons)

ឈ្មោះផ្សេងៗទៀត : Pythons (ភាសាអង់គ្លេស)

របាយរស់នៅ : មាននៅតំបន់អាហ្វ្រិក អាស៊ី និងអូស្ត្រាលី
(មានរស់នៅតែក្នុងប្រទេស ដែលមានច្រើនយូរគ្នាទេ ។

កំណើត : ប្រវែងរហូតដល់ ១០ ម

កិច្ចអភិរក្សសត្វ : “

ប្រភេទដែលស្ថិតក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ II របស់អនុសញ្ញាសាយតេស លើកលែងតែប្រភេទ
ពស់ខ្លាំង ឥណ្ឌា *Python molurus molurus* ដែលបានចុះក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ I ។

ស្បៀវកៅក្រហមអង្គការ IUCN ប្រភេទ *Python molurus* ជាប្រភេទដែលរងការប្រថុយប្រថានតិចតួច (LR)


កិច្ចការពារស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា :

សត្វពស់ខ្លាំងនៅកម្ពុជាត្រូវបានការពារដោយច្បាប់ ស្តីពី ព្រៃឈើនៅឆ្នាំ ២០០២
និងអនុក្រឹត្យពាក់ព័ន្ធ ។



Python breitensteini
Credit: Mark Auliya

លក្ខណៈសម្គាល់ :



ក្រអូបមាត់ធំ
ខាងលើខ្លួនវា
មានកំដៅឡើង

Credit: Mark Auliya



Credit: Mark Auliya

មានអវយវៈតូចពីរដែលស្ថិតនៅចំហៀងខ្លួន
នៃផ្នែក ខាងលើ និងក្រោមក្នុង

លក្ខណៈពាណិជ្ជកម្ម : ស្បែក សាច់ និងសត្វនាំរស់ ត្រូវបានគេយកទៅដាក់លក់នៅតាមទីផ្សារ និងចិញ្ចឹមតាមផ្ទះ



សាច់ពស់ខ្លាំងធំ ដាក់លក់នៅតាមទីផ្សារ Credit: Bounma Vongxay



ស្បែកជើងដែលធ្វើ
ពីស្បែកពស់ខ្លាំង
Credit: TRAFFIC
Southeast Asia



ពស់ខ្លាំងបៃតងមាននៅប្រទេសអូស្ត្រាលី និងឥណ្ឌូនេស៊ី
(ភាគខាងលិច វ៉ាន) និងប៉ាពួញូញ៉ូណេ ដែលមានដាក់លក់
នៅតាមទីផ្សារ Credit: WWF-Canon / Martin HARVEY



ស្បែកពស់ខ្លាំងធំ ដែលដាក់លក់នៅតាមទីផ្សារ

Credit: Chris Shepherd/TSEA



ប្រភេទពស់ខ្លាំង *Python curtus* និង *Python brongersmai*

Credit: Chris Shepherd/TSEA



ស្បែកពស់ខ្លាំងដែលបានបារីបម្រុង

Credit: TRAFFIC Southeast Asia

លក្ខណៈស្រដៀង : ពួក *Boidae spp.*

មានប្រភេទ Boa ៦ប្រភេទដែលស្ថិតក្នុង ឧបសម្ព័ន្ធ I នៃអនុសញ្ញា សាយតេស ។ ក្រៅពីនេះជា
ប្រភេទស្ថិតក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ II ពួកនេះមានរស់នៅតែ ក្នុងតំបន់ដីកណ្តាល និងខាងត្បូងអាមេរិក
កោះប៉ាដា ហ្គាស្កា និងឥណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិក

Carettochelys insculpta - Pig-nosed Turtle

(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ) (កន្លាយច្រមុះជ្រូក)

កន្លាយច្រមុះជ្រូក (Pig-nosed Turtle)

ឈ្មោះម្យ៉ាងទៀត: Labi-labi Mongcong babi (ភាសាឥណ្ឌូនេស៊ី) តំបន់ Baidu Susa (Fly River, PNG)
តំបន់ Garr (តំបន់ទន្លេ Morehead PNG)


រាយការណ៍នៅ: ទន្លេភាគខាងត្បូង តំបន់ Papua ភាគខាងលិច (ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី និងប៉ាពួញូវូហ្គីណេ)
ទឹកដីតំបន់ភាគខាងជើង (ប្រទេសអូស្ត្រាលី)

លក្ខណៈរូបរាង: ស្លូកខាងលើមានប្រវែងរហូតដល់ ៥៥ស.ម

លក្ខណៈសំគាល់: ស្លូកខាងលើគ្របដណ្តប់ដោយស្បែក




រន្ធច្រមុះទាំងពីរមានរាង
បំពង់ប្រហោងធំ



- ជើងខាងមុខរាងដូចជើងទាហានទឹក
- ជើងនីមួយៗមានក្រញ៉ាំពីរ



បន្ទុះគ្របស្បែកពណ៌ស
នៅតាមចុងតែមួយពណ៌ស



លក្ខណៈសំគាល់:

- កន្លាយស្លូកទន់ (អាស៊ី)
- កន្លាយស្លូកទន់មិនមានរន្ធច្រមុះរាងបំពង់ប្រហោងធំ ឬមានជើងមុខដូចជើងទាហានទឹក ដែលមានក្រញ៉ាំពីរនោះទេ

ស្ថានភាពអភិរក្សវិទ្យាសាស្ត្រ:

- ចុះក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ II នៃអនុសញ្ញា ស្តីពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ
លើប្រភេទសត្វនិងរុក្ខជាតិព្រៃ ដែលកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ (CITES)
- IUCN: VU (ងាយរងគ្រោះថ្នាក់)

កិច្ចការពារស្ថាប័ន (កម្ពុជា)

ច្បាប់ស្តីពី ជលផល ឆ្នាំ២០០៦ និងអនុក្រឹត្យលេខ ៥៣ អនក្រ.បក
ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៦ ស្តីពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ
លើប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិព្រៃកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់



Credit: Chris Shepherd/TSEA

លក្ខណៈពាណិជ្ជកម្ម: សត្វរស់លក់ធ្វើជាសត្វចិញ្ចឹមកំសាន្ត ជាញឹកញយនៅតូចក៏យកសាច់ធ្វើជាអាហារផងដែរ ។



កូនកន្លាយច្រមុះជ្រូកញាស់
Credit: James Compton / TSEA



កន្លាយច្រមុះជ្រូកញាស់
Credit: Mark Auliya / TSEA



សាច់កូនកន្លាយច្រមុះជ្រូក
Credit: James Compton / TSEA



កូនកន្លាយច្រមុះជ្រូកជំទង់
Credit: Chris Shepherd / TSEA



កន្លាយច្រមុះជ្រូកពេញវ័យ
Credit: Mark Auliya / TSEA

Chelus fimbriatus - Matamata Turtle

អណ្តើកម៉ាតាម៉ាតា Matamata Turtle

អំបូរ: Chelidae

ឈ្មោះផ្សេងទៀត:

រាយការណ៍: ប្រទេសបូលីវៀ ប្រេស៊ីល ហ្គាយ៉ាណា កូកាតា អង់គ្លេស អេក្វាទ័រ ហ្គាយ៉ាណា បារាំង បេរូ ស្វីរីណាម និង វេណេហ្សូយ៉ា អេឡា

លក្ខណៈរូបរាង: ប្រវែងស្មុកខាងលើរហូតដល់ ៤៤.៩ ស.ម.

ស្ថានភាពនៃការអភិរក្សជាអន្តរជាតិ:

CITES: ពុំមានក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ

បញ្ជី IUCN: ពុំមានក្នុងបញ្ជី


កិច្ចការពារថ្នាក់ជាតិ ពុំមានចុះក្នុងបញ្ជី



លក្ខណសម្គាល់:




មានពកបិដ្ឋុរណ្តាស់ៗ នៅពិលើស្មុក



- ស្មុកខ្នងពណ៌ត្នោត ឬខ្មៅ
- ស្មុកខាងក្រោយមានជ័រដូចផ្ទៃពណ៌ខ្មៅ
- អណ្តើកពេញវ័យមានក្បាល ក ជើង និងកន្ទុយពណ៌ត្នោតប្រផេះ

មានដុំសាច់ពីលានចេញ ខាងក្រោយចង្កា

ពណ៌ផ្ទៃក្របីបួនជាន់: សត្វសត្វជួញដូរជាសត្វចិញ្ចឹម



ស្របច្បាប់និង: ពុំមានប្រភេទផ្សេងទេ

Cheloniidae and Dermochelyidae - Marine Turtles

(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ)

(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ)

(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ)

ពពួកអណ្តើកសមុទ្រ (Marine Turtles)

គេបានរកឃើញអណ្តើកប្រាំប្រភេទ នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចខាងក្រោមនេះមាន :

ក្រុម (Dermochelidae) *Dermochelys coriacea* - Leatherback Turtle (អណ្តើកស្លឹកស្លែក)

ក្រុម (Cheloniidae) *Eretmochelys imbricata* - Hawksbill Turtle (អណ្តើកចំពុះស្នាំង)

Chelonia mydas - Green Turtle (អណ្តើកល្វីចបៃតង)

Caretta caretta - Loggerhead Turtle (អណ្តើកក្បាលធំ)

Lepidochelys olivacea - Olive Ridley Turtle (អណ្តើកល្វីចប្រផេះ)

លក្ខណៈរូបរាង: ស្លឹកលើប្រវែងរហូតដល់: ១៥០ ស.ម ទំងន់រហូតដល់: ៩៥០គ.ក

ស្ថានភាពអភិរក្សអន្តរជាតិ:

- អណ្តើកសមុទ្រទាំងអស់ត្រូវបានចុះបញ្ជីស្ថិតក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ I នៃអនុសញ្ញា ស្តីពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិលើ ប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិព្រៃ ដែលកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ (CITES)
- ជាប្រភេទកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ឈានទៅរកការវិនាសផុតពូជបំផុត ដល់ប្រភេទកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ជិតផុតពូជ (IUCN: CR-EN)

កិច្ចការការថ្នាក់ជាតិ:

- ក្រោមច្បាប់កម្ពុជា ស្តីពី ជលផល ឆ្នាំ២០០៦
- អនុក្រឹត្យកម្ពុជា ស្តីពីសាយភាយ (CITES) ឆ្នាំ២០០៦



Credit: WWF-Canon / Jürgen FREUND

លក្ខណៈសំគាល់:


- ជើងមុខទាំងអស់មានរាងជាចង្កា ចែវទូក
- ក្រញូជើង(ដែលបង្ហាញ) គឺនៅតែម ខាងមុខរបស់ជើងមុខ
- ក្បាលនិងជើងមិនអាចលីបចូលទៅ ក្នុងស្លឹកបាន

ក្រុម Cheloniidae

- ស្លឹកត្របដណ្តប់ ដោយស្រកា

- មានក្រញូជើង ១-២ នៅតែមមុខរបស់ជើងមុខ

Image Source: Environment Canada



ក្រុម Dermochelidae

- ស្លឹកលើមានទ្រនុង 7 និងត្របដណ្តប់ ដោយស្រកា

- ជើងមុខមិនមានក្រញូ

Image Source: Environment Canada



កូនញាស់



អណ្តើកស្លឹកស្លែក



អណ្តើកល្វីចបៃតង



អណ្តើកចំពុះស្នាំង



សំណាកអណ្តើកល្វីចបៃតង
Credit: Chris Shepherd / TSEA



អណ្តើកចំពុះស្នាំង
Credit: Chris Shepherd / TSEA



ផលិតផលធ្វើស្លឹក
Credit: Julia Ng / TSEA



កូនញាស់អណ្តើកល្វីចបៃតងដែលដាក់លក់
Credit: Chris Shepherd / TSEA



សាច់អណ្តើកសមុទ្រ
Credit: James Compton / TSEA



ពងអណ្តើកដាក់លក់
Credit: Chris Shepherd / TSEA

លក្ខណៈពាណិជ្ជកម្ម:

សត្វរស់ សាច់ សំណាក ពង ផលិតផលធ្វើស្លឹក (ដែលគេស្គាល់ថា Bekko) ដូចជា គ្រឿងអលង្កា វ៉ែនតា

ពងអណ្តើករាងមូលពណ៌ស (ដូចគ្រាប់បែងប៉ុង)

អង្កត់ផ្ចិតពងអណ្តើក:

- អណ្តើកស្លឹកស្លែក: ៥.១-៥.៥ ស.ម
- អណ្តើកចំពុះស្នាំង: ៣.២-៣.៦ ស.ម
- អណ្តើកល្វីចបៃតង: ៤.០-៤.៦ ស.ម
- អណ្តើកក្បាលធំ: ៣.៩-៤.៣ ស.ម
- អណ្តើកល្វីចប្រផេះ: ៣.៧-៤.២ ស.ម

Eretmochelys imbricata - Hawksbill Turtle

(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ)

(ឈ្មោះភាសាអង់គ្លេស)


អណ្តើកសមុទ្រចំពុះស្នាម (Hawksbill Turtle)

ឈ្មោះម្យ៉ាងទៀត: Penyu Karah (ម៉ាឡេស៊ី) Penyu Sisik (ឥណ្ឌូនេស៊ី)

រាយការណ៍នៅ: តំបន់មហាសមុទ្រអាត្លង់ទិច៖ ខាងកើតភាគកណ្តាល ភាគឥសាន្ត ភាគពាយ័ព្យ ភាគអាគ្នេយ៍ និរតី និងខាងលិចភាគកណ្តាល។ មហាសមុទ្រឥណ្ឌា៖ នៅភាគខាងលិច និងខាងកើត។ តំបន់ សមុទ្រខ្មៅ និងមេឌីទែរ៉ាណេ។ តំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិក៖ នៅខាងកើតភាគកណ្តាល ភាគពាយ័ព្យ ភាគអាគ្នេយ៍ ភាគនិរតី និងតំបន់ខាងលិចភាគកណ្តាល។

លក្ខណៈរូបរាង: ស្លូកខ្នងមានប្រវែង៖ ៦២-១១៤ ស.ម ទម្ងន់៖ ៣៥-១២៧ គ.ក


លក្ខណៈសំគាល់៖



លក្ខណៈស្រដៀងទៅនឹង :

អណ្តើកស្និទ្ធបៃតង *Chelonia mydas*
ស្ថិតក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ I អនុសញ្ញាសាយតេស

អណ្តើកស្និទ្ធប្រផេះ *Lepidochelys olivacea*
ស្ថិតក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ I នៃអនុសញ្ញាសាយតេស



ស្ថានភាពអភិរក្សអន្តរជាតិ៖

- ត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីឧបសម្ព័ន្ធ I នៃអនុសញ្ញា ស្តីពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិលើប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិព្រៃ ដែលកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ (CITES)
- ជាប្រភេទកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ឈានទៅរកការវិនាសផុតពូជបំផុត (IUCN: CR)

កិច្ចការពាររដ្ឋាភិបាល៖

- ក្រោមច្បាប់កម្ពុជា ស្តីពី ជលផល ឆ្នាំ២០០៦
- អនុក្រឹត្យកម្ពុជា ស្តីពីសាយតេស (CITES) ឆ្នាំ២០០៦



លក្ខណៈពាណិជ្ជកម្ម៖ សត្វរស់ សាច់ ពង សំណាក ផលិតផលធ្វើពីស្លូក (ដែលគេស្គាល់ថាBekko) ដូចជា គ្រឿងអលង្ការ ដងវ៉ែនតា



ផ្ចិតដែលធ្វើពីស្រកាស្លូក

Credit: Julia Ng / TSEA



Batagur spp.

អណ្តើកឆ្នៀវ

Batagur baska - River Terrapin

ឈ្មោះផ្សេងទៀត : Four-toed Terrapin (អង់គ្លេស), Tuntong, Tuntong Laut (ម៉ាឡេស៊ី), Tungtung (ឥណ្ឌូនេស៊ី)

របាយ : ប្រទេសបង់ក្លាដែស កម្ពុជា ឥណ្ឌា ឥណ្ឌូនេស៊ី និងម៉ាឡេស៊ី ភូមា។ ផុតពីក្នុងប្រទេស សាងហ្គាពួរ ថៃ និង វៀតណាម


លក្ខណៈរូបរាង : បណ្តោយខ្លួនប្រវែងរហូតដល់ ៦០សម

លក្ខណៈសំគាល់ :

- ជើងមុខមានក្រញ៉ាបួន
- ស្លឹកមានពណ៌ពីប្រផេះក្រមៅ ទៅពណ៌ខ្មៅ និងញឹកប្រហែលមានពណ៌ត្នោត
- ក្បាលមានពណ៌ខ្មៅសាយប្រផេះ (ពុំមានស្នាមពណ៌ក្រហម)



Credit: Mark Auliya/TSEA



Credit: Sabine Schoppe

ស្លឹកខាងក្រោម (ស្លឹកទ្រូង)



Credit: Mark Auliya/TSEA

ស្លឹកខាងលើ (ស្លឹកខ្នង)

អណ្តើកពណ៌

Batagur (Callagur) borneoensis - Painted Terrapin

ឈ្មោះផ្សេងទៀត : Three-striped Batagur (អង់គ្លេស), Beluku (អ៊ីណេស៊ី និង បូនេឡូ), Tuntong Sungei (ម៉ាឡេស៊ី), Biuku, Sulong, Tuntong Semangka (ឥណ្ឌូនេស៊ី), Kura-kura jidat merah (កាលីម៉ាន់តាន់ខាងលិច ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី), Tumtum (កាលីម៉ាន់តាន់ខាងកើត ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី)

របាយ : ប្រទេសប្រ៊ុយណេ ឥណ្ឌូនេស៊ី ម៉ាឡេស៊ី និងថៃ

លក្ខណៈរូបរាង : ស្លឹកមានប្រវែងរហូតដល់ ៦០សម


លក្ខណៈសំគាល់ :

- ជើងមុខមានក្រញ៉ាប្រាំ
- ស្លឹកខ្នង មានពណ៌ប្រៃប្រួល
- ក្បាលមានពណ៌ប្រៃប្រួល



អណ្តើកពណ៌ ញឹក

Credit: Mark Auliya/TSEA



ស្លឹកខាងក្រោម (ស្លឹកទ្រូង)

Image Credit: Environment Canada

ស្លឹកទ្រូងខាងមុខ និងក្រោយរួមតូច

ញឹក (សូមមើលរូបភាពខាងឆ្វេង)

ក្បាល: ពណ៌ទឹកក្រូច-ត្នោត

ស្លឹកខ្នង: ពណ៌ត្នោត អាចមានពណ៌ព្រាសៗ

ឈ្មោល - មិនបង្កាត់ពូជ



ស្លឹកខ្នង: ពណ៌ខ្មៅ-ត្នោត មានផ្កាខ្មៅធំៗបីតាមគែមស្រក (scales) អាចមានពណ៌ខ្មៅ



Credit: Mark Auliya/TSEA

ឈ្មោល - បង្កាត់ពូជ



អណ្តើកពណ៌ឈ្មោលបង្កាត់ពូជ

Credit: Mark Auliya/TSEA

ក្បាល: ពណ៌ស្លឹកត្នោតពណ៌ក្រហម តែម្តងត្នោតពណ៌ខ្មៅ
ស្លឹកខ្នង: ពណ៌ស្លឹកដោះគោរលោងៗ ពណ៌ខ្មៅឈ្មោលមិនបង្កាត់ពូជ (សូមមើលរូបភាពផ្នែកប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម)

ស្ថានភាពអភិរក្សអន្តរជាតិ :^១

អណ្តើកឆ្នៀវ : អនុសញ្ញា CITES ឧបសម្ព័ន្ធ I

អណ្តើកពណ៌: អនុសញ្ញា CITES ឧបសម្ព័ន្ធ II

បញ្ជីក្រហម IUCN : ជាប្រភេទកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ឈានទៅរកការវិនាសផុតពីបំផុត

កិច្ចការពារថ្នាក់ជាតិ :

Batagur baska: មាននៅក្នុងព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីការកំណត់ប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិជាមិត្តសញ្ញាជាតិរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា វិស្វក្រឹត្យលេខ៥៣ ន ក្រ ប ក (ថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៦) ស្តីពីពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិលើប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិព្រៃរងគ្រោះថ្នាក់

Batagur borneoensis: អនុក្រឹត្យលេខ៥៣ ន ក្រ ប ក (ថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៦) ស្តីពីពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិលើប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិព្រៃរងគ្រោះថ្នាក់

ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម :

ស្ពីត និងសត្វរស់ សម្រាប់ជាសត្វចិញ្ចឹម



ពាណិជ្ជកម្មពណ៌ឈ្មោលក្នុងរដូវបង្កពូជ

Credit: Chris Shepherd/TSEA



Credit: TSEA

^១ សូមអានបន្ថែមអំពីស្ថានភាពអភិរក្សនៅក្នុងគេហទំព័រ www.cites.org និង www.iucnredlist.org

Geoclemys hamiltonii - Black Pond Turtle

អណ្តើកត្រពាំងទង្កៀ Black Pond Turtle

អំបូរ: Geoemydidae

ឈ្មោះផ្សេងទៀត: អណ្តើកអុជខ្មៅ អណ្តើកហាមីតុន ឬអណ្តើកបឹងអុជៗ (ក្នុងភាសាអង់គ្លេស)

រចនាសម្ព័ន្ធ: បង់ក្តាដៃស ឥណ្ឌា នេប៉ាល់ និងប៉ាគីស្ថាន

លក្ខណៈពិសេស: ប្រវែងស្លឹកខាងលើរហូតដល់ ៣៩ ស.ម.

ស្ថានភាពនៃការអភិរក្សជាអន្តរជាតិ:

អនុសញ្ញា CITES ឧបសម្ព័ន្ធ១

បញ្ជី IUCN: ប្រភេទងាយរងគ្រោះថ្នាក់

កិច្ចការពារជាតិ:

អនុក្រឹត្យលេខ៥៣ ន ក្រ ប ក (ថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៦)

ស្តីពីពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិលើប្រភេទរុក្ខជាតិ និងសត្វព្រៃរងគ្រោះថ្នាក់



Credit: Peter Praschag

លក្ខណសម្គាល់:




Credit: Peter Paul van Dijk



Credit: Peter Paul van Dijk

លើស្លឹករាងផ្ទៃព្យួរ
រណ៍វ៉ែ (ឃើញច្បាស់
ពេលនៅតូច)




Credit: Turtle Conservancy



Credit: Turtle Conservancy

មានទ្រនុងបីច្បាស់ៗ រុក្ខជាតិ និងសត្វព្រៃរងគ្រោះថ្នាក់
នៅពេលស្លឹក

ស្លឹកខាងលើពណ៌ខ្មៅពេញលេញ
លាយទឹកក្រូច លឿង
និងពងមាន ឬផ្កាស
ពណ៌របស់វាកាន់តែអស់
ទៅតាមអាយុ។ អណ្តើក
ពេញវ័យភាគច្រើនពណ៌ខ្មៅ



Credit: Peter Praschag



Credit: Turtle Conservancy

ស្លឹកពណ៌លឿង និងមាន
ចំណាំងផ្កាសក្រមៅៗ

ពាណិជ្ជកម្មបច្ចុប្បន្ន:

សត្វរស់ជួញដូរជាសត្វចិញ្ចឹម

ស្របៀបនិង:

អណ្តើកត្រពាំងមាត់អាមេរិក

Clemmys guttata

American Spotted Pond Turtle

អនុសញ្ញា CITES: ពុំមានក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ

IUCN: ប្រភេទងាយរងគ្រោះថ្នាក់



Credit: Olivier Caillabet

- មានអុជពណ៌
លឿងនៅលើ
ស្លឹក
- គ្មានអុជពណ៌
លឿងលើក្បាល
ទេ
- គ្មានទ្រនុងស្លឹក
ទេ

ប្រវែងស្លឹក: រវាងពី ៨.៩ - ១៣.៦ ស.ម.

រចនាសម្ព័ន្ធ: សហរដ្ឋអាមេរិក

Cuora spp. - Asian Box Turtle species

អណ្ដើកបិទមុខស្លូកខ្មៅ Asian Box Turtle species


ឈ្មោះផ្សេងទៀត :

របាយ : អាស៊ីខាងត្បូង និងអាស៊ីអាគ្នេយ៍

លក្ខណៈរូបរាង : បណ្តោយប្រវែងរហូតដល់ ៣០សម


លក្ខណៈសំគាល់:

- គន្លាក់នៅស្លូកទ្រូង
- តាមតែមស្លូករាបស្មើ (មិនមានរាងដូចឆ្កែព្យួរណា)
- ស្លូកខ្នង មានរាងក្រឡាមុខខ្លាំង
- ពុំមានគន្លាក់នៅគល់ស្លូកទ្រូងផ្នែកខាងក្រោយ



អណ្ដើកបិទមុខស្លូកខ្មៅ

រាងក្រឡាមុខខ្លាំង



អណ្ដើកបិទមុខស្លូកខ្មៅ

Image Source: Environment Canada

ប្រភេទភាគច្រើនក្នុងសន្តាន *Cuora* spp. គេរកឃើញមានជួរជួរ ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ :

អណ្ដើកបិទមុខស្លូកខ្មៅ

Cuora amboinensis
Southeast Asian Box Turtle

បញ្ជីក្រហម IUCN: ងាយទទួលបានរងគ្រោះថ្នាក់



Credit: Mark Auliya/TSEA



Credit: Mark Auliya/TSEA



Photos: Dinonyus Shama

បណ្តោយប្រវែង ២២ - ២៥សម

របាយ: ប្រទេសបង់ក្លាដែស កម្ពុជា ឥណ្ឌា ឥណ្ឌូនេស៊ី ម៉ាឡេស៊ី ភូមា ហ្វីលីពីន ថៃ និងវៀតណាម

អណ្ដើកបិទមុខឥណ្ឌូចិន

Cuora galbinifrons
Indochinese Box Turtle

បញ្ជីក្រហម IUCN: ប្រភេទកំពុងរងគ្រោះ
ថ្នាក់ឈានទៅរកការវិនាសជិតផុតពូជបំផុត



Credit: Mark Auliya/TSEA



Credit: Mark Auliya/TSEA




Image Source: Environment Canada

បណ្តោយរហូតដល់ ១៩,៨សម

របាយ: ប្រទេសកម្ពុជា (?), ចិន ឡាវ និងវៀតណាម


អណ្ដើកក្រក់បី

Cuora trifasciata
Chinese Three-striped Box Turtle

បញ្ជីក្រហម IUCN : ប្រភេទកំពុងរងគ្រោះ
ថ្នាក់ឈានទៅរកការវិនាសជិតផុតពូជបំផុត



All photos: Chris Shepherd/TSEA



បណ្តោយរហូតដល់ ២០,៣សម

របាយ: ប្រទេសចិន ឡាវ ភូមា (?) និងវៀតណាម

ស្ថានភាពអភិរក្សអន្តរជាតិ :

ប្រភេទទាំងអស់ក្នុងសន្តាន *Cuora* spp. ចុះក្នុងបញ្ជី អនុសញ្ញា CITES ឧបសម្ព័ន្ធ II

បញ្ជីក្រហម IUCN : ប្រែប្រួលពីងាយរងគ្រោះថ្នាក់ ដល់ប្រភេទកំពុងរងគ្រោះ
ថ្នាក់ឈានទៅរកការវិនាសជិតផុតពូជបំផុត

កិច្ចការពារថ្នាក់ជាតិ :

អនុក្រឹត្យលេខ៥៣ ន ក្រ ប ក (ថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៦)

ស្ថិតិពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិលើប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិព្រៃរងគ្រោះថ្នាក់



Credit: Chris Shepherd/TSEA

ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម :

សត្វរស់ ភាគច្រើនសម្រាប់យកសាច់ជាអាហារ
(ជាញឹកញាប់ ក្នុងបរិមាណដ៏ច្រើន) ។ ខ្លះទៀត
សម្រាប់ ជាសត្វចិញ្ចឹម



អណ្ដើកបិទមុខស្លូកខ្មៅ

Credit: Chris Shepherd/TSEA



អណ្ដើកបិទមុខស្លូកខ្មៅ

Credit: Mark Auliya/TSEA

Leucocephalon yuwonoi - អណ្តើកព្រៃស៊ូឡាវេស៊ី

អណ្តើកព្រៃស៊ូឡាវេស៊ី

អំបូរ: Geoemydidae

ឈ្មោះផ្សេងទៀត: តូរ៉ា-តូរ៉ាដូន (ឥណ្ឌូនេស៊ី)

របៀប: ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី

លក្ខណៈរូបរាង:

ប្រវែងស្លឹកខាងលើរហូតដល់ ២៥-២៨ ស.ម.

ស្ថានភាពនៃការអភិរក្សជាអន្តរជាតិ: ^a

អនុសញ្ញា CITES: ឧបសម្ព័ន្ធ២

IUCN: កំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ឈានទៅរកការវិនាស
ផុតពូជ(CR)

កិច្ចការពារថ្នាក់ជាតិ:

អនុក្រឹត្យលេខ៩៣ ន ក្រ ប ក (ថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៦)

ស្តីពីពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិលើប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិព្រៃរងគ្រោះថ្នាក់




រូបថត: Ian Ives

ទិន្នន័យប្រភេទ:

សាច់ធ្វើជាអាហារ និងសត្វរស់ធ្វើសត្វចិញ្ចឹម

លក្ខណៈសម្គាល់:

ស្លឹកលើ



រូបថត: Mark Auliya/TRAFFIC

លើក្បាលគ្មានឆ្នុត
មានទ្រនុងបីច្បាស់ៗ

ស្លឹកលើខាងក្រោយរាង
ធ្មេញរណារ (ធ្មេញរណារ
ខ្លាំងចំពេលនៅតូច)



រូបថត: Ian Ives

តាមបណ្តោយ
លើកំពូលស្លឹក
មានស្រកាដ



រូបថត: Sabine Schoppe



រូបថត: Mark Auliya/TRAFFIC



រូបថត: Ian Ives



រូបថត: Sabine Schoppe

ស្រប្បូងនឹង:

អណ្តើកទឹក

(Cyclemys dentata)

CITES: មិនមានចុះក្នុងបញ្ជី


IUCN: ជិតទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ NT



Mark Auliya/TRAFFIC



រូបថត: Sabine Schoppe



រូបថត: Sabine Schoppe

ក្បាល និង.កពណ៌ក្រមៅ ។ នៅ
ក្រោម.ក និងសងខាងក្បាលមាន
ឆ្នុតពណ៌ទឹកក្រូចទៅត្នោតថាស

ស្លឹកលើ

- ពណ៌ត្នោតទៅខ្មៅ
- មានទ្រនុងមួយ (កាន់តែលែង
ច្បាស់ពេលចាស់)
- នៅកំពូលស្លឹកលើមានស្រកាដ

ទ្រនុង (ស្លឹកក្រោម)

- ពណ៌លឿង ឬត្នោតខ្លី ជាមួយ
ចំណាំងឆ្នុតក្រមៅទៅត្នោតក្រមៅ
ប្រក់ខ្មៅ

របៀប: បង់ក្បាលដេស ប្រើយណេ កម្មជា ចិន(?) ឡាវ ម៉ាឡេស៊ី
ឥណ្ឌា ឥណ្ឌូនេស៊ី ភូមា ណេប៉ាល់ សិង្ហបុរី ថៃ និងវៀតណាម

អណ្តើកស្លឹកស្រីប្រៃ

(Notochelys platynota)

CITES: ឧបសម្ព័ន្ធ២

IUCN: ងាយរងគ្រោះថ្នាក់ VU



រូបថត: Sabine Schoppe



រូបថត: Sabine Schoppe

ស្លឹកលើ

- ពណ៌បៃតងស្រងាត់ទៅត្នោតខ្លី
ឬពណ៌ត្នោតមុំ
- សំពែចប៉ុន្តែមានទ្រនុងមួយ
- នៅកំពូលស្លឹកលើមានស្រកាដ

ទ្រនុង (ស្លឹកក្រោម)

- ពណ៌លឿងទៅទឹកក្រូច ហើយ
មានឆ្នុតក្រមៅនៅលើស្រកា
នីមួយៗ ។ អណ្តើកមួយចំនួនមាន
ពណ៌ខ្មៅស្ទើរ ។

របៀប: ប្រើយណេ ឥណ្ឌូនេស៊ី ម៉ាឡេស៊ី ភូមា(?) ថៃ និង
វៀតណាម

Platysternon megacephalum - អណ្ណើកសេក

អណ្ណើកសេក

អំបូរ: Platysternidae

ឈ្មោះផ្សេងៗទៀត: អណ្ណើកក្បាលធំ

របៀប: ប្រភេទសត្វជា ចិន ឡាវ ភូមា ថៃ និងវៀតណាម

លក្ខណៈរូបរាង:

ប្រវែងស្លឹកខាងលើរហូតដល់ ២០ ស.ម.

ស្ថានភាពនៃការអភិរក្សជាអន្តរជាតិ:^a

អនុសញ្ញា CITES: ឧបសម្ព័ន្ធ២

បញ្ជី IUCN: កំពុងរងគ្រោះថ្នាក់មិនមុតពូជ (EN)

កិច្ចការពារជាតិ:

អនុក្រឹត្យលេខ៥៣ ន ក្រ ប ក (ថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៦)

ស្តីពីពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិលើប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិព្រៃរង គ្រោះថ្នាក់



ថតដោយ Peter Paul van Dijk

លក្ខណសម្បត្តិ:

ជាប្រភេទអណ្ណើកទឹកសាបខុសប្លែកពីគេ

ក្បាល: ធំខ្លាំងធ្វើឱ្យវាមិនអាចលិបចូលក្នុងស្លឹកបាន

ផ្នែកខាងលើគ្របដណ្តប់ដោយស្រកាដ៏ធំមួយ

កន្ទុយ: មានប្រវែងស្មើតែស្មើនឹងស្លឹកលើ

គ្របដណ្តប់ដោយស្រកាធំៗ



ចំណាត់ថ្នាក់



ពាណិជ្ជកម្មចម្រុះ:

ជាអាហារ និងសត្វរស់ត្រូវបានជួញដូរជាសត្វចិញ្ចឹម

ស្រឡាញ់និង:

ពុំមានប្រភេទផ្សេងទេ

ពេលនៅតូច



ទ្រូងអណ្ណើកតូចពណ៌
ទឹកត្រចៀកខ្មៅ
នៅកណ្តាល

Orlitia borneensis - Malaysian Giant Turtle

អង្គការយក្សម៉ាឡេស៊ី Malaysian Giant Turtle

ឈ្មោះផ្សេងទៀត : Bajuku, Biukuk (ឥណ្ឌូនេស៊ី); Juku juku besar, Baning dayak (ម៉ាឡេស៊ី)

រហូត : ឥណ្ឌូនេស៊ី និង ម៉ាឡេស៊ី

លក្ខណៈរូបរាង : បណ្តោយខ្លួនរហូតដល់ ៨០សម ។

ស្ថានភាពអភិរក្សអន្តរជាតិ :
អនុសញ្ញា **CITES** ឧបសម្ព័ន្ធ II


បញ្ជីក្រហម **IUCN** : កំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ជិតផុតពូជ (EN)

កិច្ចការពារផ្ទាក់ផ្ទង់ :
អនុក្រឹត្យលេខ៥៣ ន ក្រ ប ក (ថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៦)
ស្តីពីពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិលើប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិព្រៃរង គ្រោះថ្នាក់



Credit: Mark Auliya/TSEA

លក្ខណៈសំគាល់ :



Credit: Mark Auliya/TSEA

ស្លាកខ្នងពណ៌ប្រផេះ
ត្នោត ឬខ្មៅ

ក្បាលពណ៌ត្នោត ឬខ្មៅ
ស្រកាជុំវិញភ្នែកក្រាស់



Credit: Mark Auliya/TSEA

ស្រកាកណ្តាល
ទីមួយរីកធំខាង
លើនិងរួមតូចខាង
ក្រោម



Credit: Mark Auliya/TSEA

គន្លាក់នៅចន្លោះស្លាកខ្នងខាងក្រោមមុតស្រួច



Credit: Mark Auliya/TSEA

ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម :

សត្វរស់ សម្រាប់យកសាច់ជាអាហារ (ជាញឹកញាប់ជួញដូរក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំ)



Credit: Chris Shepherd/TSEA



Credit: Chris Shepherd/TSEA

Siebenrockiella leytensis - Philippine Forest Turtle

អណ្តើកព្រៃហ្វីលីពីន Philippine Forest Turtle

អំបូរ: Geoemydidae

ឈ្មោះផ្សេងទៀត: អណ្តើកបាតកូ បាតកូ (ហ្វីលីពីន) អណ្តើកបឹងហ្វីលីពីន
អណ្តើកបឹងកោះលេទី អណ្តើកក្រវាត់ក (ក្នុងភាសាអង់គ្លេស)

រចនាប័ណ្ណ: កោះប៉ាឡាវ៉ាន់ និងឌូមារ៉ាន់ ប្រទេសហ្វីលីពីន

លក្ខណៈរូបរាង: ប្រវែងស្លឹកខាងលើរហូតដល់ ៣០ ស.ម. និងទម្ងន់ខ្លួនចាប់ពី ៣.៥ គ.ក្រ. ឡើងទៅ

ស្ថានភាពនៃការអភិរក្សជាអន្តរជាតិ:

អនុសញ្ញា CITES: ឧបសម្ព័ន្ធ២

បញ្ជី IUCN: ប្រភេទទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ឈានទៅរក
ការវិនាសផុតពូជ

កិច្ចការពារថ្នាក់ជាតិ:

អនុក្រឹត្យលេខ៥៣ ន ក្រប ក (ថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៦)

ស្ថិតិពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិលើប្រភេទរុក្ខជាតិ និងសត្វព្រៃរងគ្រោះថ្នាក់



ពាណិជ្ជកម្មប្រចាំថ្ងៃ:

សត្វរស់ជួញដូរជាសត្វចិញ្ចឹម អាហារ និងថ្នាំបុរាណ


លក្ខណៈសម្គាល់:



ចំពេញវ័យ



ថ្នមលើមានរាងស្មើរ ដូចទំពាក់
មានក្បាលធំ
ពណ៌ក្បាលហើរទៅ តាមអាយុ



ស្រប្បូងនឹង:

អណ្តើកក្អែក


(Siebenrockiella crassicollis - Black Marsh Turtle)

អនុសញ្ញា CITES: ឧបសម្ព័ន្ធ២

IUCN: ប្រភេទរងគ្រោះថ្នាក់



ក្បាល ក ពណ៌ខ្មៅឬប្រផេះហើយមានអុជលឿង ឬក៏.ស (ពិបាកកត់ សម្គាល់ចំពោះអណ្តើក ឈ្មោលចាស់)



រចនាប័ណ្ណ: ប្រទេសកម្ពុជា ឥណ្ឌូនេស៊ី ម៉ាឡេស៊ី ភូមា សិង្ហបុរី ថៃ និងវៀតណាម

លក្ខណៈរូបរាង: ប្រវែងស្លឹកខាងលើរហូតដល់ ២០ ស.ម.

Photo credit: Mark Auliya/TSEA

© TRAFFIC Southeast Asia 2011

All Photos credit: Sabine Schoppe

៖តាមដានអំពីស្ថានភាពការអភិរក្សបច្ចុប្បន្នលើគេហទំព័រ www.cites.org, www.iucnredlist.org

មករា ២០១១



Trachemys scripta elegans - Red-eared Slider

អណ្តើកត្រចៀកក្រហម Red-eared Slider

ឈ្មោះផ្សេងទៀត : Kura-kura Telinga merah, Kura-kura ninja (ឥណ្ឌូនេស៊ី), Kura terlinga-merah (ម៉ាឡេស៊ី).

របាយ : សហរដ្ឋអាមេរិក

សំគាល់: ជាប្រភេទនាំចូលមកប្រទេសប្រ៊ុយណេ ឥណ្ឌូនេស៊ី ម៉ាឡេស៊ី ប៉ាពួរញូធីនី ហ្វីលីពីន សាំងហ្គាពួរ កម្ពុជា និងប្រទេសតំបន់ត្រជាក់ ត្រូពិច ក្បែរត្រូពិចជុំវិញពិភពលោក ។

លក្ខណៈរូបរាង : បណ្តោយខ្លួនរហូតដល់ ៣០សម

ស្ថានភាពអភិរក្សអន្តរជាតិ :

មិនចុះក្នុងបញ្ជីអនុសញ្ញា CITES

បញ្ជីក្រហម IUCN : មិនចុះក្នុងបញ្ជី

កិច្ចការពារថ្នាក់ជាតិ : មិនចុះបញ្ជី



Credit: Mark Auliya

លក្ខណៈសំគាល់ :



Credit: Mark Auliya

ស្នាមពណ៌ក្រហមវែង ក្បាលបែតង

ចាស់មានឆ្មុតពណ៌លឿង

- ពណ៌ស្លឹកខ្លួន និងទ្រូងប្រែប្រួលតាមវ័យ ។
- ពណ៌នៅលើក្បាលមិនប្រែប្រួលតាមវ័យទេ ។
- ស្នាមពណ៌ក្រហមជានិច្ចកាលឃើញមាននៅចំហៀងក្បាល ខាងក្រោយភ្នែក ។ ឈ្មោលពេញវ័យមានក្រព្យាវែង ។

ស្លាកស្នាមប្រែប្រួល ប៉ុន្តែស្រដៀងនឹងពណ៌នេះ



កូនអណ្តើក
Credit: Sabine Schoppe

ស្លឹកទ្រូង



អណ្តើកពេញវ័យ
Credit: Mark Auliya

ពណ៌លឿងទឹក ក្រចក និងមានស្នាមពណ៌ក្រម៉ៅ



កូនតូច
Credit: Sabine Schoppe

ពេញវ័យ
Credit: Mark Auliya

ចាស់
Credit: Mark Auliya

ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម :

សត្វរស់សម្រាប់សាងជាអាហារ និងជាសត្វចិញ្ចឹម ។ សម្រាប់ជាសត្វចិញ្ចឹម គេលក់ជាកូនជំទង់ ។



Credit: Sabine Schoppe

សំគាល់ :

អណ្តើកត្រចៀកក្រហមដែលចិញ្ចឹមក្នុងកសិដ្ឋាន រាប់សិបលានក្បាល ត្រូវបានជួញដូរដោយខុសច្បាប់ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ អ្នករត់ពន្ធជាញកញ្ចប់ ចុះបញ្ជីប្រភេទនេះនៅក្នុងឯកសារ ហើយបន្ទាប់មកដឹកជញ្ជូនប្រភេទអណ្តើកផ្សេងទៅវិញ ។

Testudinidae spp. - Tortoise species

ប្រភេទរណេត្តិកន្ត្រំ Tortoise species

ឈ្មោះផ្សេងទៀត :

រាយ : ទ្វីបអាហ្វ្រិក (រួមមាន ម៉ាដាហ្គាស្ការ) ទ្វីបអាមេរិក ទ្វីបអឺរ៉ុប ទ្វីបអាស៊ី

លក្ខណៈរូបរាង : បណ្តោយខ្លួនប្រវែង១០ - ១៣៥ សម និងទម្ងន់ ១៤០ក្រ - ៣០០ក្រ ។

ស្ថានភាពអភិរក្សអន្តរជាតិ : ។

ប្រភេទទាំងអស់ចុះក្នុងបញ្ជី អនុសញ្ញា CITES ឧបសម្ព័ន្ធ II លើកលែងតែប្រភេទ ចំនួន៨ នេះទេ ដែលចុះក្នុង បញ្ជីឧបសម្ព័ន្ធ I

Astrochelys (Geochelone) radiata - Radiated Tortoise
Astrochelys (Geochelone) yniphora - Ploughshare Tortoise
Chelonoidis (Geochelone) nigra - Galapagos Giant Tortoise
Gopherus flavomarginatus - Yellow-bordered Tortoise
Psammobates geometricus - Geometric Tortoise
Pyxis arachnoides - Spider Tortoise
Pyxis planicauda - Flat-tailed Tortoise
Testudo kleinmanni - Kleinmann's Tortoise

បញ្ជីក្រហម IUCN: ប្រែប្រួលរហូតដល់កំពុងរងគ្រោះ ថ្នាក់ឈានទៅរកការវិនាសផុតពីបង្កង់

កិច្ចការពារថ្នាក់ជាតិ :

អនុក្រឹត្យលេខ៥៣ ន ក្រ ប ក (ថ្ងៃទី ២៩ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០០៦) ស្តីពីពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិលើ ប្រភេទសត្វ និង រុក្ខជាតិព្រៃរងគ្រោះថ្នាក់



Manouria impressa
Credit: Doug Hendrie

លក្ខណៈសំគាល់:

ស្លឹកខ្នងរឹង ជាញឹកញាប់រាងក្រឡាមខាងលើ

វិណ្ឌអាចប្រែប្រួលទៅតាមស្រកា ជាញឹកញាប់ច្បាស់ល្អ ដែលងាយស្រួលរាប់

ជើងក្រោយដូចគ្នាដល់ជើងមុខ ឬដូចជើងដំរី



Credit: Mark Auliya/TSEA

ភាគច្រើនអាចដកក ហើយលិបចូលក្នុង ស្លឹកទាំងស្រុងបាន

ប្រភេទខ្លះអាចធំសម្បើម ដែលអាចមានទម្ងន់រហូត ដល់៣០០គីឡូក្រាម



Credit: Chris Shepherd/TSEA

សំគាល់ :

ប្រភេទក្នុងស្ថានTestudinidae spp. ទាំងអស់រស់នៅលើដី ។ សំណាករស់ត្រូវអោយទឹកសាបជីក ចំនួនមិនត្រូវទុកនៅក្នុងត្រពាំងទេ ព្រោះវាអាចងាប់ដោយសារលង់ទឹក ។

ស្រដៀងទៅនឹង : អណ្តើកទឹកសាប និងអណ្តើកសមុទ្រ

អណ្តើកទឹកសាប



Trachemys scripta elegans - អណ្តើកត្រចៀកក្រហម
Credit: Mark Auliya/TSEA

អណ្តើកសមុទ្រ



Eretmochelys imbricata - អណ្តើកសមុទ្រ ចំពុះស្នាំង
Credit: Cat HOLLOWAY / WWF-Canon

ជើងរាងសំប៉ែត

សំគាល់ :

អណ្តើកទឹកសាប និងអណ្តើកសមុទ្រភាគច្រើនរស់នៅក្នុងទឹក ។

*សំគាល់ : *Geochelone sulcata* – អណ្តើកបន្ទាអាហ្វ្រិក ចុះក្នុងបញ្ជី អនុសញ្ញា CITES ឧបសម្ព័ន្ធ II. កូតាសូន្យសម្រាប់ សំណាកយកចេញពីព្រៃ និងជួញដូរក្នុងគោលបំណងពាណិជ្ជកម្ម ។

ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម :

សត្វរស់ សម្រាប់ជាសត្វចិញ្ចឹម យកសាច់ជាអាហារ ស្លឹកសម្រាប់ធ្វើឱសថបុរាណ ឬគ្រឿងតុបតែងលម្អ



ការរឹបអូសអណ្តើករស់
Credit: Härtmut JUNGJUS / WWF-Canon



ស្លឹកអណ្តើកដែលគេប្រើធ្វើជាឧបករណ៍ភ្លេង
Credit: Hartmut JUNGJUS / WWF-Canon

Astrochelys (Geochelone) radiata - Radiated Tortoise

(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ) (អនឡីកឡាយម៉ាដាហ្គាស្កា)

អនឡីកឡាយម៉ាដាហ្គាស្កា (Radiated Tortoise)

ឈ្មោះម្យ៉ាងទៀត: Radiated Tortoise (អង់គ្លេស)

រាយការណ៍នៅ: មាននៅប្រទេសម៉ាដាហ្គាស្កា នាំចូលទៅប្រទេស (កោះ) ម៉ូរីឡេស និងតំបន់ Réunion

លក្ខណៈរូបរាង: ស្លូកខ្នងមានប្រវែងរហូតដល់ ៤០ស.ម

លក្ខណៈសំគាល់:

ខ្សែឆ្នុតខ្មៅជាក្រឡាផ្កាយម្លិះដូចផ្ចិតនៅលើផ្ទៃស្លូកប្រវែង ១ភាគ៤ នៃក្រឡាស្លូក




សន្ទុះស្លូកក្រោមមានរាងជាត្រីកោណខ្មៅ

ស្ថានភាពអភិរក្សអន្តរជាតិ:

- ស្ថិតក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ II របស់អនុសញ្ញា ស្តីពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ លើប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិព្រៃ ដែលកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ (CITES)
- ជាប្រភេទកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ឈានទៅរកការវិនាសផុតពូជបំផុត (IUCN: CR)

កិច្ចការពារជាតិ (កម្ពុជា):

ពុំមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេ ប៉ុន្តែត្រូវអនុវត្តតាមអនុក្រឹត្យ លេខ ៥៣ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៦ ស្តីពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ លើសត្វ និងរុក្ខជាតិព្រៃ ដែលកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ ។



លក្ខណៈពាណិជ្ជកម្ម: សត្វរស់ភាគច្រើនជាកូន ត្រូវបានដាក់លក់នៅក្នុងហាងលក់សត្វចិញ្ចឹមកំសាន្ត





ក្រឡាស្លូកអណ្តើកផ្កាយម៉ាដាហ្គាស្កា

ក្រឡាស្លូកអណ្តើកផ្កាយម៉ាដាហ្គាស្កា

លក្ខណៈស្រដៀងទេសៗ: អណ្តើកផ្កាយ (ឥណ្ឌា) *Geochelone elegans* ស្ថិតក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ II នៃអនុសញ្ញាសាយតេស

ខ្សែឆ្នុតខ្មៅជាក្រឡាផ្កាយ បែកចេញគ្រប់ទិស

ស្លូកខ្នងខាងក្រោយ ទ្រូតខ្លាំងចំពោះ សត្វពេញវ័យ ស្លូកទ្រូង




ស្លូកខ្នងប្រវែងរហូតដល់ ៣៨ស.ម

ស្លូកទ្រូង

អណ្តើកផ្កាយ (ភូមា) *Geochelone platynota* ស្ថិតក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ II នៃអនុសញ្ញាសាយតេស

ខ្សែឆ្នុតស្រអាប់មានផ្ទៃ សង្វែងក្រមបន្តិច

គ្មានខ្សែតភ្ជាប់មកចំណុច កណ្តាលក្រឡាផ្កាយស្លូកទេ




Credit: Mark Auliya / TSEA


ស្លូកខ្នងប្រវែងរហូតដល់ ២៦ស.ម

ស្លូកទ្រូង

Credit: Jérôme Maran

អណ្តើកផ្កាយពឹងពាង *Pyxis arachnoides* ស្ថិតក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ I របស់សាយតេស

អណ្តើកខ្លះបង្ហាញឱ្យឃើញ សន្ទុះតភ្ជាប់ស្លូកទាំងពីរ

Credit: WWF-Canon / Urs WOY

ស្លូកខ្នងមានប្រវែងរហូតដល់ ១៥ស.ម

ស្លូកទ្រូង

© TRAFFIC Southeast Asia 2008



Astrochelys yniphora* - Ploughshare Tortoise

(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ) (អង្គភាព Ploughshare)

អង្គភាព Ploughshare

ឈ្មោះម្យ៉ាងទៀត: Angonoka (ម៉ាដាហ្គាស្កា) អាចចុះឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រជា *Angonoka yniphora* ឬ *Geochelone yniphora*

រាយការណ៍នៅ: មាននៅប្រទេសម៉ាដាហ្គាស្កា

លក្ខណៈរូបរាង: ស្លឹកខ្នងរាងកោងមូលមានប្រវែងរហូតដល់ ៤៨ស.ម

ស្ថានភាពអភិរក្សអន្តរជាតិ:

- ជាប្រភេទចុះក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ I នៃអនុសញ្ញា ស្តីពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ លើសត្វ និងរុក្ខជាតិព្រៃ ដែលកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ (CITES)
- ជាប្រភេទកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ឈានទៅរកការវិនាសផុតពូជបំផុត (IUCN: CR)

កិច្ចការពារជាតិ(កម្ពុជា):

មិនទាន់មានចុះក្នុងបញ្ជីការពារនៅឡើយ ឬមិនទាន់មានព័ត៌មានច្បាស់លាស់



Credit: WWF-Canon / Meg GALLER

លក្ខណៈសំគាល់:

- ស្លឹកសត្វវ័យក្មេងមានក្រឡាងចតុកោណ
- ស្រកាក្រឡាសន្លឹកនៅកណ្តាលគឺពណ៌ថ្លាថ្លា (គ្មានស្នាមឆ្លុះឬស្នាមអុជ)
- ពណ៌វាអាចប្រែស្លឹកនៅពេលវាអាយុកាន់តែចាស់



Credit: Sandrine Pantel / TSEA




Credit: Kathrin Schmidt



Credit: WWF-Canon / Martin HARVEY

ស្រកាក្រឡាខាងមុខដុះលាយចេញរាងទ្រវែងថ្លាថ្លា លើផ្ទៃ ចំពោះអណ្តើកឈ្មោលពេញវ័យ



* Image Source: Environment Canada

លក្ខណៈពាណិជ្ជកម្ម: សត្វរស់គេលក់ដូរធ្វើជាសត្វចិញ្ចឹម ដែលជាទូទៅច្រើនមានកូនតូចៗគេដាក់លក់ ។



កូនអណ្តើកញ្ចាស់ Ploughshare
Credit: WWF-Canon / Donald G. REID

លក្ខណៈស្រដៀងគ្នា: សត្វពេញវ័យអាចមើលដឹងច្បាស់ ប៉ុន្តែកូនញាស់ និងកូនជំទង់នៃប្រភេទអណ្តើក *Geochelone sulcata* (African Spurred Tortoise) មើលទៅស្រដៀងគ្នា ។

កូនអណ្តើក *Geochelone sulcata* មាន:

- ស្រកាក្រឡាមិនសូវមានរាងក្រឡា
- ស្រកាពណ៌ខ្លីចាស់
- ស្រកាក្រឡាលើខាងៗមានតែមួយជ្រួញស្រួច



Credit: Mark Auliya / TSEA

Chelonoidis (Geochelone) carbonaria - Red-footed Tortoise

អណ្តើកជើងក្រហម Red-footed Tortoise

អំបូរ: Testudinidae

ឈ្មោះផ្សេងៗទៀត: អណ្តើកជើងក្រហមអាមេរិកខាងត្បូង អណ្តើកក្បាលផ្លែឈើ (ក្នុងភាសាអង់គ្លេស)

រាងកាយ: ប្រទេសអាហ្សង់ទីន ឬលីវ៉ា ប្រេស៊ីល កូឡុំប៊ី ហ្គាឃាណា ប៉ាណាម៉ា ប៉ារ៉ាហ្គាយ និង វ៉ែនេស៊ូឡា

លក្ខណៈរូបរាង: ប្រវែងស្លឹកខាងលើរហូតដល់ ៥១ ស.ម.

ស្ថានភាពនៃការអភិរក្សជាអន្តរជាតិ:

អនុសញ្ញា CITES: ឧបសម្ព័ន្ធ២

បញ្ជី IUCN: ពុំមានបញ្ជី

កិច្ចការពារផ្ទៃក្នុងជាតិ:

អនុក្រឹត្យលេខ៥៣ ន ក្រ ប ក (ថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៦)

ស្តីពីពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិលើប្រភេទរុក្ខជាតិ និងសត្វព្រៃងាយរងគ្រោះថ្នាក់



Credit: David Lawson/WWF-UK


លក្ខណសម្គាល់:



*Credit: Deborah Bardowicks/Twycross Zoo

ស្លឹកខាងលើពណ៌ខ្មៅលាយ ក្រឡាពណ៌លឿងទៅទឹក ក្រចកក្រហមនៅលើស្រកា នីមួយៗ

នៅជាយស្រកាលើស្លឹក ផ្នែកខាងលើមានក្រឡា ពណ៌លឿងទៅទឹកក្រចក ក្រហម



Credit: Matt Morris

លើអវយវៈខាងមុខគ្រប់ដណ្តប់ ដោយក្រឡាធំៗពណ៌ក្រហម

ក្រឡាលើក្បាលចន្លោះភ្នែកទីមួយ មិនដាច់ពីគ្នាទេ

ក្រឡាក្បាលពណ៌លឿង ក្រហម ឬ ទឹកក្រចក

ពាណិជ្ជកម្មបង្កប់នៈ

សត្វសត្វត្រូវបានជួញដូរជាសត្វចិញ្ចឹម



Credit: Matt Morris

ស្រប្បូននឹង:

អណ្តើកជើងលឿង (Chelonoidis (Geochelone) denticulata) Yellow-footed Tortoise

អនុសញ្ញា CITES: ឧបសម្ព័ន្ធ២

IUCN: ប្រភេទងាយរងគ្រោះថ្នាក់

ប្រវែងស្លឹក: រហូតដល់ ៨៣ ស.ម.

រាងកាយ: ឬលីវ៉ា កូឡុំប៊ី អេក្វាទ័រ ហ្គាឃាណា ប៉ាណាម៉ា ប៉ារ៉ាហ្គាយ និង វ៉ែនេស៊ូឡា



Credit: Matt Morris

ស្លឹកខាងលើពណ៌ត្នោតលាយក្រឡា ពណ៌លឿងទៅទឹកក្រចកនៅលើស្រកា

ផ្នែកខាងលើនៃស្លឹកមានក្រឡា ជាយពណ៌លឿងទៅទឹកក្រចក



Credit: Matt Morris

លើអវយវៈខាងមុខគ្រប់ដណ្តប់ ដោយក្រឡាធំៗពណ៌លឿង ឬទឹកក្រចក

ក្រឡាលើក្បាលចន្លោះភ្នែកទីមួយ ដាច់ពីគ្នាជាពីរផ្នែក

ក្រឡាក្បាលពណ៌លឿងទៅ ទឹកក្រចក



Credit: Matt Morris

*អណ្តើកជើងក្រហមនៅស្ថានសត្វ Twycross រូបថតដោយ Deborah Bardowicks

តាមដានអំពីស្ថានភាពការអភិរក្សបច្ចុប្បន្នលើគេហទំព័រ www.cites.org, www.iucnredlist.org

Geochelone elegans - Indian Star Tortoise

(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ) (អង្គភាពកម្ពុជា (ឥណ្ឌា))

អង្គភាពកម្ពុជា (Indian Star Tortoise)

ឈ្មោះម្យ៉ាងទៀត: Indian Star Tortoise (អង្គភាពកម្ពុជា)

រាយការណ៍នៅ: មាននៅប្រទេសឥណ្ឌា ប្រទេសប៉ាគីស្ថាន និងប្រទេសស្រីលង្កា

រូបរាង: ស្លឹកខ្នងមានប្រវែងរហូតដល់ ៣៨ស.ម

ស្ថានភាពអភិរក្សសត្វជាតិ:


- ស្ថិតក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ II របស់អនុសញ្ញា ស្តីពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ លើប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិព្រៃដែលកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ (CITES)
- ជាប្រភេទកំពុងជួបការប្រថុយប្រថាន (IUCN: LR)

កិច្ចការពារសត្វជាតិ:

ពុំមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេ ប៉ុន្តែត្រូវអនុវត្តតាមអនុក្រឹត្យលេខ ៥៣ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៦ អនុសញ្ញាស្តីពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិលើប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិព្រៃដែលកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ ។



លក្ខណៈសំគាល់:



ស្លឹកក្រោម

លក្ខណៈពាណិជ្ជកម្ម: សត្វរស់ត្រូវបានដាក់លក់សំរាប់យកទៅចិញ្ចឹម ដែលមានភាគច្រើនជាកូន



កូនអណ្តើកផ្កាយដាក់លក់ក្នុងហាងលក់សត្វចិញ្ចឹម



ក្រឡាស្លឹកអណ្តើកផ្កាយ

លក្ខណៈស្រដៀងគ្នា:

អណ្តើកផ្កាយ (ភូមា) *Geochelone platynota* ស្ថិតក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ II នៃអនុសញ្ញាសាយតេស



Credit: Mark Auliya/TSEA

ស្លឹកខ្នងមានប្រវែងរហូតដល់ ២៦ស.ម



Credit: Jérôme Maran ស្លឹកក្រោម

អណ្តើកផ្កាយម៉ាដាហ្គាស្កា *Astrochelys (Geochelone) radiata* ស្ថិតក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ I អនុសញ្ញាសាយតេស




ស្លឹកខ្នងមានប្រវែងរហូតដល់ ៤០ស.ម




ស្លឹកក្រោម

អណ្តើកផ្កាយព័ងពាង *Pxyis arachnoides* ស្ថិតក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ I របស់សាយតេស



Credit: WWF-Canon / Urs WOY

ស្លឹកខ្នងមានប្រវែងរហូតដល់ ១៥ស.ម



ស្លឹកក្រោម

* Image Source: Environment Canada
All Photographs: Chris Shepherd/TSEA (except where indicated).

សូមអានបន្ថែមអំពីស្ថានភាពអភិរក្សតាមទំព័រវេបសាយ www.cites.org និង www.iucnredlist.org

Geochelone platynota - Burmese Star Tortoise

(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ) (អន្តរាគមន៍សត្វ)

អន្តរាគមន៍សត្វ (Burmese Star Tortoise)

ឈ្មោះម្យ៉ាងទៀត: Burmese Star Tortoise (អង់គ្លេស)

របាយរស់នៅ: មាននៅប្រទេសភូមា

លក្ខណៈរូបរាង: ស្លឹកខ្នងមានប្រវែងរហូតដល់ ២៦ស.ម

ស្ថានភាពអភិរក្សអន្តរជាតិ:

- ស្ថិតក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ II របស់អនុសញ្ញា ស្តីពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ លើសត្វ និងរុក្ខជាតិព្រៃដែលកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ (CITES)
- ជាប្រភេទរងគ្រោះថ្នាក់ឈានទៅរកការវិនាសផុតពីបំផុត IUCN: CR

កិច្ចការពារជាតិ:

ពុំមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេ ប៉ុន្តែត្រូវអនុវត្តតាមអនុក្រឹត្យលេខ ៥៣ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៦ ។



Credit: James Compton/TSEA

លក្ខណៈសំគាល់:

ខ្សែឆ្នុតស្រដៀងគ្នាជាមួយ មានផ្ទៃក្រោយពណ៌សដូចក្រេម

ស្លឹកខ្នងលើមានរាងមូល



គ្មានខ្សែតភ្ជាប់មកចំណុចកណ្តាលក្រឡាផ្កាយទេ

Credit: Mark Auliya / TSEA



Credit: Jérôme Maran ស្លឹកខ្នង

រូបភាពពាណិជ្ជកម្ម: សត្វរស់ភាគច្រើនជាកូន ត្រូវបានដាក់លក់នៅក្នុងហាងលក់សត្វចិញ្ចឹមកំសាន្ត



អណ្តើកផ្កាយ (ភូមា) ដែលពេញវ័យ
Credit James Compton / TSEA



ក្រឡាស្លឹកខ្នងអណ្តើកផ្កាយ (ភូមា)
Credit James Compton / TSEA

លក្ខណៈស្រដៀងគ្នា:

អណ្តើកផ្កាយ (ឥណ្ឌា) *Geochelone elegans* ស្ថិតក្នុង ឧបសម្ព័ន្ធ II អនុសញ្ញាសាធារណៈ

ខ្សែឆ្នុតខ្លាំងជាងក្រឡាផ្កាយ បែកចេញគ្រប់ទិស

ស្លឹកខ្នងខាងក្រោយមាន ទ្រនុងម៉ូមទ្រេតខ្លាំង ចំពោះសត្វពេញវ័យ



ស្លឹកខ្នងមានប្រវែងរហូតដល់ ៣៨ស.ម



ស្លឹកខ្នង

អណ្តើកផ្កាយម៉ាដាហ្គាស្កា *Astrochelys (Geochelone) radiata* ស្ថិតក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ I នៃអនុសញ្ញាសាធារណៈ

ខ្សែឆ្នុតខ្លាំងជាងក្រឡាផ្កាយមួយដង ឆ្លុះនៅលើទ្រនុងស្លឹកប្រវែង ១ភាគ ៤ នៃក្រឡាស្លឹក



Credit: Chris Shepherd / TSEA

ស្លឹកខ្នងមានប្រវែងរហូតដល់ ៤០ស.ម



Credit: Chris Shepherd / TSEA ស្លឹកខ្នង

អណ្តើកផ្កាយពឹងពាង *Pyxis arachnoides* ស្ថិតក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ I របស់សាធារណៈ

អណ្តើកខ្លះបង្ហាញឱ្យឃើញ សន្ទុះតភ្ជាប់ស្លឹកខាងពីរ



Credit: WWF-Canon / Urs WOY

ស្លឹកខ្នងមានប្រវែងរហូតដល់ ១៥ស.ម



ស្លឹកខ្នង

Geochelone (Stigmochelys) pardalis - Leopard Tortoise

(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ) (អង្គភាពអភិរក្សឈ្មោះ)

អង្គភាពអភិរក្សឈ្មោះ : (Leopard Tortoise)

ឈ្មោះផ្សេងទៀត : Leopard Tortoise (ភាសាអង់គ្លេស)

របាយការណ៍ : មាននៅប្រទេសអង់ហ្គោឡា, បួស្វាណា, អេស្តូពី, កេនយ៉ា, ឡេសូតូ, ម៉ាឡាវី, ម៉ូហ្ស៊ីប៊ីក, ណាមីប៊ី, សូម៉ាលី, អាហ្វ្រិកខាងត្បូង, ស៊ូដង់, ស្វាហ្សីឡែន, សង់ហ្គានី, អ៊ូហ្គង់ដា, ហ្សាំប៊ូ, ហ្សាំប៊ូហ្ស៊ី និងប្រទេសប្រីមីបាវ៉េ

តំណភ្ជាប់ : ស្លឹក ប្រវែង: រហូតដល់ ៧០ សម ទំងន់: ២០ គក


ស្ថានភាពអភិរក្សឈ្មោះ : ស្ថិតក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ II របស់អនុសញ្ញា CITES

កិច្ចការពារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា : ពុំមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេ តែត្រូវអនុវត្តអនុក្រឹត្យ លេខ ០៥៣ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០០៦ ស្តីពីការធ្វើ ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិលើប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិព្រៃ ដែលកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ ។



ប្រភព : WWF-Canon / Michel TERRETAZ

លក្ខណៈសម្គាល់ :



ស្នាមប៉ះពណ៌ខ្មៅនៅលើតែមស្លឹកខាង ចុងជាពិសេសមើលឃើញច្បាស់ចំពោះ សត្វនៅតូច




Image Source: Environment Canada

ស្លឹកខ្នងមើលពីលើ

- ស្លឹកមានស្នាមប៉ះពណ៌ខ្មៅអុជៗ និងស្ថិតនៅពីលើផ្ទៃពណ៌លឿង ឬពណ៌ក្រមស្រាល
- ស្នាមដែលនៅលើស្លឹកប្រែប្រួលអាស្រ័យទៅតាមទីកន្លែង ដើមដែលវាស់នៅ
- អណ្តើកខ្លះមានស្នាមរាយពាសពេញស្លឹក ខ្លះទៀតមានតិចតួច
- ការប្រែប្រួលពណ៌អាស្រ័យទៅលើអាយុកាលរបស់វា



លក្ខណៈពាណិជ្ជកម្ម : សត្វដែលនៅរស់ដាក់លក់សម្រាប់យកទៅចិញ្ចឹមកំសាន្ត



អណ្តើកខ្លះដែលចាប់ប្រមូលបាន ប្រភព : WWF-Canon/Wil LUIJF

Geochelone (Centrochelys) sulcata - African Spurred Tortoise

អណ្ណេតិកខ្លាយអាហ្វ្រិក African Spurred Tortoise

អំបូរ: Testudinidae

ឈ្មោះផ្សេងទៀត: អណ្ណេតិកខ្លាយ (ក្នុងភាសាអង់គ្លេស)

រចនាសម្ព័ន្ធ: ប្រទេសអាត អេស្ប៊ីប អ៊ីរ៉ា អេត្យូពី ម៉ាលី ម៉ារីតានី នីហ្គេរី នីសេរីយ៉ា សេនេហ្គាល់ សូម៉ាលី និងស្វីដង់

លក្ខណៈរូបរាង: ប្រវែងស្លឹកខាងលើរហូតដល់ ៨៣ ស.ម. និងទម្ងន់ខ្លួនរហូតដល់ប្រហែល ១០០ គ.ក្រ.

ស្ថានភាពនៃការអភិរក្សជាអន្តរជាតិ:

អនុសញ្ញា CITES: ឧបសម្ព័ន្ធ បរិមាណកំណត់ចំនួនសត្វ
ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិលើអណ្ណេតិកខ្លាយអាហ្វ្រិកដែលចាប់ពីឆ្នាំ២០០៦
សំរាប់គោលបំណងពាណិជ្ជកម្មមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឡើយ

បញ្ជី IUCN: ប្រភេទងាយរងគ្រោះថ្នាក់

កិច្ចការពារថ្នាក់ជាតិ:

អនុក្រឹត្យលេខ៥៣ ន ក្រ ប ក (ថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៦)


ស្តីពីពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិលើប្រភេទរុក្ខជាតិ និងសត្វព្រៃរងគ្រោះថ្នាក់




Credit: Turtle Conservancy

ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ:
សត្វរស់ត្រូវបានជួញដូរជាសត្វចិញ្ចឹម

លក្ខណសម្គាល់:



Credit: Sabine Schoppe



ពេលវេលាស្វែងរក:

- មានស្លឹករាងក្រឡា
- ពណ៌ស្រាល
- ជ័រស្លឹកស្ទើរ



Credit: Mark Auliya/TSEA

ស្របច្បាប់និង:
អណ្ណេតិកខ្លាយ
Testudo hermanni - Hermann's Tortoise
អនុសញ្ញា CITES ឧបសម្ព័ន្ធ
IUCN: ប្រភេទចង្រៃរងគ្រោះថ្នាក់



Credit: www.cheloniaphile.com




ប្រវែងរហូតដល់ ២០ ស.ម.
រចនាសម្ព័ន្ធ: នៅទ្វីបអឺរ៉ុប
Image credit: UK Border Agency

អណ្ណេតិកខ្លាយ
Testudo graeca - Spur-thighed Tortoise
អនុសញ្ញា CITES ឧបសម្ព័ន្ធ
IUCN: ប្រភេទងាយរងគ្រោះថ្នាក់



Credit: WWF-Canon/Michel Gunther



មានខ្នាតធំៗម្ខាងមួយនៅសងខាងក្នុង
ប្រវែងរហូតដល់ ៤០ ស.ម.
រចនាសម្ព័ន្ធ: នៅទ្វីបអឺរ៉ុប និងបូព៌ាប៉ែកកណ្តាល
Image credit: UK Border Agency

អណ្ណេតិកខ្លាយ
Testudo kleinmanni - Kleinmann's Tortoise
អនុសញ្ញា CITES ឧបសម្ព័ន្ធ
IUCN: ប្រភេទងាយរងគ្រោះថ្នាក់



Credit: H. Zwartepoorte, Rotterdam Zoo



ប្រវែងរហូតដល់ ១៤.៤ ស.ម.
រចនាសម្ព័ន្ធ: លីបេរី និងអេស្ប៊ីប (?)
Credit: Turtle Conservancy

អណ្ណេតិកខ្លាយ
Testudo horsfieldii - Central Asian Tortoise
អនុសញ្ញា CITES ឧបសម្ព័ន្ធ
IUCN: ប្រភេទងាយរងគ្រោះថ្នាក់



Credit: Peter Paul van Dijk



ប្រវែងរហូតដល់ ២២ ស.ម.
រចនាសម្ព័ន្ធ: ទ្វីបអឺរ៉ុបខាងកើត និងភាគខាងកើត
ខាងជើងនិងខាងត្បូងនៃទ្វីបអាស៊ី
Credit: Peter Paul van Dijk

អណ្ណេតិកខ្លាយ
Manouria emys - Asian Brown Tortoise
អនុសញ្ញា CITES ឧបសម្ព័ន្ធ
IUCN: ប្រភេទងាយរងគ្រោះថ្នាក់



Credit: Sabine Schoppe



ប្រវែងរហូតដល់ ៦០ ស.ម.
រចនាសម្ព័ន្ធ: ប្រទេសបង់ក្លាដេស ឥណ្ឌា ឥណ្ឌូនេស៊ី
ម៉ាឡេស៊ី ភូមា ថៃ និងវៀតណាម
Credit: Mark Auliya/TSEA

ស្របច្បាប់និងកូនអណ្ណេតិកខ្លាយ
Astrochelys yniphora - Ploughshare Tortoise
អនុសញ្ញា CITES ឧបសម្ព័ន្ធ
IUCN: ប្រភេទងាយរងគ្រោះថ្នាក់



Credit: Chris R Shepherd/TSEA

មានស្រកា
ទោលមួយនៅ
ផ្នែកខាងមុខ
នៃទ្រូង
រចនាសម្ព័ន្ធ: ប្រទេសម៉ាដាកាស្កា

© TRAFFIC Southeast Asia 2011

Malacochersus tornieri - Pancake Tortoise

(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ)

(អនុភូតសត្វសំប៉ែត)

អនុភូតសត្វសំប៉ែត (Pancake Tortoise)

ឈ្មោះម្យ៉ាងទៀត:

រាយការណ៍នៅ: មាននៅប្រទេសកេនយ៉ា តង់ហ្សានីញ៉ា និងប្រទេសហ្សំបូឡាវី

លក្ខណៈរូបរាង: ស្លឹកខាងលើមានប្រវែង ១៨ស.ម


លក្ខណៈសំគាល់:

ស្លឹករាងសំប៉ែត (ទោះបីសត្វធំ គឺមានកំពស់ប្រហែល ៦ស.មតែប៉ុណ្ណោះ)


ក្រឡាផ្កាយនៅលើស្លឹក (ជាទីកកស្ទះទឹកឈើឬប៉ុន្តែមិនសូវច្បាស់នៅលើសត្វខ្លះ)

ក្រឡាស្លឹកខ្លះមានសណ្ឋានស្ទើរតែរាង ៤ជ្រុងស្មើគ្នា នៅពេលមើលពីលើ

តែម្ខាងចុងស្លឹកលើ និងស្លឹកក្រោមមានលក្ខណៈរឹងបង្អួច ប៉ុន្តែនៅផ្នែកកណ្តាលមានលក្ខណៈទន់ជ្រាយនៅពេលប៉ះ ឬចាប់កាន់វា



សណ្ឋានស្លឹកខ្លះ



សណ្ឋានស្លឹកទ្រូង

Image Source: Environment Canada

ស្ថានភាពអភិរក្សអន្តរជាតិ:

- ស្ថិតក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ II នៃអនុសញ្ញាស្តីពី ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ លើសត្វ និងរុក្ខជាតិព្រៃ ដែលកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ (CITES)
- ប្រភេទងាយរងគ្រោះថ្នាក់ (IUCN: VU)



Credit: Fabian Schmidt

កិច្ចការការថ្នាក់ជាតិ (កម្ពុជា):

ការពារនៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ ដែលមានអណ្តើកស្លឹកសំប៉ែត

រស់នៅ អនុក្រឹត្យលេខ ៥៣អនក្រ បក ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៦

ស្តីពី ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិលើ ប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិព្រៃ ដែលកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ឆ្នាំ២០០៦ ។

លក្ខណៈពាណិជ្ជកម្ម: សត្វរស់លក់ដូរសម្រាប់យកទៅចិញ្ចឹមកំសាន្ត



អណ្តើកស្លឹកសំប៉ែត ដាក់លក់នៅក្នុងហាងសត្វចិញ្ចឹមកំសាន្តមួយកន្លែង

Credit: Mark Auliya / TSEA

Manouria emys - Asian Brown Tortoise

អណ្ណេកសេរាមបន្ទាត់រាង Asian Brown Tortoise

- ឈ្មោះផ្សេងទៀត :** Baning perang, Kura-kura anam kaki (ម៉ាឡេស៊ី), Kadazandusun, Suyan (សាបា ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី), Baning coklat (ឥណ្ឌូនេស៊ី)
- របាយ :** ប្រទេសបង់ក្លាដែស ឥណ្ឌា ឥណ្ឌូនេស៊ី (ស៊ូម៉ាត្រា និង បូរនេញ) ម៉ាឡេស៊ី ភូមា ថៃ និង វៀតណាម
- លក្ខណៈរូបរាង :** បណ្តោយខ្លួនប្រវែងរហូតដល់ ៦០សម និង ទម្ងន់រហូតដល់៣០គក្រ

ស្ថានភាពអភិរក្សអន្តរជាតិ :
អនុសញ្ញា **CITES** ឧបសម្ព័ន្ធ II

បញ្ជីក្រហម **IUCN** : ប្រភេទកំពុងរងគ្រោះ
ថ្នាក់ជិតផុតពូជ (**EN**)

កិច្ចការពារថ្នាក់ជាតិ :
អនុក្រឹត្យលេខ៥៣ ន ក្រ ប ក (ថ្ងៃទី ២៩ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០០៦)

ស្តីពីការពារជន្លូតអន្តរជាតិលើ ប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិព្រៃរងគ្រោះថ្នាក់
អណ្ណេកមាសរី អណ្ណេកខ្ចាស់មានអនុប្រភេទពីរ:



Credit: Chris Shepherd/TSEA

លក្ខណសំគាល់ :

ធំជាងគេបំផុត ក្នុងចំណោមប្រភេទ
អណ្ណេកទាំងអស់នៅអាស៊ី

ស្លឹកខ្នង និងស្លឹកទ្រូងមានពណ៌ដូចគ្នា

ប្រផេះ ត្នោត ឬពណ៌ខ្មៅ
ក្បាលពណ៌ត្នោត ឬខ្មៅឈ្មោល
មានបន្ទាត់នៅជើងក្រោយ



Credit: Chris Shepherd/TSEA

ស្រដៀងទៅនឹង:

បណ្តោយ: ប្រវែងរហូតដល់
៣១សម

ស្រកាខាងលើ
និងចំហៀងផុតចូលក្នុង

តែមន្តក្នុងរាងធ្មេញរណា
និងបត់ឡើងលើ

អណ្ណេកមាសរី អណ្ណេកខ្ចាស់
Manouria impressa
Impressed Tortoise
អនុសញ្ញា **CITES** ឧបសម្ព័ន្ធ II



Credit: Douglas B. Hendrie

របាយ : ប្រទេសឡាវ កម្ពុជា ម៉ាឡេស៊ី ភូមា ថៃ និងវៀតណាម

អណ្ណេកមាសរី អណ្ណេកខ្ចាស់មានអនុប្រភេទពីរ:


Manouria emys emys រកឃើញនៅ ស៊ូម៉ាត្រា និងបូរនេញ (ឥណ្ឌូនេស៊ី) ម៉ាឡេស៊ី និងប្រទេស
ថៃភាគខាងត្បូង

Manouria emys phayrei រកឃើញនៅក្នុងប្រទេស បង់ក្លាដែស ភូមា ប្រទេសថៃភាគខាងលិច-
កណ្តាល

ប្រភេទទាំងពីរនេះមានរូបរាងខុសប្លែកគ្នាតិចតួច ប៉ុន្តែប្រភេទទាំងពីរ នេះចុះក្នុង **អនុសញ្ញា**
CITES ឧបសម្ព័ន្ធ II

ស្រកាមួយគូរដែលនៅពីក្រោយជើងមុខ
មិនប៉ះទៅនឹងចង្កូរកណ្តាលទ្រូង

ស្រកាមួយគូរដែលនៅពីក្រោយជើងមុខ ប៉ះ
ទៅនឹងចង្កូរកណ្តាលទ្រូង



ស្លឹកទ្រូង (plastron)
Credit: Mark Auliya/TSEA

ស្លឹកទ្រូង (plastron)
Credit: Mark Auliya/TSEA

ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម :

សត្វរស់ សម្រាប់យកសាច់ជាអាហារ និងជាសត្វចិញ្ចឹម



Credit: Chris Shepherd/TSEA



Credit: Mark Auliya/TSEA

Manouria impressa - Impressed Tortoise

អណ្ណេតិកម្មស រឺ អណ្ណេតិក ខ្លាច់ Impressed Tortoise

ស្ថានភាពអភិរក្សអន្តរជាតិ ^១

អនុសញ្ញា CITES ឧបសម្ព័ន្ធ II

ឈ្មោះផ្សេងទៀត : Banning bukit (ម៉ាឡេស៊ី); Baning Asia (ឥណ្ឌូនេស៊ី)

រហាយ : ប្រទេសឡាវ កម្ពុជា ម៉ាឡេស៊ី ភូមា ថៃ និងវៀតណាម

លក្ខណៈរូបរាង : បណ្តោយខ្លួនរហូតដល់ ៣៣ សម

បញ្ជីក្រហម IUCN: ជាប្រភេទងាយរងគ្រោះថ្នាក់ (VU)

កិច្ចការពារថ្នាក់ជាតិ:


អនុក្រឹត្យលេខ៥៣ ន ក្រ ប ក (ថ្ងៃទី ២៩ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០០៦)

ស្តីពីពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិលើ ប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិព្រៃរងគ្រោះថ្នាក់



Credit: Douglas B. Hendrie

លក្ខណៈសំគាល់:



Credit: Douglas B. Hendrie

Credit: Douglas B. Hendrie

ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម:

សត្វរស់ សម្រាប់ យកសាច់ជាអាហារ និងជាសត្វចិញ្ចឹម



Credit: ENV/R

ស្រដៀងទៅនឹង:

អណ្ណេតិកសោមបន្ទាភ្លៅ

Manouria emys
Asian Brown Tortoise
អនុសញ្ញា CITES
ឧបសម្ព័ន្ធ II



Credit: Chris Shepherd/TSEA

ជាអណ្ណេតិកអាស៊ីធំជាងគេបំផុត (ប្រវែងរហូតដល់ ៦០ សម) ។

ក្បាលពណ៌ត្នោត ឬ ខ្មៅ

ស្លាកខ្លាំង និងស្លាកទ្រូង ពណ៌ប្រផេះ ត្នោត ឬខ្មៅ

ស្លាកខ្លាំង និងស្លាកទ្រូងមិនផុត

តែមន្ទុកខ្លាំង មិនមានរាងធ្មេញរណា និងកោងឡើងលើ

រហាយ: ប្រទេសបង់ក្លាដែស ឥណ្ឌា ឥណ្ឌូនេស៊ី (ស៊ូម៉ាត្រា និងបូរនេចូ) ម៉ាឡេស៊ី ភូមា ថៃ និងវៀតណាម

^១ សូមអានបន្ថែមអំពីស្ថានភាពអភិរក្សនៅក្នុងគេហទំព័រ www.cites.org និង www.iucnredlist.org

Amyda cartilaginea - Asiatic Softshell Turtle

(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ) (ឈ្មោះភាសាខ្មែរ កន្ទាយអាស៊ី)

កន្ទាយអាស៊ី

ឈ្មោះផ្សេងៗទៀត : Labi labi, Labi labi super, Kuaya emas; (ឈ្មោះជាភាសាឥណ្ឌូនេស៊ី)

រចនាសម្ព័ន្ធ : ប្រទេសប្រូយណេ, ដាវូសាឡីម, កម្ពុជា, ឥណ្ឌូនេស៊ី, ឡាវ, ម៉ាឡេស៊ី, ភូមា, សិង្ហបុរី, សៀម, វៀតណាម

តំលៃភាគ : ស្តុកខ្នងអាចមានប្រវែងរហូតដល់ ១០០ ស.ម

ស្ថានភាពអភិរក្សវិទ្យាសាស្ត្រ : “ ចុះក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ II នៃអនុសញ្ញាសាយតេស


និងបញ្ជីក្រហមរបស់អង្គការ IUCN : ជាប្រភេទងាយរងគ្រោះថ្នាក់ (VU)

កិច្ចការការពារសត្វបង្កប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា : កន្ទាយអាស៊ីត្រូវបានការពារស្របនឹងច្បាប់ ស្តីពី ជលផល ឆ្នាំ ២០០៦ និងអនុក្រឹត្យ លេខ ០៥៣ អនក្រ ចុះថ្ងៃទី ២៩ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០០៦ ស្តីពី ការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម អន្តរជាតិលើប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិព្រៃដែលកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ (សាយតេស)



កន្ទាយអាស៊ី
ប្រភព: Mark Auliya

លក្ខណៈសម្គាល់ :



ប្រភព: Mark Auliya

ស្មាមអុចៗ
ពណ៌លឿងនៅ
លើក្បាល និង ក

ច្រមុះមានរាងជា
បំពង់តូចវែងត្រង់
ទៅមុខ



ប្រភព: Mark Auliya

ស្តុកខ្នងមានរាងមូល
មានពណ៌ជាច្រើនជាមួយស្តុកផ្នែកខាងមុខ



ស្រដៀងគ្នាទៅនឹង : ប្រភេទកន្ទាយក្បាលធំបញ្ជីក្រហម
របស់អង្គការ IUCN ជាប្រភេទរងការប្រថុយប្រថានតិចតួច LR




ប្រភព: Pauli Hien

ស្តុកខ្នងអាចមានប្រវែងរហូតដល់ ៣៥ ស.ម

រចនាសម្ព័ន្ធ : ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី, ម៉ាឡេស៊ី, ភូមា, ហ្វីលីពីន, សិង្ហបុរី

ច្រមុះមានរាង
ជាបំពង់តូចវែង
ត្រង់ទៅក្រោម



ប្រភព: Chris Shepherd/TSEA

ស្តុកខ្នងមានរាងសំប៉ែតរាប និងរលោងបន្តិច

មានឆ្នុតពណ៌ខ្មៅនៅចំកណ្តាលស្តុកខ្នង
និងនៅសងខាងមានចំណុចខ្មៅតូចៗ ២ ឬ ៣



ប្រភព: Mark Auliya

ស្តុកខ្នងផ្នែកខាងមុខរាបស្មើពុំមានដុំកតូចៗទេ

លក្ខណៈជួញដូរ : ទិញ-លក់ខ្លួនសត្វទាំងស្រុងសម្រាប់យកទៅធ្វើជាអាហារ



កន្ទាយអាស៊ីដែលត្រូវបានគេជួញដូរ
ប្រភព: Chris Shepherd/TSEA



កន្ទាយអាស៊ីមុនពេលដឹកជញ្ជូនតាមនាវា (សំគាល់: ស្តុកខ្នង ទទួលរងការខូចខាតច្រើន)
ប្រភព: Chris Shepherd/TSEA

Chitra spp. - រមិចធីរ៉ា

រមិចធីរ៉ា

អំបូរ: Trionychidae

ឈ្មោះផ្សេងៗទៀត: ឡាប៊ី- ឡាប៊ី ប៊ីនតាង (ឥណ្ឌូណេស៊ី) មែនឡៃ (ម៉ាឡេស៊ី) រមិចក្បាលតូច (អង់គ្លេស)

រចនាប្រភេទ: ប្រភេទសត្វលាមក ឥណ្ឌូណេស៊ី ភូមា ថៃ ប៊ុគីណាស និង ម៉ាឡេស៊ី

លក្ខណៈរូបរាង:

ប្រវែងស្លឹកខាងលើរហូតដល់ ១៨៣ ស.ម.

ស្ថានភាពនៃការអភិរក្សជាអន្តរជាតិ: ^a

គ្រប់ប្រភេទរមិចធីរ៉ាទាំងអស់ត្រូវបានចុះក្នុង
អនុសញ្ញា CITES: ឧបសម្ព័ន្ធ២

IUCN: កំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ឈានទៅរកការវិនាស
មុតមុត(CR) និងកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់មុតមុត(EN)
កិច្ចការពារថ្នាក់ជាតិ:

អនុក្រឹត្យលេខ២៣ ន ក្រ ប ក (ថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៦)

ស្តីពីពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិលើប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិព្រៃរងគ្រោះថ្នាក់



កូនរមិចធីរ៉ា *Chitra chitra* (ថៃ)
ថតដោយ Peter Paul van Dijk

លក្ខណៈសម្គាល់:

ស្លឹកមានជាតិស្បែក

ស្លឹកលើមានរាងមូលសំប៉ែត ហើយរលោងចំពោះរមិចធំ

ទ្រូងមានពណ៌សទឹកដោះគោប្រពណ៌ផ្កាឈូកខ្លី

ក្បាលតូចវែង និងសំប៉ែតខ្លាំង

ចន្លោះរវាងភ្នែកទាំងពីរតូចជាងទំហំរង្វង់ភ្នែក

Chitra vandijki
ថតដោយ Jonathan Murray



Chitra chitra (ថៃ)
ថតដោយ Peter Paul van Dijk

ប្រភេទទាំងបីរបស់រមិចធីរ៉ា :

រមិចធីរ៉ាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (*Chitra chitra*)

IUCN: កំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ឈានទៅរកការវិនាសមុតមុត (CR)

សម្បុរ: ពណ៌បៃតងខ្លី ឬពណ៌ប្រេងអូលីវបៃតង ។ រមិចមកពីកោះចាវ៉ាប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ីពណ៌ខ្មៅ
របាយ: ឥណ្ឌូណេស៊ី ម៉ាឡេស៊ី និងថៃ

រមិចធីរ៉ាភូមា (*Chitra vandijki*)

IUCN: មិនមានចុះក្នុងបញ្ជី

ជាទូទៅពណ៌ត្នោតមាស់
របាយ: ភូមា

រមិចធីរ៉ាឥណ្ឌា (*Chitra indica*)

IUCN: កំពុងរងគ្រោះថ្នាក់មុតមុត (EN)

ពណ៌សម្បុរ: ពណ៌ក្រមៅចាស់ទៅពណ៌ប្រេងអូលីវបៃតង ។ ពេលនៅតូចអាចមានក្រឡាដូចរូប
ភ្នែកបួនពីរលើស្លឹក ។

របាយ: ប្រទេសបង់ក្លាដេស ឥណ្ឌា នេប៉ាល់ និងប៊ុគីណាស



Chitra chitra
(ចាវ៉ា ឥណ្ឌូណេស៊ី)
ថតដោយ Jonathan Murray



ថតដោយ Peter Paul van Dijk

ពាណិជ្ជកម្មរួមមាន:
សាច់ជាអាហារ

ស្របច្បាប់និង:

រមិច
Pelochelys spp.



ថតដោយ Arthur Georges

ពណ៌ និងក្រឡាចំរុះ អាចជាពាក្យកំរិត

ប្រវែងស្លឹកខាងលើរហូតដល់ ១៥០ ស.ម.

ចន្លោះរវាងភ្នែកទាំងពីរតូចជាងទំហំរង្វង់ភ្នែក



ថតដោយ Sabine Schoppe

ក្បាលតូចខ្លី

របាយ: ប្រទេសអូស្ត្រាលី បង់ក្លាដេស កម្ពុជា ចិន
ឥណ្ឌា ឥណ្ឌូណេស៊ី ឡាវ ម៉ាឡេស៊ី ភូមា ប៊ុគីណាស
ភីលីពីន ថៃ និងវៀតណាម

Pelochelys spp. - រមិច

រមិច

អំបូរ: Trionychidae

ឈ្មោះផ្សេងទៀត: កន្ទាយក្បាលកង្កែប ឡាប៊ី-ឡាប៊ី រ៉ាកសាសា (ឥណ្ឌូណេស៊ី) អានទីប៉ា (ភីលីពីន)

រចនាសម្ព័ន្ធ: អូស្ត្រាលី(?) បង់ក្លាដេស កម្ពុជា ចិន ឥណ្ឌា ឥណ្ឌូណេស៊ី ឡាវ ម៉ាឡេស៊ី ភូមា ប៉ាពួញូហ្គីនា ភីលីពីន ថៃ និងវៀតណាម

លក្ខណៈរូបរាង:

ប្រវែងស្លូកខាងលើរហូតដល់ ១៥០ ស.ម.

ឆ្លាតភាពនៃការអភិរក្សជាអន្តរជាតិ:

គ្រប់ប្រភេទរមិចទាំងអស់ត្រូវបានចុះក្នុង

អនុសញ្ញា CITES: ឧបសម្ព័ន្ធ២

IUCN: កំពុងរងគ្រោះថ្នាក់មិនផុតពី(EN) និងងាយរងគ្រោះថ្នាក់(VU)

កិច្ចការពារថ្នាក់ជាតិ:

អនុក្រឹត្យលេខ៥៣ ន ក្រ ប ក (ថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៦)

ស្តីពីពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិលើប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិព្រៃរងគ្រោះថ្នាក់



រូបថត: Sabine Schoppe

លក្ខណសម្គាល់:

- ស្លូកមានជាតិស្បែក
- ស្លូកលើមានរាងមូលដ្ឋានប៉ែត ហើយរលោងចំពោះរមិចធំ
- ទ្រូងមានពណ៌សទឹកដោះគោ
- ក្បាលធំខ្លី
- ចន្លោះរវាងភ្នែកទាំងពីរធំជាងទំហំរង្វង់ភ្នែក



Pelochelys cantorii
រូបថត: Sabine Schoppe



Pelochelys bibroni
រូបថត: Arthur Georges

ប្រភេទទាំងបីរស់រមិច:

រមិច (*Pelochelys cantorii*)

IUCN: កំពុងរងគ្រោះថ្នាក់មិនផុតពី(EN)

សម្បុរ: ស្លូកលើពណ៌ត្នោតហើយគ្មានក្រឡា
រចនាសម្ព័ន្ធ: បង់ក្លាដេស កម្ពុជា ចិន ឥណ្ឌា ឥណ្ឌូណេស៊ី(ស៊ីម៉ាត្រា កាលីម៉ាតាន ស៊ីឡាវេស៊ី)
ឡាវ ម៉ាឡេស៊ី ភូមា ប៉ាពួញូហ្គីនា ភីលីពីន ថៃ និងវៀតណាម

រមិចឆ្នូតញ្ជុំត្រីតា (*Pelochelys bibroni*)


IUCN: ងាយរងគ្រោះថ្នាក់ (VU)

សម្បុរ: ស្លូកមានក្រឡាស្រដៀងរមិចប៉ាវ៉ា ប៉ុន្តែមានខ្សែឆ្នូតធំៗពណ៌ត្នោតលាតសន្ធឹងពីក្រោយ.ក៏ទៅដល់កណ្តាលស្លូក(រូបខាងលើ)
រចនាសម្ព័ន្ធ: ឥណ្ឌូណេស៊ីប៉ាពួ ប៉ាពួញូហ្គីនា និងអូស្ត្រាលី(?)

រមិចអុប្ស័ (*Pelochelys signifera*)

IUCN: មិនមានក្នុងបញ្ជី

សម្បុរ: ស្លូកប្រវែង ៥៥ស.ម. ពណ៌ប្រេងអូលីវត្នោត ហើយគ្មានក្រឡា
រចនាសម្ព័ន្ធ: ឥណ្ឌូណេស៊ីប៉ាពួ និងប៉ាពួញូហ្គីនា



Pelochelys cantorii
រូបថត: Sabine Schoppe



Pelochelys cantorii
រូបថត: Sabine Schoppe

ពាណិជ្ជកម្មចម្រុះ:

សាច់ជាអាហារ

ស្រមោលនិង:

រមិចជ័រ

Chitra spp.



រូបថត: Jonathan Murray

ពណ៌ និងក្រឡាចម្រុះ

ចន្លោះរវាងភ្នែកទាំងពីរតូចជាងទំហំរង្វង់ភ្នែក

ក្បាលស្រួចវែង



រូបថត: Jonathan Murray

រចនាសម្ព័ន្ធ: បង់ក្លាដេស ឥណ្ឌា ឥណ្ឌូណេស៊ី ម៉ាឡេស៊ី ភូមា នេប៉ាល់ ប៉ាគីស្ថាន និងថៃ

Pelodiscus sinensis - Chinese Softshell Turtle

កន្លាយចិន Chinese Softshell Turtle

ឈ្មោះផ្សេងទៀត : Labi China (ម៉ាឡេស៊ី), Labi labi Cina (ឥណ្ឌូនេស៊ី)

របាយ : ប្រទេសចិន ជប៉ុន តៃវ៉ាន់ និងវៀតណាម មានចិញ្ចឹមច្រើនក្នុងកសិដ្ឋាន

លក្ខណៈរូបរាង : បណ្តោយខ្លួនប្រវែង ២៥-៣៥ សម

ស្ថានភាពអភិរក្សអន្តរជាតិ : ^α

មិនចុះក្នុងបញ្ជីអនុសញ្ញា CITES

បញ្ជីក្រហម IUCN : ងាយទទួលបានគ្រោះថ្នាក់ (VU)

កិច្ចការពារថ្នាក់ជាតិ :

មិនចុះបញ្ជី



Credit: Bui Dang Phong

លក្ខណៈសំគាល់ :

- ពណ៌ប្រែប្រួលគួរអោយកត់សំគាល់ (បៃតង ប្រផេះត្នោត)
- អាចមានស្នាមខ្មៅលើស្បែកខ្នង
- មានច្រមុះវែង បើធៀបទៅនឹងកន្លាយភាគច្រើន
- ស្លឹកខ្នងជាញឹកញាប់មានចង្កូវ

មានពកមូលច្បាស់មួយនៅលើ
តែមស្លឹកខ្នងខាងមុខ



Credit: Mark Auliya/TSEA



Credit: Bui Dang Phong



Credit: TSEA



Credit: TSEA



Credit: Mark Auliya/TSEA

កូនព្យាស់ : ពណ៌ក្រហម/ពណ៌ទឹកក្រូច (អាចពណ៌លឿង
ឬពណ៌ស) ប៉ុន្តែជានិច្ចកាលមានស្នាមអុជពណ៌
ខ្មៅនៅជើងខាងក្រោយ និងស្លឹកខ្នង

សំគាល់ : ពណ៌ប្រែប្រួលតាមសត្វនីមួយៗ

ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម :

សត្វរស់ សម្រាប់ជាសត្វចិញ្ចឹម និងយកសាច់
ជាអាហារ



កូនតូចៗមានដាក់លក់នៅតាមហាងលក់សត្វចិញ្ចឹម
Credit: Chris Shepherd/TSEA

ស្រដៀងទៅនឹង :

កន្លាយអាស៊ី *Amyda cartilaginea*

អនុសញ្ញា CITES ឧបសម្ព័ន្ធ II

បញ្ជីក្រហម IUCN : ប្រភេទងាយទទួលបានគ្រោះថ្នាក់ (VU)

- ស្នាមអុជពណ៌លឿង នៅលើក្បាល និងក
- ច្រមុះត្រង់វែង
- តែមស្លឹកខ្នងខាងមុខត្រឡឹម មានពកមូលច្បាស់



Credit: Mark Auliya/TSEA

កន្លាយក្បាលធំ *Dogania subplana*

មិនចុះក្នុងបញ្ជីអនុសញ្ញា CITES

បញ្ជីក្រហម IUCN : ជាប្រភេទងាយការប្រថុយប្រថានតិចតួច (LR)

- មានឆ្មតខ្មៅនៅកណ្តាលស្បែកខ្នង
- ជាយតែមស្លឹកខ្នង ខាងមុខរាបស្មើ
- ច្រមុះកោងចុះក្រោមវែង



Credit: Mark Auliya/TSEA



នៅផ្សារលក់សាច់
Credit: Chris Shepherd/TSEA

Dyscophus antongilii - Tomato Frog

កង្កែបម៉ែងឆ្មារ Tomato Frog

ឈ្មោះផ្សេងទៀត : Northern Tomato Frog

របាយ : ម៉ាដាហ្គាស្ការ

លក្ខណៈរូបរាង : បណ្តោយខ្លួនប្រវែង ៦-១០,៥សម

ស្ថានភាពអភិរក្សអន្តរជាតិ : “
អនុសញ្ញា **CITES** ឧបសម្ព័ន្ធ I

បញ្ជីក្រហម **IUCN**: ជិតទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ (NT)


កិច្ចការពារថ្នាក់ជាតិ :

អនុក្រឹត្យលេខ៥៣ ន ក្រ ប ក (ថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៦)
ស្តីពីពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិលើ ប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិព្រៃរង
គ្រោះថ្នាក់



Credit: Mark Auliya/TSEA

លក្ខណៈសំគាល់ :



ពណ៌ប្រែប្រួល តែជានិមិត្តរូបក្រហមជាង *Dyscophus guineti*

Image Source: Environment Canada

ស្រដៀងទៅនឹង :

Dyscophus guineti
Southern Tomato Frog / False Tomato Frog
ពុំមានចុះក្នុងអនុសញ្ញា **CITES**

បណ្តោយខ្លួនប្រវែង
៦,៤-១០សម

ស្នាមតូចៗពណ៌ខ្មៅ
ស្នាមពណ៌ត្នោតចាស់
នៅលើខ្នង (អាចមិន
សូវច្បាស់ ឬអត់មាន)


ផ្គត់ផ្គង់

គល់ម្រាមជើង
ក្រោមជាប់



ពណ៌ប្រែប្រួល ប៉ុន្តែ ជានិមិត្តរូបក្រហម
ស្រាលជាង *Dyscophus antongilii*

Image Source: Environment Canada



ក្រោមចង្កាពណ៌ស

ឆ្នុតតូចវែងមិនស្មើ
សាច់ ពណ៌ខ្មៅឬត្នោត



Credit: R. Isotti, A. Cambone - Homo ambiens / WWF-Canon

ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម :

សត្វរស់សម្រាប់ធ្វើសត្វចិញ្ចឹម

Scleropages formosus - Asian Arowana

(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ)

(ត្រីតាពត ឬ ត្រីនាគ)

ត្រីតាពត ឬ ត្រីនាគ

ឈ្មោះផ្សេងៗទៀត : Ikan Kelisa (ម៉ាឡេស៊ី) Ikan Kelesar (ភាសាឥណ្ឌូនេស៊ី) Jinglongyu

(ចិន Hanyupinying) ខ្មែរ: ត្រីតាពត (អង់គ្លេស)

រោងសំណៅ : កម្ពុជា, ឥណ្ឌូនេស៊ី (កោះបង់កា, សូម៉ាត្រា, កាលីម៉ាន់តាន់) ឡាវ, ម៉ាឡេស៊ី (រួមទាំងកោះសារ៉ាវ៉ាក់), ភូមា, ថៃ និងវៀតណាម

តំណក់ : ត្រីពេញវ័យអាចមានប្រវែងដងខ្លួនរហូតដល់ ១០០ ស.ម ប៉ុន្តែភាគច្រើនមានប្រវែង ត្រឹម តែ ៥០-៦០ ស.ម

ស្ថានភាពអភិរក្សវិស័យ : ស្ថិតក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ I នៃអនុសញ្ញាសាយតេស

ប្រភេទត្រីដែលគេបង្កាត់ពូជអាចធ្វើការផ្ទេរពូជបាន លុះត្រាតែគោរពតាមគោលការណ៍ បីយ៉ាងដូចខាងក្រោម :

១- អ្នកបង្កាត់ពូជត្រីត្រូវចុះបញ្ជីជាមួយអាជ្ញាធរសាយតេស

២- ត្រីនោះមានបិទស្លាកសម្គាល់ (Microchip)


៣- ត្រីនោះជាលទ្ធផលបង្កាត់នៅជំនាន់ F2 (ជំនាន់ទី ២)

សៀវភៅក្រហមរបស់អង្គការ : អង្គការ IUCN: ជាប្រភេទកំពុងទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ ឆ្ម

កិច្ចការពារស្របច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា : ការពារដោយច្បាប់ ស្តីពី ជលផល ឆ្នាំ ២០០៦



លក្ខណៈសម្គាល់ :




ចំនួនស្រកានៅម្ខាងដងខ្លួនត្រី ចាប់ពីដើមស្រក រហូតដល់គល់កន្ទុយមានស្រក ២១ ទៅ ២៤

ត្រីពេញវ័យ



កូនត្រី

លក្ខណៈស្រដៀងគ្នាជាមួយ : Jardin's Arowana



ចំនួនស្រកានៅម្ខាងដងខ្លួនត្រី ចាប់ពីដើមស្រក ដល់គល់កន្ទុយមានស្រកចាប់ពី ៣៥ ឡើងទៅ

ត្រីពេញវ័យ



កូនត្រី

លក្ខណៈនៃការថ្លងថ្លង : Silver Arowana



ប្រភព: Australia Customs

លក្ខណៈស្រដៀងគ្នាជាមួយ : Silver Arowana



កូនត្រី

All photos (except where indicated) credited to: Tan Heok Hui

“សូមអានបន្ថែមអំពីស្ថានភាពអភិរក្សនៅលើទំព័រវេបសាយ www.cites.org និង www.iucnredlist.org

មករា ២០០៨



Cheilinus undulatus - Humphead Wrasse

(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ) (ត្រី Humphead Wrasse)


ត្រី Humphead Wrasse

ឈ្មោះម្យ៉ាងទៀត: Mameng, Licin, Langkawit (ម៉ាឡេស៊ី), So-mei (ភាសាចិន)

របាយការណ៍: មហាសមុទ្រឥណ្ឌាភាគខាងកើត និងខាងលិច មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកខាងកើតភាគកណ្តាល ពាយ័ព្យ និងខាងលិចភាគកណ្តាល

លក្ខណៈរូបរាង: ប្រវែង: ២២៩សម ទំងន់អតិបរិមា: ១៩១គ.ក

លក្ខណៈសំគាល់:



លក្ខណៈសំគាល់: ត្រី *Cheilinus chlorourus* (Floral Maori)

- ពុំមានស្នាមឆ្នុតដិតច្បាស់ដូចកាត់ភ្នែក ឬ ព្រួយកន្ទុយ មិនមានពណ៌លឿងខ្ចីច្បាស់
- មានស្នាមអុជពណ៌សដូចជាជួរ

ត្រី *Cheilinus trilobatus* (Triple Tail Wrasse)

- ស្នាមឆ្នុតដិតច្បាស់ដូចកាត់ភ្នែក ឬ ព្រួយកន្ទុយ មិនមានពណ៌លឿងខ្ចីច្បាស់
- មានស្នាមអុជពណ៌សដូចជាជួរ ពណ៌ផ្កាឈូក

លក្ខណៈសំគាល់:

- ស្ថិតក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ II នៃអនុសញ្ញា ស្តីពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិលើប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិព្រៃ ដែលកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ (CITES)
- ជាប្រភេទដែលកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ជិតផុតពូជ IUCN:EN

កិច្ចការពារភ្នំភ្នំ (កម្ពុជា)

- អនុក្រឹត្យលេខ ៥៣អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៦ ស្តីពី ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិលើប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិព្រៃ ដែលកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ ។



Credit: WWF-Canon / WWF / Hong Kong Cindy Cheng

លក្ខណៈពាណិជ្ជកម្ម:

ត្រីសំបុកយកទៅចិញ្ចឹមក្នុងអាងចិញ្ចឹមត្រី ឬលក់ឱ្យភោជនីយដ្ឋាន ។ ជាទូទៅគេដឹកជញ្ជូនត្រីទាំងមូល ។ ទីផ្សារជាទូទៅត្រូវការទំងន់ពី ០.៥គ.ក ទៅ ១គ.ក និងទំហំពី ៣០-៤០ស.ម



ជួនប្រើសំរាប់ដាក់ចាប់ត្រី Humphead Wrasse
Credit: Debbie Ng



ត្រី Humphead Wrasse ដែលរង់ចាំការផ្ទេរ
Credit: Julia Ng / TSEA



ត្រីដែលគេកំពុងធ្វើការចាប់ផ្តើម
Credit: Debbie Ng



ត្រី Humphead Wrasse ដាក់តាំងបង្ហាញលក់នៅតាមភោជនីយដ្ឋាន
Credit: WWF-Canon / Michele DUPRAZ

Hippocampus spp. - Seahorse spp.

(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ)

(ឈ្មោះសាមញ្ញ)

ពពួកសេះសមុទ្រ (Seahorse spp.)

ឈ្មោះម្យ៉ាងទៀត: Sea horse (អង់គ្លេស)

រាយការណ៍នៅ: មាននៅតាមឆ្នេរសមុទ្រតំបន់ត្រូពិក និងទឹកកំដៅមធ្យម (ចាប់ពី ប្រហែល ៥០ អង្សា ភាគខាងជើង រហូតដល់តំបន់មានកំដៅ ៥០ អង្សា ភាគខាងត្បូង)

លក្ខណៈរូបរាង: កំពស់ប្រែប្រួលចាប់ពី ២ស.ម ដល់ ៣៥ស.ម

លក្ខណៈសំគាល់:

ក្បាលរៀង
ដូចសេះ



កន្ទុយធំ
ចាប់ចំណី

Credit: Ocean Park Hong Kong

លក្ខណៈស្រដៀងទេសៗ: ត្រីខ្សែរ



- ខ្លួនតូចរៀងទ្រវែង (ដូចសេះសមុទ្រពេលវាពន្លាខ្លួនអោយត្រង់)
- កន្ទុយមិនធំចាប់ចំណីទេ ប៉ុន្តែវាអាចរុំ ឬព័ន្ធបាន

អាគសមុទ្រ:



- រាងទ្រវែងជាខ្លាំងដូចស្លឹកឈើ (បរិមាណ និងអាការៈខុសគ្នា អាស្រ័យលើប្រភេទសត្វ)
- មានដងខ្លួនលាតសំប៉ែត ជ្រៅ

Photo Credits: Ocean Park Hong Kong

ស្ថានភាពអភិរក្សអន្តរជាតិ:

ស្ថិតក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ II នៃអនុសញ្ញា ស្តីពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិលើ

- ប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិព្រៃ ដែលកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ (CITES)
- សៀវភៅក្រហមអង្គការ IUCN ជាប្រភេទកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ជិតផុតពូជ (EN)

កិច្ចការការថ្លាក់ជាតិ (កម្ពុជា)

ច្បាប់ស្តីពី ជលផល ឆ្នាំ២០០៦ និងអនុក្រឹត្យលេខ ៥៣ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៦ ស្តីពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ លើប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិ ព្រៃដែលកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ ។



Credit: Ocean Park Hong Kong

លក្ខណៈពាណិជ្ជកម្ម: សេះសមុទ្រហាលក្រៀមប្រើសំរាប់ផលិតឱសថបុរាណ ឬវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ សត្វនោះរស់ត្រូវបានគេលក់ដូរសម្រាប់ចិញ្ចឹមកំសាន្ត ។



សេះសមុទ្រហាលក្រៀមតាំងលក់
Credit: Chris Shepherd/TSEA



សេះសមុទ្រហាលក្រៀម
Credit: WWF-Canon / John E. Newby



សេះសមុទ្រក្រៀម
Credit: TRAFFIC SEA



សេះសមុទ្រក្រៀមតាំងលក់
Credit: TRAFFIC SEA

Tridacnidae spp. - Giant Clam spp.

ពពួកត្រីយក្ស Giant Clam spp.

ឈ្មោះផ្សេងទៀត : Kima (ម៉ាឡេស៊ី)

រចនាប្រភេទ : ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិក

លក្ខណៈរូបរាង : ដងខ្លួនប្រវែងរហូតដល់ ១៣០សម និងទំងន់រហូតដល់៣០០គីឡូ ។

ស្ថានភាពអភិរក្សអន្តរជាតិ : ^១

ប្រភេទទាំងអស់ក្នុងសន្តាន Tridacnidae spp.

ចុះក្នុងបញ្ជីអនុសញ្ញា CITES ឧបសម្ព័ន្ធ II

បញ្ជីក្រហម IUCN : ចុះក្នុងបញ្ជីចំនួនបួនប្រភេទ ប្រែប្រួលពី ទទួលបានគ្រោះថ្នាក់តិចតួច ទៅងាយរងគ្រោះថ្នាក់

កិច្ចការពារថ្នាក់ជាតិ :

អនុក្រឹត្យលេខ៥៣ ន ក្រ ប ក (ថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៦)

ស្តីពីពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិលើប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិព្រៃរង គ្រោះថ្នាក់



Credit: TSEA

លក្ខណៈសំគាល់ :

សត្វរស់

សាច់ក្រាស់គ្របពីលើដងខ្លួន (mantle) លាតសន្ធឹងទៅក្បែរស្នូក ពេលបើក

ដងខ្លួនអាច
មានពណ៌ភ្លឺ



Credit: Aileen Tan Shau-Hwai



Credit: Mauri RAUTAKRI - WWF/Canon

ងាប់ (សំបកតែប៉ុណ្ណោះ)

សំបកខាងក្នុងមិនដូចគ្នា ហើយភ្លឺ



Credit: Claire Beastall



Credit: Claire Beastall



Credit: Claire Beastall

ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម :

សាច់ សំបក និងសត្វរស់សម្រាប់ចិញ្ចឹមក្នុងអាង



Credit: Alain COMPOST / WWF-Canon



សាច់ត្រីយក្ស ដាក់តាំងលក់
Credit: Aileen Tan Shau-Hwai



Credit: TSEA



សាច់ត្រីយក្ស ដាក់តាំងលក់
Credit: Aileen Tan Shau-Hwai

Nepenthes spp. – Pitcher Plants

(រុក្ខជាតិបំពង់ស្រមោច)

(ពួករុក្ខជាតិផ្កាអាណូមី)

រុក្ខជាតិបំពង់ស្រមោច :

ឈ្មោះផ្សេងៗ : Pitcher Plant (ភាសាអង់គ្លេស)

ឈ្មោះសំនៀង : មានដុះនៅតាមតំបន់ភាគខាងជើងប្រទេសអូស្ត្រាលីកាត់តាមតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ រហូតទៅដល់តំបន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសចិន

កិច្ចអភិរក្សរុក្ខជាតិសាគលៈ^១ :

មានពីរប្រភេទ *Nepenthes rajah* និង *Nepenthes khasiana* ដែលបានចុះបញ្ជី ឧបសម្ព័ន្ធ I នៃអនុសញ្ញា CITES ក្រៅពីនេះជាប្រភេទដែលបានចុះក្នុងបញ្ជី ឧបសម្ព័ន្ធ II របស់អនុសញ្ញា សាយតេសទាំងអស់

កិច្ចការពារស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា : គ្រប់ប្រភេទរុក្ខជាតិ ត្រូវបានការពារដោយច្បាប់ ស្តីពី ព្រៃឈើ ឆ្នាំ ២០០២ ។



Nepenthes macfarlanei (upper pitchers)
Credit: Carrol Lawrence

លក្ខណៈសំគាល់ :

សំគាល់ :

- មានវល្លិដូចទង ឬដើមតូច និងមានស្លឹកវែង ស្រួច វាអាចក្លាយជាមែក
- ទងផ្កាដុះចេញ ពីផ្នែកខាងចុងនៃស្លឹក ប៉ុន្តែវាមិនដុះចេញ ពីគ្រប់ស្លឹកទាំងអស់នោះទេ



ប្រភេទ *Nepenthes albomarginata*
ប្រភព: Carrol Lawrence



ប្រភេទ *Nepenthes albomarginata*
ប្រភព: K.Kaliyanan

បំពង់ផ្កាដុះចេញ ពីវល្លិដែលដុះបន្ត ចេញពី ផ្នែកខាង ចុងស្លឹក



ប្រភេទ *Nepenthes burbidgeae*
ប្រភព: Carrol Lawrence



ប្រភេទ *Nepenthes macfarlanei* (lower pitchers)
ប្រភព: Carrol Lawrence



ប្រភេទ *Nepenthes sanguinea*
ប្រភព: Carrol Lawrence

ប្រភេទដែលមានចុះក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ I សាយតេស :

ប្រភេទ *Nepenthes rajah* អង្គការ IUCN ចាត់ទុកជាប្រភេទកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ ជិតផុតពូជ (EN)
រាយការណ៍នៅ : ប្រទេសម៉ាឡេ (តំបន់សាបា) មាននៅ តៃភ្នំ Kinabalu និង Tamboyukon តៃប៉ូណ្តូ

ជាប្រភេទមួយដែលមានបួស/ ដៃដុះចេញពីផ្នែកខាង ក្រោម ស្លឹកប្រហែល ១.៣ ពីផ្នែក ខាងចុងស្លឹក



Nepenthes rajah
Credit: Carrol Lawrence

បំពង់ផ្កាអាចរហូតបានប្រវែង ៣៥ ស.ម និងរីកទម្ងន់បាន ១៨ ស.ម និងអាចផ្ទុកទឹក បានរហូតដល់ ០៣ ស៊ីត្រ

ប្រភេទ *Nepenthes khasiana* អង្គការ IUCN មិនទាន់ធ្វើ ចំណាត់ថ្នាក់នៅឡើយ
រាយការណ៍នៅ : ប្រទេសឥណ្ឌា

ចំណាំ : អ្នកគួរតែទាក់ទងជំនាញការក្នុងស្រុក ដើម្បីធ្វើការវិជ្ជមានបន្ថែម

លក្ខណៈពាណិជ្ជកម្ម :

រុក្ខជាតិដែលនៅរស់ត្រូវបានគេ យកទៅដាក់លក់



Nepenthes rafflesiana in trade
Credit: Carrol Lawrence

ចំណាំ : អ្នករត់ពន្ធតែងតែកាត់ចេញ យ៉ាងហោចណាស់ ១.៣ នៃស្លឹក និង យកផ្កា វល្លិ ឬសចេញដើម្បីធ្វើ ឱ្យ ពិបាកសម្គាល់ ឬវិនិច្ឆ័យ ។

ប្រភេទដែលមានចុះក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ II របស់អនុសញ្ញា សាយតេសគ្រប់បំណែក និងផលិតផលផ្សេងៗ លើកលែងតែ :

- (ក) គ្រាប់, ស្បូ និង សំអង (រួមទាំងការលាយសំអង)
- (ខ) គ្រាប់ ឬជាលិការដែលបាន បង្កាត់ទទួលបានពីស្បែកជាលិការចេញមក ឬបំណែកដែលដុះចេញពីប្រអប់ក្នុងពេលដឹកជញ្ជូន


ពពួកផ្កាអ័រគីដេ

ឈ្មោះផ្សេងទៀត : Anggerik (ភាសាម៉ាឡេស៊ី)

ពពួកផ្កាអ័រគីដេមានជាង ២៥០០០ប្រភេទ មានការពិបាកធ្វើអត្តសញ្ញាណកម្ម ប៉ុន្តែផ្ការបស់វាអាចធ្វើឱ្យគេសម្គាល់បាន

រូបរាងផ្កាភាគច្រើនអាចធ្វើឱ្យគេស្គាល់:

- មានត្របកផ្កា ៣ នៅខាងក្រៅស្រទាប់ផ្កា (អាចមើលឃើញរាងដូចស្រទាប់ផ្កា) (S)
- មានស្រទាប់ផ្កា ៣ (P) មួយប្រែប្រួលខ្លាំងបង្កើតបានជារឿងដូចបច្ចុប្បន្ន (L) ហើយដែលអាច ខុសពណ៌គ្នាទាំងភាគី និងទំហំខុសពីស្រទាប់ផ្កាដទៃទៀត
- ស្រទាប់ផ្កាខាងឆ្វេងចង្អុលស្រមោលទៅខាងស្តាំ
- អង្គធាតុឈ្មោល និងក្បូរបស់ផ្កាវាលាយបញ្ចូលគ្នាបង្កើតបានជាបណ្តុលផ្កា (C)




Credit: REACH/Amran

ពពួកផ្កាអ័រគីដេ Slipper ដូចជា : ពួក *Paphiopedilum* និង ពួក *Phragmipedium*


ទម្រង់ផ្សេងគ្នារបស់ផ្កា

មើលពីមុខ :

មានត្របកផ្កាពីរ
រលាយចូលគ្នា
(មើលពីមុខមិន
ឃើញទេ)



មើលពីក្រោយ



Credit: REACH/Carroll

ពពួកផ្កាអ័រគីដេដែលចុះក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ I របស់អនុសញ្ញា CITES*

- | | |
|--|--|
| - ប្រភេទ <i>Dendrobium cruentum</i> | រាយការណ៍នៅ : ប្រទេសថៃ និងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី |
| - ប្រភេទ <i>Renanthera imschootiana</i> | រាយការណ៍នៅ : ប្រទេសឥណ្ឌា ប្រទេសភូមា និងប្រទេសវៀតណាម |
| - ប្រភេទ <i>Paphiopedilum</i> spp. | រាយការណ៍នៅ : អាស៊ីខាងត្បូង និងខាងត្បូងឆ្នេរខាងកើតប្រទេសចិន ប៉ាពួញូឡីណេ |
| - ប្រភេទ <i>Phragmipedium</i> spp. | រាយការណ៍នៅ : ប្រទេសអាមេរិកខាងត្បូង និងតំបន់អាមេរិកកណ្តាល |
| - ប្រភេទ <i>Aerangis ellisii</i> | រាយការណ៍នៅ : ប្រទេសម៉ាដាហ្គាស្ការ |
| - ប្រភេទ <i>Laelia (Sophronitis) lobata</i> | រាយការណ៍នៅ : ប្រទេសប្រេស៊ីល |
| - ប្រភេទ <i>Laelia (Sophronitis) jongheana</i> | រាយការណ៍នៅ : ប្រទេសប្រេស៊ីល |
| - ប្រភេទ <i>Peristeria elata</i> | រាយការណ៍នៅ : ប្រទេសកូស្តារីកា, ប៉ាណាម៉ា, វេណេស៊ុយអេឡា និងកូឡុប៊ី |

ស្ថានភាពអភិរក្សអន្តរជាតិ :

មាន ៨ ប្រភេទដែលចុះក្នុងបញ្ជីឧបសម្ព័ន្ធ I របស់អនុសញ្ញា CITES ធាតុទាំងឡាយដែលបានយកចេញក្នុងទំរង់ឈ្មោះដ៏រីកចម្រើន ឬក្នុងសារធាតុរាវ នៃគ្រាប់ ឬ ជាលិកាដែលបានដាំ/បណ្តុះធាតុទាំងនោះមិនទាក់ទងនឹងអនុសញ្ញា CITES ទេ ។ ពួកផ្កាអ័រគីដេ ដទៃទៀតសុទ្ធតែស្ថិតនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ II របស់អនុសញ្ញា CITES (សូមអាន www.cites.org សម្រាប់ការបកស្រាយលម្អិតនូវប្រភេទផ្សេងៗទៀតនេះ)

សម្គាល់ : គ្រប់ប្រភេទអ័រគីដេ ដែលយកចេញពីព្រៃធម្មជាតិតម្រូវអោយមានលិខិតអនុញ្ញាត CITES

លក្ខណៈពាណិជ្ជកម្ម : មានការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើសំណាកដើមដែលនៅរស់ (មិនមែនស្លៀកតែផ្កា ទាំងអស់ទេ) មានទងផ្កាទាំងអស់ និងការយកធ្វើជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ ឬអំណោយ



Credit: REACH/Amran

ប្រភេទ *Paphiopedilum lowii*

ប្រភេទផ្កាអ័រគីដេ* នៃឧបសម្ព័ន្ធ I របស់អនុសញ្ញា CITES ដែលឃើញមាននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍



Credit: Greg Allikas

ប្រភេទ *Dendrobium cruentum*
រាយការណ៍នៅ : ក្នុងប្រទេសថៃ និងម៉ាឡេស៊ី



Credit: Nik Ahamad Fahmi

ប្រភេទ *Renanthera imschootiana*
រាយការណ៍នៅ : នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា, ភូមា និងវៀតណាម



ប្រភេទ *Paphiopedilum barbatum*

Credit: REACH/Amran

ប្រភេទពួក *Paphiopedilum* spp.
រាយការណ៍នៅ : តំបន់អាស៊ីខាងត្បូង និងខាងត្បូងឆ្នេរខាងកើតប្រទេសថៃ, ប្រូហ្គីណេ,

ស្លឹក :

- មានផ្ទៃស្លឹកដុះភ្ជាប់គ្នានឹងទ្រនុងកណ្តាល
- ផ្ទៃស្លឹកមានរាងជាអក្សរ J
- មានប្រវែងខ្លី (ក្រោម ២០ស.ម)
- មានពណ៌ប្រែប្រួលពីលាតធម្មតា ឬផ្ទៃបៃតងទៅលឿងពណ៌ស្វាយ

ចំណាំ : លោកអ្នកត្រូវទាក់ទងសួរព័ត៌មានពីជំនាញក្នុងស្រុក ដើម្បីធ្វើការវិនិច្ឆ័យបន្ថែម

* សូមអានបន្ថែមអំពីស្ថានភាពអភិរក្សនៅលើទំព័រវេបសាយ www.cites.org និង www.iucnredlist.org

Orchidaceae

(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ)

ការធ្វើអត្តសញ្ញាណកម្មពពួកផ្កាអំគីដេព្រៃ

ពពួកផ្កាអំគីដេ

គ្រប់ការប្រមូលពពួកផ្កាអំគីដេព្រៃទាំងអស់ត្រូវមានលិខិតអនុញ្ញាតសាយតេស

ប្រភេទដែលប្រមូលយកពីព្រៃធម្មជាតិ

បរិមាណ : ជាញឹកញយមានការដឹកជញ្ជូនក្នុងចំនួនតិចតួច
(តិចជាង ២០សំណាក)

ខ្នាត/ទំហំ : ទំហំរបស់សំណាកដើមមានការប្រែប្រួលមិនស្មើ

ឫស : តែងតែមានទំហំខ្លីខ្លាចច្រើន មានចំនួនតិចតួចខ្លះ
ឬកាត់ចោលផ្នែកដែលខូច លូតចេញខ្លួនពីឫស ដែល
គេបញ្ចុះទុកក្នុងដី អាចរកឃើញមានសារាយ មាន
ពួកបណ្តាញជាតិ មានសំបកឈើ មានមែកឈើ . គ្រួស.
ខ្សាច់ និងសត្វល្អិតតោងជាប់ជាមួយដូចជាខ្លួន ជាដើម

ភិនភាគខាងក្រៅ : វាមានលក្ខណៈខ្លះច្រើន ស្លឹកអាចមាន

ពណ៌លាយចំរុះគ្នា ហើយតែងតែខូច ដោយសារសត្វល្អិតដង្កូវ ស្មៅ...ជាដើម

ប្រភេទដែលបានធ្វើពហុកម្មរួចហើយ

មានការដឹកជញ្ជូនច្រើន (លើសពី ២០ដើម)

សំណាកដើមមានទំហំដូច ឬស្រដៀងគ្នាច្រើន

តែងតែមានទម្រង់ដើមនៅលើលូតចេញ វាអាចប្រែប្រួលទៅ
តាមទំហំ ឬ ទម្រង់ដើមទ្រ មានឃើញកំទេចច្រូង សំបកដួង
ស្នែមីក ជាដើមដែលជួយធ្វើឱ្យដើមឆាប់លូត ។

ស្លឹកមានទម្រង់ល្អិត (ពុំមានសត្វល្អិត ឬដង្កូវចោទទេ)

ស្ថានភាពអភិរក្សវិទ្យាសាស្ត្រ^១ :

គ្រប់ផ្កាអំគីដេទាំងអស់ស្ថិតនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ II របស់អនុសញ្ញា
CITES លើកលែងតែប្រភេទដែលបានរៀបរាប់នៅទំព័រទី១រួច
ហើយកិច្ចការពារស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា :
គ្រប់ពពួកផ្កាអំគីដេព្រៃទាំងអស់ ត្រូវបានការពារស្របតាមច្បាប់
ស្តីពី ព្រៃឈើ ឆ្នាំ ២០០២



Credit: WWF-Canon / Wil LUIJF

ចំណាំ : លោកអ្នកគួរទាក់ទងជំនាញការក្នុងស្រុក ដើម្បីធ្វើការវិនិច្ឆ័យ បន្ថែម

តើត្រូវមើលលក្ខណៈខុសគ្នារវាងព្រៃ និងដើមបង្កាត់យ៉ាងដូចម្តេច? តើត្រូវមើលអ្វី?

ឫសរបស់អំគីដេព្រៃ :



Credit: REACH/Carrol

អារមៈ :


.....បង្ហាញនូវការលូតចេញតែម្ខាង
(មិនលូតដូចផ្កាដែលដាក់ក្នុងដីដឹងទេ)

.....មានខូចចុងឬសឱ្យដឹងដូចពូជ
កន្លែង ឬ សមាសដែលខូច

.....មានបំណែកដែលងាប់នៅជាប់
ជាមួយ

.....បំណែកដែលងាប់មានបែកចេញ
ជាម្យ៉ាងនៅខាងចុង

ស្លឹកអំគីដេព្រៃ



Credit: REACH/Carrol

អារមៈ :

.....មានស្លឹករាងឆ្មា/ខូចប្រហោង

មាន ប្រហោងស្លឹកតូចៗដែលចោទ
ដោយសត្វ ល្អិត ឬសត្វតូចៗ

.....មានស្លាកពណ៌ស្រាលៗ ឬរន្ធតូច
ដែលសត្វល្អិតស៊ី

.....មានស្នាមខូចនៅតាមគល់ដើម

គិនភាគខាងក្រៅរបស់អំគីដេព្រៃ



Credit: Royal Botanic Gardens Kew

ដុះលូតលាស់តាមលក្ខណៈធម្មជាតិ

ជាញឹកញយមានបំណែកក្រៀមនៅ
ជាប់ជាមួយ

អំគីដេដែលបានធ្វើពហុកម្មរួច :

.....ពួកអំគីដេទាំងនេះមិនស្ថិតក្រោម

បទប្បញ្ញត្តិនៃអនុសញ្ញាសាយតេសទេស

.....រុក្ខជាតិដែលដុះចេញពីពហុកម្ម ដើម្បីនាំ ចេញតែងតែ
មានការថែទាំ មានខ្នាតដូចគ្នា អាយុ និងទ្រង់ទ្រាយនៅលើ
និងមើលឃើញភាគច្រើននៅលើទាំងអស់



Credit: Royal Botanic Gardens Kew

^១ សូមអានបន្ថែមពីស្ថានភាពអភិរក្សនៅលើទំព័រវេបសាយ www.cites.org និង www.iucnredlist.org

Gonystylus spp. - Ramin spp.

(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ) (ឈ្មោះរ៉ាមីន Ramin)

រ៉ាមីន (Ramin)

ឈ្មោះផ្សេងៗ : Bengol, Gaharu, Melawis, Garu Buaja, Lanutan-bagio

រាយការណ៍ : ប្រទេសប្រូយណេ ឥណ្ឌូនេស៊ី ម៉ាឡេស៊ី ប៉ាពួញូហ្គីណេ ហ្វីលីពីន និងកោះសូឡូមុន

កិច្ចអភិរក្សជាសាគរ : “

ស្ថិតនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ II របស់អនុសញ្ញា CITES

ស្បៀវក្រៅក្រហមរបស់អង្គការ IUCN មាន ១៥ប្រភេទ ដែលបានចុះក្នុងបញ្ជីក្រហមថាជា ប្រភេទងាយរងគ្រោះថ្នាក់ (VU)

កិច្ចការការពារប្រកបដោយសុវត្ថិភាពប្រទេសកម្ពុជា: ត្រូវអនុវត្តច្បាប់ ស្តីពី ព្រៃឈើ ឆ្នាំ ២០០២ និងអនុក្រឹត្យលេខ ៥៣អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២៩ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០០៦ ស្តីពី ការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម អន្តរជាតិលើប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិព្រៃ ដែលកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ជិតផុតពូជ



Credit: Chen Hing Keong/TSEA

ការវិភាគតាមដំណាក់កាល

១- យកសំណាកឈើមួយដុំមកពិនិត្យ.

កាត់យកសំណាកមួយដុំចេញពីមុខកាត់ទទឹង




Image Source: Environment Canada

២- ពិនិត្យផ្ទៃមុខកាត់របស់ដុំដែលបានជ្រៀតមើល



ប្រើកាំបិតដែលមុតស្រួច ដើម្បីជ្រៀតមើលផ្ទៃកាត់មួយ ចេញពីផ្ទៃរបស់ដុំដែលបានកាត់



ប្រើកាំបិតដ៏ត្រឹមត្រូវ ១៤x ដើម្បីពិនិត្យផ្ទៃមុខកាត់




អ្នកត្រូវប្រើកាំបិតដ៏ត្រឹមត្រូវ អោយជិតភ្នែកដើម្បីមើល

លក្ខណៈពិសេស :

ប្រើជាឈើអារឈើកែច្នៃ ឈើរឹតនៅ ដែលត្រូវបានគេយកទៅធ្វើស៊ុមទ្វារ ស៊ុមរូបថត រទេះកង់រុញកូនក្មេង និងរនាំង

អ្នកអាចមើលឃើញ :



រ៉ាមីន

មានសាច់ឈើពណ៌សសំរាប់ធ្វើអោយ ឈើក្លាយជាពណ៌លឿង

មានលក្ខណៈរឹង និងធ្ងន់ល្មម


សរសៃ Vessels ដុះចេញមិន

មានរៀងរង្វង់កសណ្តានទេ


សរសៃ Vessels តែងតែដុះចេញ ដាច់ដោយឡែកតែងង ប៉ុន្តែវាអាច មានច្រើនស្ថិតនៅជិតគ្នា



Image Source: Forest Products Laboratory, US Forest Service




ប្រភេទ *Gonystylus* sp.




ប្រភេទ *Gonystylus* sp.

ស្រដៀងគ្នា នឹងប្រភេទ:




ប្រភេទ *Alstonia scholaris*



ប្រភេទ *Dyera costulata*



ប្រភេទ *Hevea brasiliensis*



ប្រភេទ *Endospermium malaccense*

ចំណាំ : អ្នកគួរទាក់ទងជំនាញការនៅក្នុងស្រុក/មូលដ្ឋានដើម្បីធ្វើការវិនិច្ឆ័យ



ឈើ Ramin ដែលអាចមានពណ៌ចំរុះ គ្នាច្រើន

ប្រភព : Chris Shepherd/TSEA

“ សូមអានបន្ថែមអំពីស្ថានភាពអភិរក្សនៅលើទំព័រវេបសាយ www.cites.org and www.iucnredlist.org

សមាគមន៍បណ្តាញអនុវត្តន៍ច្បាប់សត្វព្រៃថ្នាក់ជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (ASEAN-WEN) រួមមាន នគរបាល គយ និងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានទាំង១០ ដូចជា ប្រ៊ុយណេ កម្ពុជា ឥណ្ឌូនេស៊ី ឡាវ ម៉ាឡេស៊ី ភូមា ហ្វីលីពីន

សាំងហ្គាពួរ វៀតណាម និងប្រទេសថៃ ។

ASEAN-WEN

សម្របសម្រួលការឆ្លើយតបថ្នាក់តំបន់ ទៅនឹងការជួញដូរខុសច្បាប់ លើរាល់ប្រភេទត្រូវការការពារ ដែលគម្រោងកំហែងដល់ជីវៈចម្រុះ រងគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពសាធារណៈ និងធ្វើអោយអន្តរាយ

ដល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គម ។

ASEAN-WEN គឺជា:

- * បណ្តាញអនុវត្តន៍ច្បាប់អន្តររដ្ឋាភិបាល ដែលរៀបចំឡើងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មសត្វព្រៃខុសច្បាប់
- * ឆ្លើយតបយ៉ាងសកម្មទៅនឹងកំរិតប្រកាសអាសន្នជួញដូរ និងបាត់បង់សត្វព្រៃ ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍
- * ជាយន្តការមួយ ដែលប្រទេសជាច្រើនអាចចែករំលែកព័ត៌មាន និងរៀនពីគ្នាទៅវិញទៅមកនូវបទពិសោធន៍ល្អៗ

TRAFFIC
the wildlife trade monitoring network

ត្រាហ្វិក (TRAFFIC) ជាបណ្តាញឃ្លាំមើលពាណិជ្ជកម្មសត្វព្រៃ ធ្វើការដើម្បីធានាថាការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម រុក្ខជាតិ និងសត្វព្រៃ មិនទទួលរងការគំរាមកំហែងដល់ការអភិរក្សធម្មជាតិ ។ អង្គការនេះមានការិយាល័យច្រើន ទីតាំងក្នុងពិភពលោក និងធ្វើការដោយសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយលេខាធិការដ្ឋានរបស់ អនុសញ្ញា ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ លើប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិព្រៃជិតផុតពូជ (CITES) ។

ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទង

នាយកប្រចាំតំបន់

TRAFFIC Southeast Asia
Unit 3 - 2, 1st Floor
Jalan SS23/11, Taman SEA,
47400 Petaling Jaya
Selangor
MALAYSIA

Tel: +603 7880 3940
Fax: +603 7882 0171
Website: www.traffic.org

© TRAFFIC Southeast Asia 2008

ត្រាហ្វិកគឺ ជាកម្មវិធីរួមរបស់

