# วิธีจำแนกสัตว์ป่าที่นิยมค้า ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
















# สารบัญ

เอกสารวิธีจำแนกชนิดพันธุ์นี้จัดทำโดย TRAFFIC - เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายสามารถจำแนกชนิดพันธุ์ ที่มักพบในการค้าในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต<sup>้</sup> เอกสารนี้จัดทำขึ้นในปี พ.ศ. 2551-2554 มีจำนวนทั้งสิ้น 98 แผ่น

#### ข้อมูล

CITES และ IUCN Red List CITES ฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายวิชาการ ข้อแนะนำในการตรวจสอบใบอนุญาตไซเตส การวัดขนาดและศัพท์เฉพาะ

- \* เทคนิคการลักลอบที่พบบ่อย พกติดตัว
- \* เทคนิคการลักลอบที่พบบ่อย ซ่อนในกระเป๋าเดินทาง
- \* เทคนิคการลักลอบที่พบบ่อย ซ่อนในสินค้าอื่น
- \* เทคนิคการลักลอบที่พบบ่อย ปะปนมากับชนิดพันธุ์คล้ายคลึง
- \* เทคนิคการลักลอบที่พบบ่อย แอบอ้างว่ามีที่มาจากการเพาะเลี้ยง
- \* ตรวจจับการทุจริตใบอนุญาต
- \* สถานการณ์ที่มักพบการท จริตใบอนุญาต

#### \* ไม่รวมอยู่ในเอกสารชุดนี้

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

Bos gaurus & Bos javanicus	กระทิงและวัวแดง (Gaur and Banteng)
Capricornis	_เลียงผา (Serows)
Pantholops hodgsonii	
Saiga tatarica	_Saiga Antelope
Multi-tined Antlers	
Moschus	_กวางมัสค์ หรือกวางชะมด (Musk Deer)
Felidae (1)	_ แมวและเสือ (Cats)
Felidae (2)	_ แมวและเสือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในบัญชีหมายเลข 1
Felidae (3)	_ อวัยวะและวัตถุดิบที่ได้จากแมวและเสือซึ่งพบบ่อยในการค้า
นากในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต <b>้</b>	_Southeast Asian Otters
Helarctos malayanus	_ หมีหมา หมีคน (Sun Bear)
Ursus thibetanus	หมีควาย (Asiatic Black Bear)
Hemigalus derbyanus & Chrotogale owstoni	_อีเห็นลายเสือโคร่ง อีเห็นลายพาด (Banded Palm) & Owston's Civet)
Prionodon pardicolor & Prionodon linsang	_อีเห็นลายเสือ & อีเห็นลายเมฆ (Spotted Linsang & Banded Linsang)
Arctictis binturong	
Rhinocerotidae	
Manis	_ นิ่ม หรือลิ่น (Pangolins)
Primates	ลิงในอันดับวานร (ไพรเมต)
Nycticebus	_ นางอาย (Lorises)
Macaca fascicularis	_ ลิงแสม (Long-tailed Macaque)
Elephas maximus & Loxodonta africana	_ข้าง (Elephants)

นก Dendrocyna javanica & D. arcuata	_เปิดแดง (Lesser Whistling) & Wandering Whistling Ducks
Leptoptilios	
Hornbill	_นกเงือก
	_นกกางเขนดง นกบินหลาดง (White-rumped Sharma)
Falconiformes	_นกล่าเหยื่อ (Birds of Prey)
Pycnonotus zeylanicus	_นกปรอดแม่ทะ (Straw-headed Bulbul)
Gracula religiosa	_นกขุนทอง (Hill Mynah)
Psittaciformes	_นกแก้ว (Parrots)
Cacatua	_นกกระตั้วขาว (Cockatoos - white)
Probosciger aterrimus	_Palm Cockatoo
Eos	_Indonesian Lorikeets
Loriculus galgulus	_นกหกเล็กปากดำ (Blue-crowned Hanging Parrot)
Lorius garrulus	_Chattering Lory
Lorius lory	_Black-capped Lory
Strigiformes	_นกเค้า (Owls)

# สารบัญ

Alligators & Caiman	สัตว์เลื้อยคลาน	
Crocodylus novaeguinea & C. mindorensis       จระเข็นวิกินีและจระเข้นจึดิปนี้นส์ (New Guinea & Philippine Crocodile)         Crocodylus porosus & C. siamensis       จระเขน้าเดินและจระเขน้าจึด (Estuarine & Siamese Crocodile)         Tomistoma schlegelii       ตะโขง (Fabe Gharia)         Uromastyx       จำหวกกึ่งกามาลดีเกอรทุกชนิดในสกุล Uromastyx (Spiny-tailed Lizz ร่างกลัก (Phelsuma)         Gekko gecko       ตุกแกบาน (Tokay Gecko)         Varanus       ตะกาด (Monitor Lizards)         Plyas mucosus       บูลิงหางลาย (Oriental Rat Snake)         Ophiophagus hannah, Naja       บูนที (Cobras)         Pythonidae       บูหลือม (Pythons)         Carettochelys insculpta       แต่กามเลือน (Pythons)         Carettochelys insculpta       แต่กามเลือน (Pythons)         Chelus fimbriatus       แต่กามเลือน (Marine Turtes)         Cheloniidae and Dermochelyidae       แต่กามเลือน (Marine Turtes)         Eretmochelys imbricata       แต่กามเลือน (Marine T		
Crocodylus porosus & C. siamensis       จระเขน้าเค็มและจระเขน้าจึด (Estuarine & Siamese Crocodile)         Tomistoma schlegelii       ตะโขป (False Charial)         Uromastyx       จำพวกก็งกามาสดีเกอร์ทุกชนิดในสกุล Uromastyx (Spiny-tailed Lizz วิจากลีทุกชนิดในสกุล Phelsuma (Day Geckos)         Gekko gecko       ตุกแกบ้าน (Tokay Gecko)         Varanus       (Monitor Lizards)         Plyas mucosus       งู่สิงหางลาย (Oriental Rat Snake)         Ophiophagus hannah, Naja       งูเหกิ (Cobras)         Pythonidae       งู่เหลือม (Pythons)         Carettochelys insculpta       เตาลมูกหมู หรือเตาบิน (Pig-nosed Turtle)         Chelus fimbriatus       เตาลมูกหมู หรือเตาบิน (Pig-nosed Turtle)         Cheloniidae and Dermochelyidae       เตาลมูกหมู หรือเตาบิน (Pig-nosed Turtle)         Cheloniidae and Dermochelyidae       เตาลมูกหมู หรือเตาบิน (River Terrapins)         Geoclemys hamiltonii       เตากรอาน เคาจาน & เตาลายดีนเปิด เตาหัวแดง (River Terrapins)         Geoclemys hamiltonii       เตากรอาน เคาจาน & เตาลายดีนเปิด เตาหัวแดง (River Terrapins)         Geoclemys hamiltonii       เตากรอาน เคาจาน & เตาลายดีนเปิด เตาหัวแดง (River Terrapins)         Geochelon y uwonoi       เตาสลาเวลี (Sulawesi Forest Turtle)         Leucocephalon yuwonoi       เตาสลาเวลี (Sulawesi Forest Turtle)         Platysternon megacephalum       เตามีลาเวลี (Big-headed Turtle)         Oriitia borneensi		
Tomistoma schlegelii ตะโขง (False Gharial) Uromastyx จำหวกถึงกามาสติเกอร์ทุกชนิดในสกุล Uromastyx (Spiny-tailed Lizz Phelsuma จึงจากสัทุกชนิดในสกุล Phelsuma (Day Geckos) Gekko gecko ตุกแกบาน (Tokay Gecko) Varanus ตะกลัด (Monitor Lizards) Ptyas mucosus จิลิงหางลาย (Oriental Rat Snake) Ophiophagus hannah, Naja งูเหา (Cobras) Pythonidae งูเหลือม (Pythons) Carettochelys insculpta เคาจมกมุ หรือเตาบิน (Pig-nosed Turtle) Chelus fimbriatus เคาคอเลี้ยวมาตามาคา (Matamata Turtle) Cheloniidae and Dermochelyidae เคาหวัน (Marine Turtles) Eretmochelys imbricata เคาจาน & เตาลมาตามาคา (Matamata Turtle) Geoclemys hamiltonii เคากระ (Hawkshill Turtle) Batagur เคาจาน & เตาลมาตามาคา (Black Pond Turtle) Cuora จำหวกเตาหันทุกชนิดในสกุล Cuora (Asian Box Turtles) Leucocephalon yuwonoi เตาลุลาบุลี (Big-headed Turtle) Orlitia borneensis เตาแม่นำขอรเนียว (Malaysian Giant Turtle) Platystermon megacephalum เตาปุลี (Big-headed Turtle) Orlitia borneensis เตาแม่นำขอรเนียว (Malaysian Giant Turtle) Frachemys scripta elegans Rea-eared Slider Trachemys scripta elegans Rea-eared Slider Trachemys (Geochelone) radiata เตาบกลักสาร์ (Ploughshare Tortoise) Astrochelys yniphora เตามาดากัสการ์ (Ploughshare Tortoise) Geochelone elegans เตามาดากัสการ์ (Ploughshare Tortoise) Geochelone (Centrochelys) pardalis เตากาวพมา (Burmese Star Tortoise) Geochelone (Sitigomochelys) pardalis เตากาวพมา (Burmese Star Tortoise) Geochelone (Centrochelys) pardalis เตามาดากัสกา (African Spurred Tortoise) Indotestudo elongata เตามาดากัสอ (Intivide) เตาเพิก (Yellow-headed Tortoise) Malacochersus tomieri [เตาเพลือ เตาขึ้น เตาเพิก (Malay (Intivide) (Intivide) Manouria emys [เตาเพลิอ เตาขึ้น เตาเพลิอ (Intivide) Amouria emys [เตาเพลิอ เตาขึ้น เตาเพลิอ (Intivide) Amouria impressa [เตาเพลิอ (Saian Brown Tortoise)		
Uromastyx จำพวกกิ้งกามาสดิเกอร์ทุกชนิดในสกุล Uromastyx (Spiny-tailed Lizz Phelsuma จึงจกลีทุกชนิดในสกุล Phelsuma (Day Geckos) Gekko gecko ตุ๊กแกบาน (Tokay Gecko) Waranus ตะกวด (Monitor Lizards) Plyas mucosus จุลิงหางลาย (Oriental Rat Snake) Ophiophagus hannah, Naja งูเหา (Cobras) Pythonidae งูเหลือม (Pythons) Carettochelys insculpta เดาจมูกหมู หรือเตาบิน (Pig-nosed Turtle) Chelus fimbriatus Chelus fimbriatus Chelus fimbriatus Cheloniidae and Dermochelyidae เดาจมูกหมู หรือเตาบิน (Pig-nosed Turtle) Cheloniidae and Dermochelyidae เดาจมูกหมู หรือเตาบิน (Pig-nosed Turtle) Cheloniidae and Dermochelyidae เดากระ (Hawksbill Turtle) Batagur เดาจาน & เดาลายดีนเปิด เดาหัวแดง (River Terrapins) Geoclemys hamiltonii เดาดำแสมมิลดัน เดาบิงลายจุด (Black Pond Turtle) Cuora จำพวกเตาหัวทุกชนิดในสกุล Cuora (Asian Box Turtles) Leucocephalon yuwonoi เดาสุลาเวสิ (Sulawesi Forest Turtle) Platysternon megacephalum เดาปุลิ (Big-headed Turtle) Orlitia borneensis เดาแม่น้าบอรเนียว (Malaysian Giant Turtle) Siebenrockiella leytensis เดาแม่น้ำบอรเนียว (Malaysian Giant Turtle) Trachemys scripta elegans Red-eared Slider Testudinidae จำพวกเดาโดมทุกชนิดในสกุล Testudinidae (Tortoises) Astrochelys (Geochelone) radiata เดาบลายลักร เดาลายรัศมี หรือเดาเรเดียตา (Radiated Tortoise) Astrochelys yniphora เดาบลายลักร เดาลายรัศมี หรือเดาเรเดียตา (Radiated Tortoise) Chelonoides (Geochelone) carbonaria เดาบลายลักร์ เดาลายรัศมี หรือเดาเรเดียตา (Radiated Tortoise) Geochelone elegans เดาบาลายลักร เดาลายรัศมี หรือเดาเรเดียตา (Radiated Tortoise) Geochelone (Sigomochelys) pardalis เดาบาลายลักร เดาลายรัศม์ เดาเท็ก (Yellow-headed Tortoise) Indotestudo elongata เดาบาลเลือาา (Leopard Tortoise) Indotestudo elongata เดาเหลือง เดาขึ้นง เดาเท็ต (Yellow-headed Tortoise) Malacochersus tomieri [เดาแหนเดือง (Asian Brown Tortoise) Manouria emys [เดาเก็ต เดาเก็ต เดาเก็ต (Vellow-headed Tortoise) Amyda cartilaginea [เดานานที่ (Yellow-headed Tortoise)		
Phelsuma         จังจกลีทุกชนิดในสกุล Phelsuma (Day Geckos)           Gekko gecko         ตุกแกบาน (Tokay Gecko)           Varanus         ตะกลด (Monitor Lizards)           Ptyas mucosus         งถึงหางลาย (Oriental Rat Snake)           Ophiophagus hannah, Naja         งเหลือม (Pythons)           Carettochelys insculpta         เดาลมูกหมู หรือเดาบิน (Pig-nosed Turtle)           Cheloniidae and Dermochelyidae         เดาหะด (Marine Turtles)           Eretmochelys imbricata         เดากระ (Hawksbill Turtle)           Batagur         เดากระ (Hawksbill Turtle)           Geoclemys hamiltonii         เดาดะและอาน เดาลาน & เดาลายดีนเปิด เดาหัวแดง (River Terrapins)           Geoclemys hamiltonii         เดาสลาเวสี (Sulawesi Forest Turtle)           Cuora         ว่าพวกเดาหับทุกชนิดในสกุล Cuora (Asian Box Turtles)           Leucocephalon yuwonoi         เดาสลาเวสี (Sulawesi Forest Turtle)           Platysternon megacephalum         เดาปลุลี (Big-headed Turtle)           Orlita borneensis         เดามาลายดีนนบายร์เขีย (Malaysian Giant Turtle)           Siebenrockiella leytensis         เดาปลุลี (Big-headed Turtle)           Trachemys scripta elegans         Red-eared Slider           Testudinidae         วามาดาเดามาดาเด็นสกุล Testudinidae (Tortoises)           Astrochelys (Geochelone) radiata         เดามาดากัสการ์ (Pioughshare Tortoise) <t< td=""><td>•</td><td></td></t<>	•	
Gekko gecko ดูกแกบาน (Tokay Gecko) Varanus ตะกาด (Monitor Lizards) Ptyas mucosus งุลิงหางลาย (Oriental Rat Snake) Ophiophagus hannah, Naja งูเหา (Cobras) Pythonidae (Ignaynu) หรือเตาบิน (Pig-nosed Turtle) Crelus fimbriatus (Ignaynu) หรือเตาบิน (Pig-nosed Turtle) Chelus fimbriatus (Ignaynu) หรือเตาบิน (Pig-nosed Turtle) Chelus fimbriatus (Ignaynu) หรือเตาบิน (Pig-nosed Turtle) Cheloniidae and Dermochelyidae (Ignaynu) หรือเตาบิน (Pig-nosed Turtle) Cheloniidae and Dermochelyidae (Ignaynu) หรือเตาบิน (Pig-nosed Turtle) Cheloniidae and Dermochelyidae (Ignaynu) (River Terrapins) Geoclemys imbricata (Ignaynu) (River Terrapins) Geoclemys hamiltonii (Ignaynu) (River Terrapins) Geoclemys hamiltonii (Ignaynu) (Ignaynu) (River Terrapins) Geoclemys hamiltonii (Ignaynu) (Ignaynu) (Ignaynu) (Ignaynu) (Ignaynu) (Ignaynu) Cuora (Ignaynu) (Ignaynu) (Ignaynu) (Ignaynu) (Ignaynu) (Ignaynu) Leucocephalon yuwonoi (Ignaynu) (Ignaynu) (Ignaynu) (Ignaynu) (Ignaynu) Leucocephalon yuwonoi (Ignaynu) (Ignaynu) (Ignaynu) (Ignaynu) (Ignaynu) Leucocephalon yuwonoi (Ignaynu) (Ignaynu) (Ignaynu) (Ignaynu) Leucocephalon yuwonoi (Ignaynu) (Ignaynu) (Ignaynu) (Ignaynu) Leucocephalon yuwonoi (Ignaynu) (Ignaynu) (Ignaynu) Leucocephalon yuwonoi (Ignaynu) (Ignaynu) (Ignaynu) Leucocephalon (Ignaynu) Leucocephalon (Ignaynu) Leucocephalon (Ignaynu) Leuc	•	
Varanus         ตะกวด (Monitor Lizards)           Ptyas mucosus         งสิงหางลาย (Oriental Rat Snake)           Ophiophagus hannah, Naja         งูเห็า (Cobras)           Pythonidae         งูเหลือม (Pythons)           Carettochelys insculpta         เตาลมูกหมู หรือเดาบิน (Pig-nosed Turtle)           Chelus fimbriatus         เตาดอเลี้ยวมาตามาตา (Matamata Turtle)           Cheloniidae and Dermochelyidae         เตาทะเล เพาะ (Marine Turtles)           Eretmochelys imbricata         เตากระ (Hawksbill Turtle)           Batagur         เตากะอาน เตาจาน & เตาลายดีนเปิด เตาหัวแดง (River Terrapins)           Geoclemys hamiltonii         เตาตะอาน เตาจาน & เตาลายดีนเปิด เตาหัวแดง (River Terrapins)           Geoclemys hamiltonii         เตาตะอาน เตาจาน & เตาสายดีนเปิด เตาหัวแดง (River Terrapins)           Geoclemys hamiltonii         เตาตะอาน เตาจาน & เตาสายดีนเปิด เตาหัวแดง (River Terrapins)           Geoclemys hamiltonii         เตาตะอาน เตาสาย (Black Pond Turtle)           Cuora         เตาสายสายดี (Black Pond Turtle)           Leucocephalon yuwonoi         เตาสายสายดี (Black Pond Turtle)           Platystemon megacephalum         เตาสมุล (Sulawesi Forest Turtle)           Platystemon megacephalum         เตาสมุล (Black Pond Turtle)           Siebenrockiella leytensis         เตามีผู้ (Brilippine Forest Turtle)           Trachemys scripta elegans         เตามีผู้ (Ph		and and
Plyas mucosus	-	•
Ophiophagus hannah, Naja       งูเหา (Cobras)         Pythonidae       งูเหลือม (Pythons)         Carettochelys insculpta       เตาจมูกหมู หรือเตาบิน (Pig-nosed Turtle)         Chelus fimbriatus       เตาคอเลี้ยวมาตามาตา (Matamata Turtle)         Cheloniidae and Dermochelyidae       เตาหะเล (Marine Turtles)         Eretmochelys imbricata       เตาหะเล (Marine Turtle)         Batagur       เตาหะอาน เตาจาน & เตามายืนเปิด เตาหัวแดง (River Terrapins)         Geoclemys hamiltonii       เตาแสมมิลตัน เตาบิงลายจุด (Black Pond Turtle)         Cuora       จำพวกเตาหับทุกชนิดในสกุล Cuora (Asian Box Turtles)         Leucocephalon yuwonoi       เตาสลาเวสี (Sulawesi Forest Turtle)         Platysternon megacephalum       เตาปลูล (Big-headed Turtle)         Orlitia borneensis       เตาปลูล (Big-headed Turtle)         Orlitia borneensis       เตาปลูล (Big-headed Turtle)         Trachemys scripta elegans       เตาปลูล (Big-headed Turtle)         Astrochelys (Geochelone) radiata       เตามาดาโดมทุกบิดในสกุล Testudinidae (Tortoise)         Astrochelys yniphora       เตามาดาโดมทุกบิดในสกุล Testudinidae (Tortoise)         Chelonoides (Geochelone) car		
Pythonidae		
Carettochelys insculptaเตาลมูกหมู หรือเตาบิน (Pig-nosed Turtle)Chelus fimbriatusเตาคอเลี้ยวมาตามาตา (Matamata Turtle)Cheloniidae and Dermochelyidaeเตากระ (Hawksbill Turtle)Eretmochelys imbricataเตากระ (Hawksbill Turtle)Batagurเตากะอาน เตาจาน & เตาลายดีนเปิด เตาหัวแดง (River Terrapins)Geoclemys hamiltoniiเตาดำแสมมิลดัน เตาบิงลายจุด (Black Pond Turtle)Cuoraจำพวกเตาหับทุกชนิดในสกุล Cuora (Asian Box Turtles)Leucocephalon yuwonoiเตาสลาเวสี (Sulawesi Forest Turtle)Platysternon megacephalumเตาปูล (Big-headed Turtle)Orlitia borneensisเตาปาฟิลิปปินส์ (Philippine Forest Turtle)Siebenrockiella leytensisเตาปาฟิลิปปินส์ (Philippine Forest Turtle)Trachemys scripta elegansRed-eared SliderTestudinidaeจำพวกเตาโดมทุกชนิดในสกุล Testudinidae (Tortoises)Astrochelys (Geochelone) radiataเตาบกลายจักร เตาลายรัศมี หรือเตาเรเดียดำ (Radiated Tortoise)Astrochelys yniphoraเตามาดากัสการ์ (Ploughshare Tortoise)Chelonoides (Geochelone) carbonariaเตาบกลินแดง (Red-footed Tortoise)Geochelone elegansเตากาวพมา (Burmese Star Tortoise)Geochelone platynotaเตากวาพมา (Burmese Star Tortoise)Geochelone (Centrochelys) pardalisเตาเลือดาว (Leopard Tortoise)Geochelone (Centrochelys) sulcata)เตาเพลดาคา (African Spurred Tortoise)Indotestudo elongataเตาเหลดง เตาหัด (Philippine Forest Turtle)Malacochersus tomieriเตาเหลดง เตาหัด (Philippine Forest Turtle)Manouria emysเตาเหลดง เตาหัด (Philippine Forest Turtle)Manouria impressaเตาเ		
Chelus fimbriatusเตาคอเลี้ยวมาตามาตา (Matamata Turtle)Cheloniidae and Dermochelyidaeเตาทะเล (Marine Turtles)Eretmochelys imbricataเตากระ (Hawksbill Turtle)Batagurเตากะอาน เตาจาน & เตาลายดีนเปิด เตาหัวแดง (River Terrapins)Geoclemys hamiltoniiเตาดำแฮมมิลตัน เตาบิงลายจุด (Black Pond Turtle)Cuoraจำพวกเตาหับทุกชนิดในสกุล Cuora (Asian Box Turtles)Leucocephalon yuwonoiเตาสุลาเวสี (Sulawesi Forest Turtle)Platysternon megacephalumเตาปลูล (Big-headed Turtle)Orlitia borneensisเตาปลูล (Big-headed Turtle)Siebenrockiella leytensisเตาปลูล (Big-headed Turtle)Trachemys scripta elegansRed-eared SliderTestudinidaeจำพวกเตาโดมทุกชนิดในสกุล Testudinidae (Tortoises)Astrochelys (Geochelone) radiataเตาบกลายจักร เตาลายรัศมี หรือเตาเรเดียตำ (Radiated Tortoise)Astrochelys yniphoraเตามาดากัสการ์ (Ploughshare Tortoise)Chelonoides (Geochelone) carbonariaเตามาดากัสการ์ (Ploughshare Tortoise)Geochelone elegansเตามาดินแดง (Red-footed Tortoise)Geochelone (Stigomochelys) pardalisเตาเลือดาว (Leopard Tortoise)Geochelone (Centrochelys) sulcata)เตาเลือดาว (Leopard Tortoise)Indotestudo elongataเตาเหลือง เตาขึ้นึง เตาเทียน เตาเพ็ก (Yellow-headed Tortoise)Malacochersus tornieriเตาหก เตาหก เตาหก เพลือง (Asian Brown Tortoise)Manouria emysเตาหก เตาหก เตาหก เพลือง (Asian Brown Tortoise)Manouria impressaเตาหลิง เตาหลิง (Impressed Tortoise)		
Cheloniidae and Dermochelyidaeเต่าทะเล (Marine Turtles)Eretmochelys imbricataเต่ากระ (Hawksbill Turtle)Batagur		
Eretmochelys imbricata	Chelus fimbriatus	เตาคอเลียวมาตามาตา (Matamata Turtle)
Batagur เตากะอาน เตาจาน & เตาลายดีนเปิด เตาหัวแดง (River Terrapins) Geoclemys hamiltonii เตาตำแฮมมิลดัน เตาบิงลายจุด (Black Pond Turtle) Cuora จำพวกเตาหับทุกชนิดในสกุล Cuora (Asian Box Turtles) Leucocephalon yuwonoi เตาสุลาเวสี (Sulawesi Forest Turtle) Platysternon megacephalum เตาปุลิ (Big-headed Turtle) Orlitia borneensis เตาแม่น้ำบอร์เนียว (Malaysian Giant Turtle) Siebenrockiella leytensis เตาปาฟิลิปปินส์ (Philippine Forest Turtle) Trachemys scripta elegans Red-eared Slider Testudinidae จำพวกเตาโดมทุกชนิดในสกุล Testudinidae (Tortoises) Astrochelys (Geochelone) radiata เตาบกลายจักร เตาลายรัศมี หรือเตาเรเดียต้า (Radiated Tortoise) Astrochelys yniphora เตามาดากัสการ์ (Ploughshare Tortoise) Chelonoides (Geochelone) carbonaria เตาบกตีนแดง (Red-footed Tortoise) Geochelone elegans เตากาอินเดีย (Indian Star Tortoise) Geochelone (Stigomochelys) pardalis เตาเลือดาว (Leopard Tortoise) Geochelone (Centrochelys) sulcata) เตาเลือดาว (Leopard Tortoise) Indotestudo elongata เตาเหลือง เตาชีผึง เตาเทียน เตาเพ็ก (Yellow-headed Tortoise) Malacochersus tornieri เตาแพนเด็ก (Pancake Tortoise) Manouria emys - เตาหก เตาหกเหลือง (Asian Brown Tortoise) Manouria impressa - เตาหก เตาหกเหลือง (Asian Brown Tortoise) Amyda cartilaginea - เตาหลือ เตายิน้ำ (Asiatic Softshell Turtle)	Cheloniidae and Dermochelyidae	เดาทะเล (Marine Turtles)
Geoclemys hamiltoniiเตาตำแฮมมิลดัน เตาบึงลายจุด (Black Pond Turtle)Cuoraจำพวกเตาหับทุกชนิดในสกุล Cuora (Asian Box Turtles)Leucocephalon yuwonoiเตาสุลาเวสี (Sulawesi Forest Turtle)Platysternon megacephalumเตาปูลู (Big-headed Turtle)Orlitia borneensisเตาแมน้าบอร์เนียว (Malaysian Giant Turtle)Siebenrockiella leytensisเตาปาพีลิปปินส์ (Philippine Forest Turtle)Trachemys scripta elegansRed-eared SliderTestudinidaeจำพวกเตาโดมทุกชนิดในสกุล Testudinidae (Tortoises)Astrochelys (Geochelone) radiataเตาบกลายจักร เตาลายรัศมี หรือเตาเรเดียตำ (Radiated Tortoise)Astrochelys yniphoraเตามาดาลัสการ์ (Ploughshare Tortoise)Chelonoides (Geochelone) carbonariaเตามาดทีนแดง (Red-footed Tortoise)Geochelone elegansเตาดาวอินเดีย (Indian Star Tortoise)Geochelone platynotaเตาดาวอินเดีย (Indian Star Tortoise)Geochelone (Stigomochelys) pardalisเตาเลือดาว (Leopard Tortoise)Indotestudo elongataเตาผลอาดา (African Spurred Tortoise)Indotestudo elongataเตาเหลือง เตาปีผึ้ง เตาเทียน เตาเพ็ก (Yellow-headed Tortoise)Malacochersus tornieriเตาหก เตาหกเหลือง (Asian Brown Tortoise)Manouria emysเตาหก เตาหกเหลือง (Asian Brown Tortoise)Manouria impressaเตาหก เตาหก เหลือง เตายาหรือ เตายาสุง (Impressed Tortoise)Amyda cartilaginea-ตะพาบน้ำ (Asiatic Softshell Turtle)	Eretmochelys imbricata	
Cuoraจำพวกเต่าหับทุกชนิดในสกุล Cuora (Asian Box Turtles)Leucocephalon yuwonoiเตาสุลาเวลี (Sulawesi Forest Turtle)Platysternon megacephalumเตาปูล (Big-headed Turtle)Orlitia borneensisเตาเม่น้ำบอร์เนียว (Malaysian Giant Turtle)Siebenrockiella leytensisเตาปาฟิลิปปินส์ (Philippine Forest Turtle)Trachemys scripta elegansRed-eared SliderTestudinidaeจำพวกเต่าโดมทุกชนิดในสกุล Testudinidae (Tortoises)Astrochelys (Geochelone) radiataเตาบกลายรัศมี หรือเตาเรเดียด้า (Radiated Tortoise)Astrochelys yniphoraเตาบกลัสการ์ (Ploughshare Tortoise)Chelonoides (Geochelone) carbonariaเตาบกลีนแดง (Red-footed Tortoise)Geochelone elegansเตาบกลีนเดีย (Indian Star Tortoise)Geochelone platynotaเตาดาวพมา (Burmese Star Tortoise)Geochelone (Stigomochelys) pardalisเตาเลือดาว (Leopard Tortoise)Geochelone (Centrochelys) sulcata)เตาเลือดาว (Leopard Tortoise)Indotestudo elongataเตาเหลือง เตาขึ้ลง เตาเทียน เตาเพ็ก (Yellow-headed Tortoise)Malacochersus tornieriเตาเหลือง เตาขึ้ลง เตาเข็มง (Asian Brown Tortoise)Manouria emysเตาเหลือง เตาหก เตาหกเหลือง (Asian Brown Tortoise)Manouria impressaเตาเดือย หรือ เตาควะ หรือ เตาเขาสูง (Impressed Tortoise)Amyda cartilaginea-ตะพาบน้ำ (Asiatic Softshell Turtle)	Batagur	
Leucocephalon yuwonoi	Geoclemys hamiltonii	
Platysternon megacephalum เต่าปู่ลู (Big-headed Turtle) Orlitia borneensis - เต่าแม่น้ำบอร์เนียว (Malaysian Giant Turtle) Siebenrockiella leytensis - เต่าป่าฟิลิปปินส์ (Philippine Forest Turtle) Trachemys scripta elegans - Red-eared Slider Testudinidae - จำพวกเต่าโดมทุกชนิดในสกุล Testudinidae (Tortoises) Astrochelys (Geochelone) radiata - เต่าบกลายจักร เต่าลายรัศมี หรือเต่าเรเดียต้า (Radiated Tortoise) Astrochelys yniphora - เต่ามาดากัสการ์ (Ploughshare Tortoise) Chelonoides (Geochelone) carbonaria - เต่าบกตีนแดง (Red-footed Tortoise) Geochelone elegans - เต่าดาววอินเดีย (Indian Star Tortoise) Geochelone platynota - เต่าดาวพมา (Burmese Star Tortoise) Geochelone (Stigomochelys) pardalis - เต่าเลือดาว (Leopard Tortoise) Geochelone (Centrochelys) sulcata) - เต่าชุลคาตัา (African Spurred Tortoise) Indotestudo elongata - เต่าเหลือง เต่าชีผึ้ง เต่าเทียน เต่าเพ็ก (Yellow-headed Tortoise) Malacochersus tornieri - เต่าแพนเด็ก (Pancake Tortoise) Manouria emys - เต่าหก เต่าหกเหลือง (Asian Brown Tortoise) Manouria impressa - เต่าเดือย หรือ เต่าควะ หรือ เต่าเขาสูง (Impressed Tortoise) Amyda cartilaginea - เต่ามีน้ำ (Asiatic Softshell Turtle)	Cuora	จำพวกเตาหับทุกชนิดในสกุล Cuora (Asian Box Turtles)
Orlitia borneensisเตาแม่น้ำบอร์เนียว (Malaysian Giant Turtle)Siebenrockiella leytensisเตาปาฟิลิปปินส์ (Philippine Forest Turtle)Trachemys scripta elegansRed-eared SliderTestudinidaeจำพวกเตาโดมทุกชนิดในสกุล Testudinidae (Tortoises)Astrochelys (Geochelone) radiataเตาบกลายจักร เตาลายรัศมี หรือเตาเรเดียตัว (Radiated Tortoise)Astrochelys yniphoraเตามาดากัสการ์ (Ploughshare Tortoise)Chelonoides (Geochelone) carbonariaเตาบกตีนแดง (Red-footed Tortoise)Geochelone elegansเตาดาวอินเดีย (Indian Star Tortoise)Geochelone platynotaเตาดาวพมา (Burmese Star Tortoise)Geochelone (Stigomochelys) pardalisเตาเลือดาว (Leopard Tortoise)Geochelone (Centrochelys) sulcata)เตาผูลคาตัว (African Spurred Tortoise)Indotestudo elongataเตาเหลือง เตาขี่ผึ้ง เตาเทียน เตาเพ็ก (Yellow-headed Tortoise)Malacochersus tornieriเตาแหนเค็ก (Pancake Tortoise)Manouria emysเตาหก เตาหกเหลือง (Asian Brown Tortoise)Manouria impressaเตาหก เตาหกเหลือง เตาเดือย หรือ เตาเขาสูง (Impressed Tortoise)Amyda cartilaginea-ตะพาบน้ำ (Asiatic Softshell Turtle)	Leucocephalon yuwonoi	เต <sup>่</sup> าสุลาเวสี (Sulawesi Forest Turtle)
Siebenrockiella leytensis		
Trachemys scripta elegans Red-eared Slider Testudinidae จำพวกเตาโดมทุกชนิดในสกุล Testudinidae (Tortoises) Astrochelys (Geochelone) radiata เตาบกลายจักร เตาลายรัศมี หรือเตาเรเดียตา (Radiated Tortoise) Astrochelys yniphora เตามาดากัสการ์ (Ploughshare Tortoise) Chelonoides (Geochelone) carbonaria เตามาดีนแดง (Red-footed Tortoise) Geochelone elegans เตาดาวอินเดีย (Indian Star Tortoise) Geochelone platynota เตาดาวพมา (Burmese Star Tortoise) Geochelone (Stigomochelys) pardalis เตาเลือดาว (Leopard Tortoise) Geochelone (Centrochelys) sulcata) เตาเลือดาว (Leopard Tortoise) Indotestudo elongata เตาเหลือง เตาขี้ผึ้ง เตาเทียน เตาเพ็ก (Yellow-headed Tortoise) Malacochersus tornieri เตาเหลือง (Asian Brown Tortoise) Manouria emys เตาหก เตาหกเหลือง (Asian Brown Tortoise) Manouria impressa เตาเดือย หรือ เตาควะ หรือ เตาเขาสูง (Impressed Tortoise) Amyda cartilaginea ตะพาบน้ำ (Asiatic Softshell Turtle)	Orlitia borneensis	💶 เด่าแม่น้ำบอร์เนียว (Malaysian Giant Turtle)
Testudinidae	Siebenrockiella leytensis	เต <b>่าป</b> ่าฟิลิปปินส์ (Philippine Forest Turtle)
Testudinidae	Trachemys scripta elegans	Red-eared Slider
Astrochelys yniphora		
Astrochelys yniphora		
Chelonoides (Geochelone) carbonaria       แต่บกตีนแดง (Red-footed Tortoise)         Geochelone elegans       เต่าดาวอินเดีย (Indian Star Tortoise)         Geochelone platynota       เต่าดาวพมา (Burmese Star Tortoise)         Geochelone (Stigomochelys) pardalis       เต่าเลือดาว (Leopard Tortoise)         Geochelone (Centrochelys) sulcata)       เต่าซูลคาต้า (African Spurred Tortoise)         Indotestudo elongata       เต่าหลือง เต่าขี้ผึ้ง เต่าเทียน เต่าเพ็ก (Yellow-headed Tortoise)         Malacochersus tomieri       เต่าแพนเค็ก (Pancake Tortoise)         Manouria emys       เต่าหก เต่าหกเหลือง (Asian Brown Tortoise)         Manouria impressa       เต่าเดือย หรือ เต่าควะ หรือ เต่าเขาสูง (Impressed Tortoise)         Amyda cartilaginea       ตะพาบน้ำ (Asiatic Softshell Turtle)		
Geochelone elegansเตาดาวอินเดีย (Indian Star Tortoise)  Geochelone platynotaเตาดาวพมา (Burmese Star Tortoise)  Geochelone (Stigomochelys) pardalisเตาเลือดาว (Leopard Tortoise)  Geochelone (Centrochelys) sulcata)เตาซูลคาต้า (African Spurred Tortoise)  Indotestudo elongataเตาหลือง เตาขี้ผึ้ง เตาเทียน เตาเพ็ก (Yellow-headed Tortoise)  Malacochersus tornieriเตาหก เตาหกเหลือง (Asian Brown Tortoise)  Manouria emysเตาหก เตาหกเหลือง (Asian Brown Tortoise)  Manouria impressaเตาเดือย หรือ เตาควะ หรือ เตาเขาสูง (Impressed Tortoise)  Amyda cartilagineaดะพาบน้ำ (Asiatic Softshell Turtle)	Chelonoides (Geochelone) carbonaria	เต่าบกตีนแดง (Red-footed Tortoise)
Geochelone platynotaเต่าดาวพมา (Burmese Star Tortoise)  Geochelone (Stigomochelys) pardalisเต่าเลือดาว (Leopard Tortoise)  Geochelone (Centrochelys) sulcata)เต่าชูลคาต้า (African Spurred Tortoise)  Indotestudo elongataเต่าหลือง เต่าขี้ผึ้ง เต่าเทียน เต่าเพ็ก (Yellow-headed Tortoise)  Malacochersus tornieriเต่าเหลือง (Asian Brown Tortoise)  Manouria emysเต่าหก เต่าหกเหลือง (Asian Brown Tortoise)  Manouria impressaเต่าเดือย หรือ เต่าควะ หรือ เต่าเขาสูง (Impressed Tortoise)  Amyda cartilagineaตะพาบน้ำ (Asiatic Softshell Turtle)		
Geochelone (Stigomochelys) pardalisเต่าเลือดาว (Leopard Tortoise)  Geochelone (Centrochelys) sulcata)เต่าชูลคาต้า (African Spurred Tortoise)  Indotestudo elongataเต่าหลือง เต่าขี้ผึ้ง เต่าเทียน เต่าเพ็ก (Yellow-headed Tortoise)  Malacochersus tornieriเต่าเหลือง (Asian Brown Tortoise)  Manouria emysเต่าเดือย หรือ เต่าควะ หรือ เต่าเขาสูง (Impressed Tortoise)  Amyda cartilagineaตะพาบน้ำ (Asiatic Softshell Turtle)		
Geochelone (Centrochelys) sulcata)เต่าซูลคาต้า (African Spurred Tortoise)         Indotestudo elongataเต่าเหลือง เต่าขี่ผึ้ง เต่าเทียน เต่าเพ็ก (Yellow-headed Tortoise)         Malacochersus tornieriเต่าแพนเค็ก (Pancake Tortoise)         Manouria emysเต่าหก เต่าหกเหลือง (Asian Brown Tortoise)         Manouria impressaเต่าเดือย หรือ เต่าควะ หรือ เต่าเขาสูง (Impressed Tortoise)         Amyda cartilagineaตะพาบน้ำ (Asiatic Softshell Turtle)		·
Indotestudo elongataเต่าเหลือง เต่าขี้ผึ้ง เต่าเทียน เต่าเพ็ก (Yellow-headed Tortoise)  Malacochersus tornieriเต่าแพนเค็ก (Pancake Tortoise)  Manouria emysเต่าหก เต่าหกเหลือง (Asian Brown Tortoise)  Manouria impressaเต่าเดือย หรือ เต่าควะ หรือ เต่าเขาสูง (Impressed Tortoise)  Amyda cartilagineaดะพาบน้ำ (Asiatic Softshell Turtle)		
Malacochersus tornieriเต่าแพนเค็ก (Pancake Tortoise) Manouria emysเต่าหก เต่าหกเหลือง (Asian Brown Tortoise) Manouria impressaเต่าเดือย หรือ เต่าควะ หรือ เต่าเขาสูง (Impressed Tortoise) Amyda cartilaginea		
Manouria emysเต่าหก เต่าหกเหลือง (Asian Brown Tortoise) Manouria impressaเต่าเดือย หรือ เต่าควะ หรือ เต่าเขาสูง (Impressed Tortoise) Amyda cartilagineaตะพาบน้ำ (Asiatic Softshell Turtle)		
Manouria impressaเต่าเดือย หรือ เต่าควะ หรือ เต่าเขาสูง (Impressed Tortoise) Amyda cartilagineaตะพาบน้ำ (Asiatic Softshell Turtle)		
Amyda cartilagineaดะพาบน้ำ (Asiatic Softshell Turtle)		
		-
	· ·	
Pelochelys ตะพาบหัวกบ กราวเขียว กริวคราว (Giant Softshell Turtle)		
Pelodiscus sinensisตะพาบจีน (Chinese Softshell Turtle)		

สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก Dyscophus antongilii	อึ่งมะเขือเทศ หรือ กบมะเขือเทศ (Tomato Frog)
ปลา	
Scleropages formosus	ปลาตะพัด (Asian Arowana)
	ปลานโปเลียน หรือปลาขุนทองหัวโหนก (Humphead Wrass
Hippocampus	ม้าน้ำ (Seahorses)
สัตว์ที่ไม <sup>่</sup> มีกระดูกสันหลัง Tridacnidae	จำพวกหอยมือเสือและหอยมือแมวทุกชนิดในวงศ์ (Giant Clams)
พืช	
Nepenthaceae	หม้อข้าวหม้อแกงลิง (Pitcher Plantss)
Orchidaecae (1)	กล้วยไม <b>้</b> ในบัญชีแนบท <b>้</b> ายหมายเลข 1 (Orchids)
Orchidaecae (2)	การจำแนกกล้วยไม้ป่า (Orchids)
Gonystylus	รามิน (Ramin)

# ไซเตสและสถานภาพของความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่า (IUCN Red List)

#### **CITES**

CITES (อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์และพืชป่าที่ใกล้ สูญพันธุ์) เป็นข้อตกลงระดับสากลระหว่างรัฐบาล (ประเทศภาคี) ซึ่งมีวัตถ - ประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่าการค้าสัตว์ และพืชป่าระหว่างประเทศ (อวัยวะ ชิ้นส่วน และ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น อะไรก็ตามที่ใช้อวัยวะหรือชิ้นส่วนเป็นวัตถุดิบ) มิได้คุกคามต่อความอยู่รอดของชนิดพันธุ์นั้นๆ

CITES ปฏิบัติงานโดยกำหนดมาตรการควบคุมการค้าสัตว์และพืชบางชนิดพันธุ์ ระหว่างประเทศ ทั้งการนำเข้า ส่งออก ส่งกลับออกไป และการนำสัตว์ และพืชในจำนวนชนิดพันธุ์ 30,000 ชนิดในบัญชีของอนุสัญญา เข้าไปใน ธรรมชาติ ให้ทำได้โดยมีการอนุญาตอย่างถูกต่องเท่านั้น บัญชีแนบท้ายอนุ สัญญา CITES แยกสัตว์และพืชออกเป็นสามบัญชี หมายความว่าการ ค้าสัตว์และ พืชเหล่านี้อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดด้วยระบบขออนุญาตซึ่งเป็นมาตร ฐานเดียวกัน:

บัญชีแนบท<sup>้</sup>ายหมายเลข 1 สำหรับชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์ อนุญาตให<sup>้</sup>ทำการค้า เฉพาะในกรณีพิเศษเท่านั้น

บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 สำหรับชนิดพันธุ์ซึ่งอาจสูญพันธุ์ได้หากไม่ควบคุมการ ค้าเสียก่อน โดยไม่จำเป็นต้องเป็นชนิดพันธุ์ที่กำลังถูกคุกคามในปัจจุบัน

บัญชีแนบท้ายหมายเลข 3 สำหรับชนิดพันธุ์ซึ่งมีการคุ้มครองในประเทศภาคี ประเทศใดประเทศหนึ่ง และร้องขอให้ประเทศภาคีอื่นๆ ช่วยควบคุมการค้า

ตัวอย่างชนิดพันธุ์ในบัญชีแนบท้าย CITES สามารถนำเข้าหรือส่งออก (หรือ ส่งกลับออกไป) ในประเทศที่ไม่ใช่ภาคีได้ หากมีการจัดทำเอกสารล่วงหน้า และสำแดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดที่ทำการนำเข้าหรือส่งออก ในบางกรณี กฎหมายภายในประเทศอาจกำหนดให<sup>้</sup>ใช้มาตรการเข**้มงวดกว**่านี้ซึ่งควรปฏิบัติ ตามกฎหมายนั้น

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถหาได้จาก www.cites.org

#### รายชื่อชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามของ IUCN

กว่า 40 ปีที่ คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (SSC) ของ IUCN (สหภาพ สากลเพื่อการอนุรักษ์) ทำการประเมินสถานภาพเชิงอนุรักษ์ของสัตว์และพืช ทั้งในระดับชนิดพันธุ์ ชนิดพันธุ์ย่อย กลุ่มย่อย ไปจนถึงประชากรย่อย โดยพิจารณาสถานภาพรวมทั้งโลกเพื่อหาภาพที่ชัดเจนว่าพืชและสัตว์ใดบ้าง อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์

รายชื่อชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามของ IUCN แสดงอนุกรมวิธาน สถานภาพเชิง อนุรักษ์ และข้อมูลการแพร่กระจายของสัตว์ และพืชที่ประเมินแล้ว โดย กำหนดการจำแนกหมวด และเกณฑ์ต่างๆ ขึ้นเพื่อตัดสินระดับความเสี่ยง ธรรมชาติ ให้ทำได้โดยมีการอนุญาตอย่างถูกต้องเท่านั้น บัญชีแนบท้ายอนุ-

ชนิดพันธุ์ซึ่งมีสถานภาพเชิงอนุรักษ์เป็น CR (ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง), EN (ใกล้สูญพันธุ์) และ VU (มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์) จะมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มากกว่าชนิดพันธุ์ในสถานภาพ NT (อาจมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ในอนาคต) หรือ LC (ไม่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์)

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถหาได้จาก www.redlist.org

# คณะทำงานฝ่ายปฏิบัติการและคณะทำงานฝ่ายวิทยาการของไซเตส

CITES ปฏิบัติงานโดยกำหนดให<sup>้</sup>การค<sup>้</sup>าระหว**่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์พืชและสัตว**์จำนวนหนึ่งต<sup>้</sup>องมีการควบคุม การนำเข้า ส่งออก ส่งกลับออกไป และนำชนิดพันธู์ควบคุม นี้ไปแพร่กระจายในเขตอื่น ต้องอยู่ภายใต้ระบบใบอนุญาต โดยให้แต่ละประเทศซึ่งเป็นภาคีของ CITES แต่งตั้งหน่วยงานฝ่ายปฏิบัติการขึ้นมาหนึ่งแห่งหรือมากกว**่านั้น** เพื่อรับผิดชอบด้านใบอนุญาต และหน่วยงานฝ่ายวิชาการอีกหนึ่งแห่งหรือมากกว่า เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลกระทบจากการค้าต่อสถานภาพของชนิดพันธุ์นั้นๆ

#### ฝ่ายปฏิบัติการ

กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 61 ถ.พหลโยธิน จตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์: 02 561 4838; 02 940 6449

โทรสาร: 02 5614838; 02 940 6449

ฝ่ายการค้าพืชตามอนุสัญญา (CITES) กองคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร 50 ถ.พหลโยธิน จตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์: 02 940 5687

โทรสาร: 02 940 5687

ส่วนอนุญาตและจัดการประมง สำนักบริหารจัดการดานการประมง กรมประมง เกษตรกลาง บางเขน กทม. 10900

โทรศัพท์: 02 561 4689-90 โทรสาร: 02 579 9528

#### ฝ่ายวิทยาการ

กลุ่มงานวิจัยสัตว์ปา สำนักอนุรักษ์สัตว์ปา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาและพันธุ์พืช 61 ถ.พหลโยธิน จตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์: 02 561 4838; 02 940 6449 โทรสาร: 02 5614838; 02 940 6449

กองคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร 50 ถ.พหฺลโยธิน จตุจักร กทม. 10900

โทรศัพท์: 02 940 6434 โทรสาร: 02 579 9874

สถาบันด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ กรมประมง เกษตรกลาง บางเขน กทม. 10900

โทรศัพท์: 02 561 4680-9 โทรสาร: 02 579 9528

# ขอแนะนำในการตรวจสอบ ใบอนุญาตไซเตส


# ใบอนุญาตไซเตสที่ใช้กำกับการขนส่ง

**บัญชีแนบท้ายหมายเลข 1** ใบอนุญาตส่งออก หรือใบอนุญาตูส่งกลับออกไป และใบอนุญาตนำเข้า

#### บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2

ใบอนุญาต<sup>ี</sup>ส่งออก หรือใบอนุญาตส่งกลับออกไป

### บัญชีแนบท้ายหมายเลข 3




สถานที่ที่สามารถใช้ได้ (บางประเทศอาจใช้ตราไซเตส)


<sup>\*\*</sup> กรุณาตรวจสอบหากชนิดพันธุ์นั้นๆ ระบุให้ใช้แบบฟอร์มป์ระเภทอื่นในการควบคุม


# ีการวัดและอภิธานศัพท<sup>์</sup>

# การวัดขนาด









#### แผ่นเกล็ด - scute:

อวัยวะภายนอก แข็งเหมือนเขา หรือกระดูก สำหรับเตาใช้เรียก เกล็ดที่อยูบนกระดอง และจระเข้

#### กระดองส่วนบน - carapace:

กระดองด้านบนที่ครอบปิด หลังเต่า ลักษณะเป็นแผ่น เกล็ดหรือเป็นหนังนุ่ม

#### กระดองส่วนล่าง หรือ แผ่นอก - plaston:

กระดองด้านล่างที่ครอบ ปิดส่วนท้องของเต่า











# Bos gaurus (ปัจจุบัน B. frontalis) - Gaur and Bos javanicus - Banteng

กระทิง

Seladana (มาเลเซีย), Pvouna (พม่า)

การแพร่กระจาย: บังคลาเทศ ภูฎาณ กัมพูชา อินเดีย ลาว มาเลเซีย พม่า เนปาล

ไทย และเวียดนาม

ชื่ออื่น:

ความสงจากพื้นถึงไหล่: 165 - 220 ซ.ม. ขนาด: ความย้าวหัวและลำตัว: 250 - 330 ซ.ม.

ความยาวหาง: 70 - 105 ซ.ม. น้ำหนัก: 650 - 1,000 ก.ก.

วัวแดง

Tsaine (พม่า)

กัมพชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ไทย และเวียดนาม

ความสูงจากพื้นถึงไหล่: 120 - 190 ซ.ม. ความยาวหัวและลำตัว: 180 - 225 ซ.ม.

ความยาวหาง: 65 - 70 ซเม. น้ำหนัก: 400 - 900 ก.ก.

สถานภาพเชิงอนรักษ์สากล:<sup>∞</sup>

กระทิง: บัญชีแน่บท้ายหมายเลข 1 ของไชเตส

IUCN: กระทิง มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (VU) วัวแดง ใกล้สูญพันธุ์ (ER)


การค้มครองในประเทศไทย:

สัตว์ปาค<sup>ั</sup>มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและค<sup>ั</sup>มครอง

สัตว์ป่า พ.ศ. 2535


ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2548 (Bos gaurus)

รปแบบการค้า: ขายเขา กะโหลก และเนื้อ



กระหม่อมเกลี้ยง ไม่มีขน









เขาวัวแดงที่วางขาย



ลักษณะเด่น: Bos gaurus (B. frontalis) - กระทิง าะโหลกเว้าเข้า ลำตัวสีน้ำตาลเช้ม ดำ หรือเทา ขาท่อนล่างขาว

ด้านใน ความยาวเขา: ≤ 95 ซ.ม. ความยาวเส้นรอบวงเขา:≤56 ซ.ม.



ขาท่อนล่างและวงก้นมีสีขาว


ลำตัวสีน้ำตาลเข้มถึงดำ (ตัวผู้)

น้ำตาลอ่อน (ตัวเมีย).

วัวแดงรุ่นตัวผู้

ความยาวเขา: ≤87 ซ.ม. ความยาวเส้นรอบวงเขา: ≤ 48 ซ.ม.

Budorcas taxicolor - Takin




Bos taurus - Domestic Cow

บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 ของไชเตล ้โคนเขาอาจแตกร่ยเป็นพ่ เขามีความยาว: 63.5 ซ.ม. เส้นรอบวงของเขายาว: 33 ซ.ม

Image Source: Environment Canada

🖔 |ความยาวเส้นรอบวงเขา: ≦ 58 ซ.ม.













# Capricornis spp. - Serow spp.

# เลียงผา

ชื่ออื่น: Kambing Gurun (มาเลเซีย), Taw sai (พม่า)

การแพร่กระจาย: บังคลาเทศ ภูฏาณ กัมพูชา จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ลาว มาเลเซีย พม่า เนปาล

ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม

ความยาวหัวและลำตัว: 140 - 155 ซ.ม. ความสูงถึงไหล่: 85-94 ซ.ม. ความยาวหาง: 11 - 16 ซ.ม. ความยาวเขา: 15 - 25.5 ซ.ม. ขนาด:

#### ิสถานภาพเชิงอนุรักษ์สากล:<sup>∞</sup>

ชนิดพันธุ์ในวงศ์ Capricornis ทั้งหมด

#### บัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 ของไชเตส

(ยกเว้น C. crispus - เลียงผาญี่ปุ่น และ C. swinhoei - Formosan/เลียงผาไต้หวัน)

IUCN: แตกต่างกันไปตั้งแต่ LR - VU (บางชนิด

ไม่มีสถานภาพเชิงอนรักษ์)

#### การคัมครองในประเทศไทย:

สัตว์ปาคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครอง

สัตว์ป่า พ.ศ. 2535

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2548



#### ลักษณะเด่น:



Credit: Claire Beastall

มีต่อมน้ำมันเห็นเด่นชัดใต้

ตาทั้งสองข้าง



Credit: Chris Shepherd /TSEA

คอสั้น หนา มีแผงขนแข็งจากกระหม่อมถึงใหล่

(สีน้ำตาลหรือขาว)

ขนเส้นหยาบ สีแต<sup>ˆ</sup>กต่างกันไปตั้งแต่น้ำตาล น้ำตาลอมเทา ดำ หรืออมแดง

สีที่ลำตัวด้านล่างอาจอ่อนกว่าหลัง

#### รูปแบบการค้า: มักพบขายอวัยวะ (เขา หัว ขาหน้า ฯลฯ) สำหรับทำยาและกินเนื้อ





เขาเลียงผา

เขาเลียงผา Credit: Chris Shepherd/TSEA

หนังเลียงผา

Credit: Chris Shepherd/TSEA





ทำน้ำมันจากหัว และขา

หัวเลียงผา












Naemorhedus spp. - Goral spp.

ความยาวหัวและลำตัว: 82 - 130 ซ.ม. ความสูงถึงไหล่: 57 - 78.5 ซ.ม. ความยาวหาง: 7 - 20 ซ.ม. ความยาวเขา: 12 - 7.8 ซ.ม.

– ลำตัวและเขาเล็กกว่า Capricornis spp.

ไม่มีต่อมน้ำมันเห็นเด่นชัดใต้ตา

 สีขน: เทาจนถึงน้ำตาลเข้มหรืออมแดง – ลำตัวด้านล่าง: มักจะสือ่อนกว่าหลัง













# Pantholops hodgsonii - Tibetan Antelope

ชื่ออื่น: Chiru (อังกฤษ), Tsod (ทิเบต), Zanglingyang (จีน)

การแพร่กระจาย: จีน (Qinghai, Xingjiang) อินเดีย (Jammu-Kashmir)

ความสงถึงใหล่: สงสด 85 ซม. น้ำหนัก: สงสด 40 กก. ขนาด:

สถานภาพเชิงอนุรักษ์สากล:

บัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 ของไชเตส

IUCN: ใกล้สูญพันธุ์ (EN)

การคุ้มครองในประเทศไทย:

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่

23 ฐันวาคม 2548

หมายเหต: ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในประเทศเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจำแนก




#### ลักษณะเด่น:


ผลิตภัณฑ์จากขนชิรูซึ่งเป็นที่รู้จักดีคือ ผ**้าชาทูช** ี่ผ้าคลมไหล่ชาทชมี้ความนุ่ม บางและเนื้อไม่แน้นเหมือนผ้าชนิดอื่น ผ<sup>้</sup>ขาย<sup>่</sup>จะแสดงค<sup>ั</sup>ณสมบัตินี้โดยการดึงผ<sup>้</sup>าลอดแหวน

- ส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวนวล และสีครีม (แต่สามารถย้อมเป็นสีอะไรก็ได้) ผ้าขาวมั๊กเป็นสีที่แพงที่สด
- ผู้ทออาจจะปักชื่อตัวเองไว้ตรงมมผ้า
- ์ มักปักเป็นลวดลายละเอียดมากเต็มทั้งผืนหรือตามชายผ<sup>้</sup>า
- ชายผ้าคลมไหล่มักเก็บโดยเย็บทบสั้นๆ
- อาจมีลวดลวยข<sup>้</sup>าวหลามตัดจากการทอ เป็นลายเล็กมากแต**่ชัดเจน** (ใช้แว่นขยายส่องจึงจะเห็น)





ผ้าชาทูชทอจากขนชั้นในจึงไม่มีขนเส้นยาวมากๆ ชึ่งเป็นขนชั้นนอกปะปน แต่อาจมีขนเส้นหยาบสั้นๆ สีอ่อนแทรกอยู่บ้าง เส้นขนนี้จะใหญ่กว่าผมคน ลักษณะหยิกเป็นลอน



mage Credit: Environment Canada

# รปแบบการค้า:

ขายหนังและผ้าคลมไหล่ทอ สำเร็จ บางครั้งพบเขาด้วย (ใช้ทำยาแผนโบราณ)





#### ลักษณะคล้ายคลึงกับ:

- ผ้า pashmina ซึ่งทอจากขนแพะแคชเมียร์ มีลักษณะใกล้เคียงกับชาทช แต่ราคาจะต่ำกว่าผ้าชาทชมาก
- ลักษณะใกล้เคียงดังกล่าวประกอบด้วย น้ำหนักเบา อ่อนนุ่ม บางผืนมีลายทอรปข้าวหลามตัดด้วย ผ้าที่ทอแบบหลวมๆ จะลอดผ่านแหวนได้เพราะมีเส้นใยในตัวผ้าไม่มากนัก
- ตามปกติริ้วตรงชายผ้า pashmina จะเป็นเส้นยาวกว่าและตีเกลียวไว้















#### พถษภาคม 2551

# Saiga tatarica - Saiga Antelope

# Saiga Antelope

ชื่ออื่น:

การแพร่กระจาย: คาซัคสถาน มองโกเลีย รัสเซีย เติร์กเมนิสถาน และอซเบกิสถาน

ขนาด: ความยาวหัวและลำตัว: 108 - 146 ซ.ม. ความยาวหาง: 6 - 13 ซ.ม. น้ำหนัก: 21 - 51 ก.ก. สถานภาพเชิงอนรักษ**์สาก**ล:

บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 ของไชเตส

IUCN: ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (CR)

การคุ้มครองในประเทศไทย:

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2548




Illustration Credit: Environment Canada

#### ลักษณะเด่นของเขา Saiga Antelope:



Credit: TRAFFIC SEA

Credit: Environment Canada

© TRAFFIC Southeast Asia 2008

แตกต่างจากเขาสัตว์อื่น

ตัวผู้เท่านั้นที่จะมีเขาซึ่งมีลักษณะดังนี้:

- โคนตัน
- มีลักษณะกึ่งโปร่งแสง
- สีน้ำตาลอ่อนคล้ายขี้ผึ้ง
- เมื่อนำมาตัดขวางจะเกือบเป็นวงกลม
- เขาโค้งเล็กน้อย
- ยาวได้ถึง 30 ซ.ม. (วัดตามส่วนโค้ง)



รปการค้า: ขายทั้งเขา หรือถากเป็นแผ่น



เขา Saiga ที่วางขาย




Credit: TRAFFIC SEA





เขา Saiga ที่ถากเป็นแผ่น Credit: Claire Beastall





Saiga Antelope Horn

羚羊角 อักษรจีน:

Pinyin: Ling Yang Jiao





ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จากเขา Saiga Credit: TRAFFIC SEA





Credit: TRAFFIC SEA









Credit: Environment Canada


# **Multi-tined Antlers**

#### เขากวาง

เขาเหล่านี้เป็นเขาที่พบในการค้าบ่อยครั้งที่สุดเท่านั้น - ยังมีเขากวางชนิดอื่นๆ ที่ชื้อขายกันอีกมาก เขาจะมีเฉพาะในกวางตัวผ้โตเต็มวัยเท่านั้น

#### สถานภาพเชิงอนุรักษ์สากล: บัญชีแนบท้ายไชเตส แต่ละชนิดแตกต่างกัน












์ เขาทั้งเขา ส**่วนที่นิ่มของเขากวาง และส**่วนอื่นๆ

รปแบบการค้า:









Credit: TRAFFIC Southeast Asia

Credit: TRAFFIC Southeast Asia

Image Source: Environment Canada











# Moschus spp. - Musk Deer Spp.

# กวางมัสค์ หรือกวางชะมด spp.

ชื่ออื่น: Kado gaow (พม่า)

**การแพร่กระจาย:** อัฟกานิสถาน ภูฎาณ จีน อินเดีย เกาหลี (เหนือและใต<sup>้</sup>) ลาว มองโกเลีย พม่า เนปาล

ปากีสถาน รัสเซีย และเวียดนาม

ขนาด:

ความยาวหัวและลำตัว: 70 - 100 ซ.ม. ความสูงถึงไหล่: 50 - 61 ซ.ม. ความยาวหาง: 1.8 - 6 ซ.ม.

น้ำหนัก: 7 - 17 ก.ก.

สถานภาพเชิงอนุรักษ**์สาก**ล:

บัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 ของไซเตส

กวางมัสค์ที่พบใน อัฟกานิสถาน ภูฎาณ อินเดีย พม่า เนปาล และปากีสถาน

บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 ของไชเตส:

กวางมัสค์ทุกชนิดที่พบในประเทศอื่น

IUCN: แตกต**่างกันไป สูงสุดคือใกล**้สูญพันธุ์ (EN)

การค้มครองในประเทศไทย:

รปแบบการค้า: กลิ่น - สำหรับทำยาแผนโบราณ - ขายทั้งต่อม หรือผ่านกรรมวิธีมาแล้ว (ส่วนใหญ่มักเป็นน้ำมัน สเปรย์ พลาสเตอร์ยา และเป็นผง)

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล<sup>้</sup>อม พ.ศ.2548 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2548



Credit: WWF-Canon / Gerald S. CUBITT

#### ลักษณะเด่น:



Credit: WWF-Canon / Grigori MAZMANYAN

- ไม่มีเขา
- สะโพกสงกว่าใหล่ประมาณ 5 ซ.ม.
- ลำตัวปก<sup>้</sup>คลมด้วยขนสาก หนา โคนขนมีสีขาว
- สี: หลากหลาย ส่วนใหญ่เป็นสีน้ำตาลเข้ม มีแต้มและจุดประเล็กๆ สีเทาอ่อนบริเวณหลัง ส่วนใต้ท้องสีจะอ่อนกว่า
- คาง ขอบหูด้านใน และต้นขาด้านในสีออกขาว อาจจะมีจุดขาวทั้งสองข้างของลำคอ

เขี้ยวชื่บนของตัวผู้ยาว ราว 7.5 ซ.ม. ส่วนตัวเมียจะสั้นกว่า



Credit: WWF-Canon / Grigori MAZMANYA

ต**่อมกลิ่น** Credit: TRAFFIC



#### ต่อมกลิ่น:

- พบระหว่างสะดือและอวัยวะสืบพันธุ์ของตัวผู้ที่มีอายุมากกว่า 3 ปี
- ขนาด ที่ขายกันยาวประมาณ 4 6 ซ.ม. กว<sup>้</sup>าง 3.5 4.5 ซ.ม. และลึก 4 - 5 ซ.ม.
- ต่อมถกชำแหละมาจากกวางและทำให้แห้ง
- สารคัดหลั่งในต่อมจะมีลักษณะร่วน (สีออกแดง-น้ำตาล จนถึงดำ) เป็นผง

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากกวางมัสค์









คำว่ากวางมัสค์บนบรรจุภัณฑ์ยาแผนโบราณ

Musk Deer

Deer Musk

อักษรจีน:

鹿麝

麝香

Pinyin:

She

Moschus, Cervi

Roman:

n: She Xiang

Moschus











# Felidae (1) - Cats

# แมวและเสือ

ขนาด: ความยาวหัวและลำตัว: ต่างกันไปตั้งแต่ 37 - 280 ซ.ม.

ความยาวหาง: 5.1 - 110 ซ.ม. น้ำหนัก: 1.5 - 306 ก.ก.

#### สถานภาพเชิงอนรักษ**์**สากล:<sup>"</sup>

แมวและเสือทุกชนิด (ยกเว้นแมวบ้าน) อยู่ใน บัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 หรือ 2 ของไชเดส

#### การคุ้มครองในประเทศไทย:

สัตว์ปาคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง สัตว์ปา พ.ศ. 2535 (เสือโคร่ง เสือดาว หรือ เสือดำ เสือปลา เสือไฟ เสือลายเมฆ แมวดาว หรือ แมวแกว แมวป่า หรือ เสือกระต่าย แมวป่าหัวแบน แมวลายหินอ่อน) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2548



ลูกแมวดาว Credit: WWF-Canon / Alain COMPOST

#### ลักษณะเด่น:



หัว: กลม สั้น ลำตัว: เพรียว มีกล้ามเนื้อ ไม่เทอะทะ อกผาย จำนวนหัวนม: 2 - 4


<u>ดีน: หน้า - 5 นิ้ว</u> หลัง - 4 นิ้ว ฝ่าดีนเกลี้ยงไม่มีขน



เล็บแมวบาน Credit: Claire Beasta




เสือไฟ Credit: WWF-Canon / Gerald S. CUBITT








แมวป่า Credit: WWF-Canon / Roger HOOPER



#### ฟัน:



- a) ฟันหน้า (Incisors): เล็ก เรียงเป็นแถว (บน: 3; ล่าง: 3) x 2
- b) เขี้ยว (Canine): ยาว แหลม โค้งนิดๆ (บน: 1; ล่าง: 1) x 2
- c) ฟันตัด (สำหรับตัดเนื้อ/กรามหน้า): ใหญ่ (บน: 2 - 3; ล่าง: 2) x 2
- d) ฟันบด (กราม): ฟันบน เล็ก (บน: 1; ล่าง: 1) x 2

Image Credit: Environment Canada

#### ่รูปแบบการค้า:

หนัง กระดูก ฟืน เล็บ เนื้อ เป็นส่วนผสมยาแผนโบราณ และขายสัตว์มีชีวิต











หู: บางชนิดหูแหลม บางชนิดหูกลม

ตา: ม่านตาปิดเปิดในแนวดิ่ง

# Southeast Asian Felidae (2) (Cats) listed in CITES Appendix I

# แมวและเสือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่อยู่ใน

# บัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 ของไซเตส

ชนิดอื่นๆ ที่เหลือ (ยกเว้นแมวเลี้ยง) อยู่ใน บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 ของไชเตส



ความยาวหัว และลำตัว: 140 - 180 ซเม. ความยาวหาง: 60 - 95 ซม. น้ำหนัก: 180 - 245 กก.





Uncia uncia - เสือดาวหิมะ



ความยาวหัวและลำตัว: 100 - 130 ชม. ความยาวหาง: 80 - 100 ซม. น้ำหนัก: 30 - 55 กก.

ขนยาวกว่าเสือชนิดอื่นใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขนส่วนท้องดูกหนา





#### สถานภาพเชิงอนรักษ์สากล:

#### การค้มครองในประเทศไทย:

สัตว์ปาคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง สัตว์ปา พ.ศ. 2535 (เสือโคร่ง เสือดาว หรือ เสือดำ เสือปลา เสือไฟ เสือลายเมฆ แมวดาว หรือ แมวแกว แมวป่า หรือ เสือกระต่าย แมวป่าหัวแบน แมวลายหินอ่อน) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล<sup>้</sup>อม ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2548



Panthera pardus - เสือดาว



ความยาวหัวและลำตัว: 91 - 191 ชม. ความยาวหาง: 45 - 78 ซเม. น้ำหนัก: 45 - 65 กก.

เสือดำจะพบในบางพื้นที่ -(เห็นลายจดได**้เมื่อมีแส**ง อาทิตย์ส่อง)






Neofelis nebulosa - เสือลายเมฆ



ความยาวหัวและลำตัว: 61 - 106 ซเม. ความยาวหาง: 55 - 91 ซม. น้ำหนัก: 15 - 23 กก.





สีส้มอมแดง หรืออมเหลือง ลำตัวส่วนบนและหางมีลาย

จดดำ ใต้ลำตัวสีขาวลายจด


Credit: Chris Shepherd/TSEA Credit: WWF-Canon / Gerald S. CUBITT

#### Catopuma temmincki - เสือไฟ



หมายเหต: เสือไฟจากพม่า บางตัวอาจมีลายจดและริ้วสี เข้มตามตัว ส่วนใบหน้าและ หาง จะเหมือนกับเสือไฟ ทั่วไป

#### - ขนเรียบไม่มีลวดลาย



- แนวสันหลังบักเป็นสีเข้ม ต่ำลงมาสีจะจางลง
- หางครึ่งบนสีเข้ม - ครึ่งล่างสีจาง
- ปลายหางบักบีสีเข้ม

ความยาวหัวและลำตัว: 76 - 84 ซม. ความยาวหาง: 43 - 50 ซเม. น้ำหนัก: 12 - 15 กก.

#### Pardofelis marmorata - แมวลายหินออน



- ขนหนามาก
- ลักษณะคล้ายกับเสือลายเมฆ แต่ขนาดเล็กกว่า ขามีจดสีดำ มากกว่า

ความยาวหัวและลำตัว: 45 - 53 ซเม. ความยาวหาง: 47 - 55 ซม. น้ำหนัก: 2 - 4 กก.

#### Prionailurus planiceps - แมวปาหัวแบน



- หูเล็ก กระหม่อมยาว แบน
- ขนสีแดงเข้ม ขนส่วนบนสีน้ำตาล ลายจดสี เทากับน้ำตาลอมเหลือง

ความยาวหัวและลำตัว: 44 - 50 ชม. ความยาวหาง: 13 - 17 ซม. น้ำหนัก: 1.5 - 2.2 กก.

#### Prionailurus bengalensis - แมวดาว



viverrinus - เสือปลา แต่เล็กกว่า (ความยาวหัวและลำตัว: 72 - 78 ซม.)

คล้ายกับ Prionailurus

หมายเหต: เฉพาะประชากร ในบังคลาเทศ อินเดีย และ ไทย อยู่ในบัญชีแนบท้าย หมายเลข 1 ประชากรกล่ม อื่นอยู่ ในบัญชีแนบท้าย หมายเลข 2


ความยาวหัวและลำตัว:

ความยาวหาง: 23 - 29 ซม.









น้ำหนัก: 3 - 5 กก.

# Felidae (3)(Cats) - Parts and Derivatives commonly found in Trade

# Felidae (3) (แมวและเสือ) - อวัยวะและวัตถุดิบ ที่ได้จากแมวและเสือซึ่งพบบ่อยในการค้า

รูปแบบการค้า: กระดูก เขี้ยว เล็บ เครื่องยาแผนโบราณ (ราย ละเอียดวิธีจำแนกหนังกรุณาตรวจสอบในแมวและเสือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในบัญชีหมายเลข 1 ของไซเตส)

#### สถานภาพเชิงอนรักษ์สากล:

แมวและเสือทกชนิด (ยกเว้นแมวบ้าน) อยู่ใน บัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 และ 2 ของไชเตส

#### การค้มครองในประเทศไทย:


สัตว์ปาคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง สัตว์ปา พ.ศ. 2535 (เสือโคร่ง เสือดาว หรือ เสือดำ เสือปลา เสือไฟ เสือลายเมฆ ้แมวดาว หรือ แมวแกว แมวป่า หรือ เสือกระต่าย แมวป่าหัวแบน แมวลายหินอ่อน) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2548




ลกแมวดาว Credit: WWF-Canon / Alain COMPOST



็ตรวจสอบสถานภาพเชิงอนรักษ์ล่าสดได้ที่เว็บไซต์ www.cites.org และ www.iucnredlist.org















# **Southeast Asian Otters**

# นากในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Southeast Asian Otters

Memerang (มาเลเซีย ) ชื่ออื่น: สรีระ:

ตัวสีน้ำตาล คอสีจาง ขนแน่น ลำตัวเพรียวยาว มีพังผืดระหว่างนิ้ว

หางยาวแข็งแรง นากในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -

ความยาวหัวและลำตัว: 36 - 80 ซม., ความยาวหาง: 22.5 - 48 ซม.

#### สถานภาพเชิงอนรักษ์สากล:

นากในวงศ์ Lutrinae spp. อยู่ใน บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 ของไซเตส ยกเว<sup>้</sup>นนากใหญ่ธรรมดา *Lutra lutra* อยู่ใน บัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 ของไชเตส

#### การค้มครองในประเทศไทย:

สัตว์ปาคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง สัตว์ปา พ.ศ. 2535 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2548 (นากใหญ่จมกขน นากใหญ่ธรรมดา นากใหญ่ขนเรียบ)



\*\_\_\_\_\_ หนังและขายขณะมีชีวิตเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยง

Lutra perspicillata (นากใหญ่ขนเรียบ) Credit: Claire Beastall

รปแบบการค้า:

#### ลักษณะเด่น:

ีนากเล็กเล็บสั้น Aonvx cinerea Small-clawed Otter

#### บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 ของไชเตส IUCN: VU

ความยาวหัวและลำตัว: 36 - 55 ซน. ความยาวหาง: 25 - 35 ซเม.

- ตัวเล็ก
- · สีน้ำตาลเข**้มถึงเทาอมน้ำตา**ล
- · คอและด้านข้างคอสีจาง

สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม

- เล็บเล็กมาก ไม่ยื่นออกมาเกิน ปลายข้ำ



**ีการแพร่กระจาย:** เอเชีย - บรไน กัมพชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์

#### นากใหญ**่**จมูกขน Lutra sumatrana Hairy-nosed Otter

บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 ของไชเตส

ความยาวหัวและลำตัว: 50 - 80 ซน. ความยาวหาง: 37 - 50 ซเม.

- · ลำตัวบนรวมทั้งด**้านข**้างคอสีน้ำตาลเข้ม
- · มีลายด**่างกระจายที่คางและค**อ
- กาพตัดขวางของหางมีลักษณะกลม
- ี้ มีขนปกคลุมปลายจมูก



#### Lutra perspicillata (นากใหญ่ขนเรียบ) Credit: Annette Olsson/Cl Cambodia || ||ลักษณะคล้ายคลึงกับ**:**

#### อีเห็นน้ำ ชะมดน้ำ - Cynogale benettii

Otter Civet

หนังนาก - ขวา : Lutra sumatrana (นากใหญ่จมูกขน), ซาย:

บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 ของไซเตส

สีน้ำตาลเข้มทั้งตัว

หางสั้น

มีจดจางๆ เหนือตาทั้งสองขาง

ปากสีขวา

หนวดยาวสีขาว



ความยาวหัวและลำตัว: 57.5 - 68 ซม. ความยาวหาง: 12 - 20.5 ซม.

**การแพร่กระจาย:** บรไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย

∐ปรากภไม่แน่นอน: จีน สิงคโปร์ เวียดนาม

**การแพร**่กระ**จาย:** กัมพชา มาเลเซีย ไทย เวียดนาม

#### นากใหญ่ธรรมดา Lutra lutra Eurasian Ötter

#### บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 ของไชเตส IUCN: NT

ความยาวหัวและลำตัว: 55 - 72 ซเม. ความยาวหาง: 37.5 - 48 ซน.

· แนวขนบนจมกเป็นรปตัว "W″ .

ขนสั้นและมีขนสีอ่อนแซม ทำให้ดเหมือน



**การแพร**่กระจาย: ยุโรป และเอเชีย

์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต<sup>้</sup>: กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว พมา ไทย เวียดน<sup>์</sup>รีมี<sup>it: Sanchex & Lopez/WWF-Canon</sup>

#### นากใหญ่ขนเรียบ Lutra perspicilla Smooth-coated Otter

#### บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 ของไชเตส IUČN: VU

ความยาวหัวและลำตัว: 65 - 75 ซน. ความยาวหาง: 40 - 45 ซเม.

- ขนเรียบเป็นเงาวาว
- คอและด้านข้างคอสีจาง
- ์ แนวขนบนจมูกเป็นเส้นตรง
- ภาพตัดขวางของหางมีลักษณะค่อนข้างแบน

**การแพร**่กระจาย: บังคลาเทศ ภภาณ บรไน

กัมพชา จีน อินเดีย อินโดนีเซีย อิรัก ลาว มาเลเซีย พม่า เนปาล ปากีสถาน ไทย เวียดนาม











# Helarctos malayanus - Sun Bear

# หมีหมา หมีคน:

ชื่ออื่น: Malay weh wan (พม่า)

**การแพร่กระจาย:** บังคลาเทศ บรูไน กัมพูชา จีน อินเดีย อินโดนีเซีย (สุมาตรา และกาลิมันตัน)

ลาว มาเลเซีย ๊พม่า ไท<sup>้</sup>ย และเวียดนาม

ขนาด: ความยาวหัวและลำตัว: 100 - 140 ซ.ม. ความยาวหาง: 3 - 7 ซ.ม.

่สถานภาพเชิงอนุรักษ*์*สากล:


บัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 ของไชเตส


IUCN: มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (VU)

การคุ้มครองในประเทศไทย:

สัตว์ปาคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง สัตว์ปา พ.ศ. 2535 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2548





















# Ursus thibetanus - Asiatic Black Bear

## หมีควาย

Weh wan gyi (พม่า) ชื่ออื่น:

อัฟกานิสถาน บังคลาเทศ ภูฎาณ กัมพูชา จีน อินเดีย อิหร่าน ญี่ปุ่น เกาหลี ลาว พม่า เนปาล การแพร่กระจาย:

ปากีสถาน รัสเซีย ไต้หวัน ไ้ทีย และเวี้ยดนาม

ความยาวหัวและลำตัว: 120 - 150 ซ.ม. ความยาวหาง: 6 - 10 ซ.ม. ขนาด:

แถบอก<sup>ห</sup>

# ลักษณะเด่น: 3 - 4.5 ซ.ม. เล็บตีนหน้า .8 - 3.6 ซ.ม.



อ้งตีนหลัง

เล็บตีนหลัง\*

# สถานภาพเชิงอนุรักษ์สากล:

บัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 ของไซเตส

IUCN: มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (VU) และใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (CR) สำหรับชนิดย่อยที่พบในอิหร่านและปากีสถาน

#### การค้มครองในประเทศไทย:


สัตว์ปาคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง สัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2548



อุ้งตีนหมี ควาย

อุ้งตีนหมี

หมา







อุงตีนหมี และสวนตางๆ เพื่อทำนำมัน





การชำแหละลูกหมีเพื่อขายถุงน้ำดี











# Hemigalus derbyanus - Banded Palm Civet & Chrotogale owstoni - Owston's Civet

# อีเห็นลายเสือโคร**่ง อีเห็นลายพาด** Banded Palm Civet

ชื่ออื่น: Musang belang (มาเลเซีย)

การแพร่กระจาย: บรูไน (?) อินโดนีเซีย (กาลิมันตัน สุมาตรา) มาเลเซีย

พมา ไทย

สรีระ: ความยาวหัวและลำตัว: 45 - 56 ซม.

ความยาวหาง: 25 - 36 ซม.

#### **Owston's Civet**

ชื่ออื่น: Cây vằn (เวียดนาม )

การแพร่กระจาย: กัมพูชา (?) จีน ลาว เวียดนาม

สรีระ: ความยาวหัวและลำตัว: 51 - 63 ซม.,

ความยาวหาง: 38 - 48 ซม.

#### การคุ้มครองในประเทศไทย:<sup>๓</sup>

อีเห็นลายเสือโคร่ง อีเห็นลายพาด

สัตว์ปาคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง

สัตว์ป่า พ.ศ. 2535

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2548

#### ลักษณะเด่น:

Hemigalus derbyanus - อีเห็นลายเสือโคร่ง อีเห็นลายพาด

บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 ของไซเตส

**IUCN: VU** 

- สีของลำตัวสีขาวนวลถึงน้ำตาลทอง ใต<sup>้</sup>ท้องสีจาง
- มีแถบสีน้ำตาลไหม้ถึงดำ พาดหลังชัดเจน
- มีแถบสีเข้มแนวตั้งบนคอและหน้า
- หางสีน้ำตาลไหม้ มีลายขวางเฉพาะที่ฐาน



#### Chrotogale owstoni - Owston's Palm Civet

#### นอกบัญชีไซเตส

**IUCN: VU** 

- สีของลำตัวหลากหลายตั้งแต่ขาวอมเทาจนถึงสีขาวนวลออกน้ำตาล ใต้ท้องสีจาง
- มีแถบกว้างสีดำ พาดหลัง
- มีลายขวางบนคอและหน้า
- ลายหลากหลายแตกต่างกันไปในแต่ละตัว
- มีลายขวางที่ฐานของหาง ปลายหางสีดำ



มีจุดสีดำด้านข้างคอและขา

#### รูปแบบการค้า:

หนัง ขายขณะมีชีวิตเพื่อเป็น สัตว์เลี้ยง และสตัฟทั้งตัว



Credit: Barney Long/FFI Vietna











# Prionodon pardicolor - Spotted Linsang & Prionodon linsang - Banded Linsang

# อีเห็นลายเสือ ชะมดแปลงลายจุด

ชื่ออื่น: Cầy gấm (เวียดนาม)

การแพร่กระจาย: กัมพูชา จีน อินเดีย ลาว เวียดนาม พม่า เนปาล ไทย

เวียดนาม

สรีระ: ความยาวหัวและลำตัว: 35 - 37 ซม.

ความยาวหาง: 31 - 34 ซม.

# อีเห็นลายเมฆ ชะมดแปลงลายแถบ

ชื่ออื่น: Linsang (มาเลเซีย)

การแพร่กระจาย: บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า ไทย

สรีระ: ความยาวหัวและลำตัว: 35 - 45 ซม.

ความยาวหาง: 30 - 42 ซม.

#### การคุ้มครองในประเทศไทย:

สัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ สงวนและคุ้มครอง สัตว์ป่า พ.ศ. 2535

รูปแบบการค้า

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล<sup>้</sup>อม

ขนและสตัฟทั้งตัว เป็นของที่ระลึก

ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2548

#### ลักษณะเด่น:

Prionodon pardicolor - อีเห็นลายเสือ

บัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 ของไชเตส

#### **IUCN: LC**

- สีขาว น้ำตาลอ่อน ไปจนถึงส้มนวล
- จดสีดำประปรายทั่วด้านหลังและด้านข้าง
- เส้นสีดำที่ด้านข้างคอ
- จุดกระจายห่างๆ



#### Prionodon linsang - อีเห็นลายเมฆ

#### บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 ของไชเตส


#### **IUCN: LC**

- สีขาว ทอง หรือสีนวล
- ลายจุดสีน้ำตาลเข้ม เชื่อมต่อกันกลายเป็นแถบพาดขวางลำตัวช่วงบน 5 แถบและเป็นแนวยาวที่ด้านข้างคอ
- มีแถบสีดำและจางพาดรอบหาง 7 แถบ



จุดขนาดใหญ่เชื่อมต่อกันจน เป็นแถบสีเขมพาด 5 แถบ

แถบสีดำพาดรอบ หาง 7 แถบ













Credit: Sergio Baffoni

# Arctictis binturong - Binturong

# หมีขอ บินตุรง

ชื่ออื่น: Bear Cat (อังกฤษ)

บังคลาเทศ ภูฏาณ บรูไน กัมพูชา จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย การแพร่กระจาย:

พม่า เนปาล ฟีลิปปีนส์ ไทย เวียดนาม

สรีระ: ความยาวหัวและลำตัว: 65 - 95 ซม. ความยาวหาง: 50 - 80 ซม.

น้ำหนัก: 6 - 9 กก.

#### สถานภาพเชิงอนุรักษ์สากล๊:

บัญชีแนบท<sup>้</sup>ายหมายเลข 3 ของไซเตส โดยอินเดีย

IUCN: มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (VU)

#### การคุ้มครองในประเทศไทย:

สัตว์ปาคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ สงวนและคุ้มครอง สัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล<sup>้</sup>อม ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2548



Credit: David Lawson/WWF-Canon

#### ลักษณะเด่น:

- ขนยาวและหยาบสีดำ อาจมีขนสีขาวหรือแดงแซม
- ขนสีอ่อนพบที่ศีรษะ ทำให้ศีรษะสีอ่อนกว่าลำตัว



หางยาว ขนเป็นพวง หางมวนงอ (สามารถเกี่ยวจับได้) โดยเฉพาะใกล้ฐาน



หกลม ขอบสีขาว และมีขนยาวที่ปลายห

#### รปแบบการค้า:

หนังและขายขณะมีชีวิตเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยง



Credit: TRAFFIC Southeast Asia











# Rhinocerotidae spp. - Rhinoceros spp.

#### แรด

ชื่ออื่น: Badak (มาเลเซีย)

#### พบในเอเชีย 3 ชนิด:

Dicerorhinus sumatrensis - กระซู่: อินโดนีเซีย (กาลิมันตัน สุมาตรา) มาเลเซีย และไทย Rhinoceros sondaicus - แรดชวา: อินโดนีเซีย (ชวา) มาเลเซีย (สูญพันธุ์?) และเวียดนาม Rhinoceros unicornis - แรดอินเดีย/แรดนอเดียว: ภภาน อินเดีย และเนปาล

พบในแอฟริกา 2 ชนิด:

Diceros bicornis - แรดดำ และ Ceratotherium simum - แรดขาว

ขนาด: ความสูงถึงไหล่: 100 - 180 ซม. น้ำหนัก: 0.6 - 2.7 ตัน

#### สถานภาพเชิงอนรักษ์สากล:<sup>"</sup>

บัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 ของไชเตส ประชากรแรดขาวจากแอฟริกาใต และสวาชิแลนด์ อยู่ใน บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 ของไชเดส

IUCN: Dicerorhinus sumatrensis, Rhinoceros sondaicus, Diceros bicornis: ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (CR), Rhinoceros unicornis: มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (VU), Ceratotherium simum: อาจมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ในอนาคต (NT) (ประชากรทางตอนเหนือของ C. simum: ใกล้สุญพันธุ์อย่างยิ่ง - CR)

การคุ้มครองในประเทศไทย:

สัตว์ปาคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง สัตว์ป่า พ.ศ. 2535 (Rhinoceros sondaicus, Dicerorhinus sumatrensis) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 23


ธันวาคม 2548



Dicerorhinus sumatrensis

#### ลักษณะเด่น:

เมื่อพาทั้งตัวสามารถจำแนกได้ไม่ผิดพลาด



Dicerorhinus sumatrensis -

ความสูงถึงไหล่: 100 - 150 ซม. น้ำหนัก: 0.6 - 0.95 ตัน

เขาคู่: เขาหน้ายาว 25 - 79 ซม. เขาที่สองมักยาวน้อยกว่า 10 ซม.

Rhinoceros sondaicus -แรดชวา

ความสูงถึงไหล่: 150 - 170 ซม. น้ำหนัก: 0.9 - 2.3 ตัน

เขาเดี่ยว: ยาว 25 ซม.ในเพศผู้ เพศเมียเขาเล็กกว่าหรือไม่มีเลย

Rhinoceros unicornis -Indian/One-horned Rhinoceros ความสงถึงไหล่: 175 - 200 ชม.

น้ำหนัก: 1.8 - 2.7 ตัน เขาเดี่ยว: 20 - 61 ซม. รปแบบการค้า: นอ หนัง และของที่ระลึก

หมายเหตุ: ผู้ค้านิยมนอแรดที่มีหนังติดอยู่เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นของแท้

นอแรกเกิดจากเคราติน (เหมือนกับผมและเล็บมือ)

หนังแรดอาจจะมีความหนาถึง 5 ซม.

คำบรรยายนอแรด บนผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ

นอแรด

อักษรจีน:

军牛垫铁



ดีน Ceratotherium simum Credit: Environment Canada



นอ Ceratotherium simum simum สังเกตเขาส่วนที่สึกกร่อนตามธรรมชาติ Credit: WWF-Canon / Martin HARVEY



นอแรดที่ยึดไว้เป็นของกลาง Credit: WWE-Capon / Mark ATKINSON



นอแรดใช้ทำด้ามกริชในเยเมน Credit: WWF-Canon / Esmond Bradley MARTIN













# Manis spp. - Pangolin spp.

# นิ่ม หรือลิ่น

ชื่ออื่น: Thing kway jut (พม่า) Tê Tê (เวียดนาม)

**การแพร**่กระจาย: แอฟริกา และเอเชีย

ขนาด: ความยาวหัวและลำตัว: 425 - 550 ม.ม.

ความยาวหาง: 160 - 470 ม.ม. น้ำหนัก: 5-7 ก.ก.

#### สถานภาพเชิงอนุรักษ์สากล: ฉ

#### บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 ของไชเตส :

โควต**้าส**่งออกเป็นศูนย์: <u>ไม่</u>อนุญาตให้มีการค้าตัวนิ่มที่จับ มาจากป่าในเชิงการค**้**าระหว่างประเทศ

#### IUCN: มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (EN)

#### การคุ้มครองในประเทศไทย:

สัตว์ปาคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง สัตว์ปา พ.ศ. 2535 (*Manis javanica* and *M. pentadactyla*) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2548




Credit: Chris Shepherd/TSEA

#### <u>ลักษณะเด่น:</u>



มีเกล็ดซ้อนทับกันทั่วตัวด<sup>้</sup>านบน



**ลักษณะคล้ายคลึงกับ:** ไม่มีสัตว์กลุ่มอื่นเหมือนเลย นิ่มมีทั้งสิ้น 8 ชนิด: พบในแอฟริกา 4 ชนิด อีก 1 ชนิดพันธุ์พบในเอเชียใต<sup>้</sup>

เป็นสัตวเฉพาะถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ 3 ชนิด

ข้อสังเกต: การจำแนกระหว่าง Manis javanica และ Manis culionensis ทำได้ยาก

Manis pentadactyla (ลิ่นพันธุ์จีน)

Manis javanica (ลิ่นพันธุ์ชวา) และ Manis culionensis\* (ลิ่นพันธุ์ปาลาวัน)

- เล็บตีนหลังยาวไม่ถึงสองเท่าของเล็บตีนหน้า
- มีเกล็ดราว 20 เกล็ดหรือน้อยกว่าตลอดหาง
- เล็บตีนหลังยาวกว่าเล็บตีนหน้าเกินสองเท่ามีเกล็ดมากกว่า 20 เกล็ดตลอดหาง

การแพร่กระจาย: กัมพูชา จีน ฮ่องกง อินเดีย ลาว พม่า เนปาล ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม การแพร่กระจาย: บรูใน-ดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พมา สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม

\*การแพร่กระจาย: หม่เกาะปาลาวัน หม่เกาะคเลียน และฟิลิปปินส์

# รูปแบบการค้า: ขนส่งสัตว์มีชีวิต หรือแช่แข็งทั้งตัว เกล็ดผลิตภัณฑ์ เครื่องหนัง ตัวอ่อน เนื้อและยา



นิ่ม หรือลิ่นขณะขนส่ง Credit: Royal Thai Police





ถอนเกล็ดออกจากหนัง



ตัวอ่อนของนิ่ม หรือลิ่น



เกล็ดนิ่ม หรือลิ่น



กระเป๋าหนังนิ่ม หรือลิ่น













# **Primates - Apes and Monkeys**

# ลิงในอันดับวานร (ไพรเมต)

สถานภาพเชิงอนุรักษ์สากล:

ทั้งหมดอย่างน้อยอยู่ใน บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 ของไชเตส สำหรับลิงในอันดับวานรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใน บัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 ของไชเตส กรุณาดูข้อมูลด้านล่าง

ลักษณะเด่น:

ลิงในอันดับวานร ทกชนิดจะมี:

- ตาทั้งคู่หันไปด้านหน้า
- จมูกสั้น หน้าแบน
- เล็บกดไม่แหลมคม
- มีสี่ขา



Nycticebus coucang (นางอายพันธ์ซนดา)



Trachypithecus cristatus (ค่างหงอก)



Macaca nemestrina (ลิงกัง) Credit: WWF Malaysia / Chew Yen Fook



Nomascus gabriellae (Buff-cheeked Gibbon)



Pongo abelii ลูกลิง (ลิงอุรังอุตังพันธุ์สุมาตรา)

ชะนีและอรังอตั้งไม่มีหาง

#### ลิงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อยู่ในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 1:

Nycticebus spp. (นางอายทุกชนิด)
IUCN: แตกต่างกันไป สูงสุดคือใกลสูญพันธุ์ (EN)
การแพร่กระจาย: บังกลาเทศ บรูไน กัมพูชา จีน อินเดีย อินโดนีเชีย ลาว
มาเลเซีย พบ่า ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดบาบ

Presbytis potenziani (ค่างพันธุ์เมนทาวี) IUCN: ใกลสญพันธ์ (EN)

การแพร่กระจาย: อินโดนีเซีย (หมู่เกาะเมนทาวี)

Simias concolor (Pig-tailed Langur) IUCN: ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (CR) การแพร่กระจาย: อินโดนีเชีย (หมูเกาะเมนทาวี)

Nasalis larvatus (ลิงจมูกยาว) IUCN: ใกล้สูญพันธุ์ (EN)

การแพร่กระจาย: บรู่ใน อิ่นโดนีเซีย (กลิมันตัน) มาเลเซีย (ชาบาห์ และซาราวัก)

Rhinopithecus spp. (ค่างจมูกสั้นทุกชนิด) IUCN: แตกต่างกันไป สูงสุดคือใกล่สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (CR) การแพร่กระจาย: จีน และเวียดนาม


Pygathrix spp. (ค่างห้าสีทุกชนิด)
IUCN: แตกต่างกันไป สูงสุดคือใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (CR)
การแพร่กระจาย: กัมพชา ลาว และเวียดนาม

Hylobatidae spp. (ชะนีทุกชนิดรวมทั้งเชียมัง)
IUCN: แตกต่างกันไป สูงสุดคือใกล้สูญพันธุ์อยางยิ่ง (CR)
การแพรกระจาย: บังกลาเทศ บรูไน กัมพูชา จีน อินเดีย อินโดนีเชีย ลาว
มาเลเซีย พมา ไทย และเวียดนาม

Hominidae spp. (ลิงใหญ่ทุกชนิด) - รวมถึงลิงอุรังอุดัง Pongo spp. (ลิงอุรังอุดังสุมาตรา และบอร์เนียว) IUCN: แตกต่างกันไป สูงสุดคือใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (CR) การแพร่กระจาย: อินโดนีเชีย (สุมาตรา และกลิมันตัน) มาเลเชีย (ชาบาห์ และชาราวัก). รูปแบบการค้า: สัตว์มีชีวิต เนื้อ กะโหลก ส่วนต่างๆ เพื่อนำไปทำ ยาแผนโบราณ



Nasalis larvatus (ลิงจมูกยาว) Credit: WWF - Canon / Alain COMPOST



Pygathrix nemaeus
(Red-shanked Douc Langur)
Credit: WWF - Canon / Martin HARVEY



ลิงอุรังอุตังที่สวนสาธารณะ Credit: Chris Shepherd/TSEA



กะโหลกลิงที่วางขาย











# Nycticebus spp. - Loris spp.

#### นางอาย

ชื่ออื่น: Kongkang (มาเลเซีย), Culi (เวียดนาม)

บังคลาเทศ บรใน กัมพชา จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ ไทย การแพร่กระจาย:

และเวียดนาม

ความยาวหัวและลำตัว: 21 - 38 ซ.ม. ความยาวหาง: มากกว่า 2.5 ซ.ม. ขนาด:

#### ิสถานภาพเชิงอนุรักษ์สากล: <sup>°</sup>

บัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 ของไชเตส

IUCN: แตกต่างกันไป สงสดคือใกล้สญพันธ์ (EN)

#### การค้มครองในประเทศไทย:

สัตว์ปาคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง สัตว์ป่า พ.ศ. 2535

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2548



Credit: WWFM / M. Kavanagh

#### ลักษณะสำคัญทางกายภาพ:



ตาโต

มีวงดำรอบดวงตา

จมกชื้น

หูเล็ก

ตีนมีนิ้ว 5 นิ้ว

หางสั้นหรือมองไม่เห็น



Credit: WWFM / MPS

#### รปแบบการค้า: สัตว์มีชีวิต หนัง หรือเพื่อเป็นอาหาร หรือยาแผนโบราณ



นางอายสำหรับทำยาแผนโบราณ



นางอายสำหรับทำยาแผนโบราณ



นางอายในตลาด

หนังนางอาย



นางอายในตลาด Credit: Chris Shepherd/TSEA

#### ลักษณะคล้ายคลึงกับ:

#### Tarsius spp. **Tarsier**

บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 ของไชเตส

ความยาวหัวและลำตัว: 9.5 - 15 ซ.ม. ความยาวหาง: มากกว่า 20 - 24 ซ.ม. การแพร่กระจาย: บรูไนดารสซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซี่ย และฟิลิปปินส์



ตาโตมาก

หใหญ่มาก

ตีนมีนิ้ว 5 นิ้ว

หางยาวกว่าลำตัวมาก













# Macaca fascicularis - Long-tailed Macaque

#### ลิงแสม

ชื่ออื่น: Kera (มาเลเซีย), Mieo tangar (พมา)

บังคลาเทศ บรูใน กัมพูชา ฮองกง อินเดีย อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย มอริเชียส พมา การแพรกระจาย:

ปาลัว ฟีลิปปีน<sup>ู้</sup>ส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม

ขนาด: ความยาวหัวและลำตัว: 38 - 65 ซม. ความยาวหาง: 40 - 55 ซม.

น้ำหนักตัวเต็มวัย: ตัวผู้: 4.7 - 8.3 กก. ตัวเมีย: 2.5 - 5.7 กก.

สถานภาพเชิงอนรักษ**์สาก**ล: ็ บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 ของไชเตส

IUCN: ไม่มีความเสี่ยงต่อการสญพันธ์ (LC)

การค้มครองในประเทศไทย:

สัตว์ปาคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง

สัตว์ป่า พ.ศ. 2535

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่

23 รับวาคบ 2548



#### ลักษณะเดน:



ขนบนกระหม่อมงอกย้อนทาง (ทำให้เห็นลักษณะคล้ายหงอน)

หน<sup>้</sup>าสืออกชมพ

หางยาว

ตัวผู้: มีหนวดที่ปาก มีเคราข้างแก้ม

ตัวเบีย: บีเคราที่ดาง ทารก: แรกเกิดมีสีดำ

ขน: มีสีหลากหลายตั้งแต่เทาถึงน้ำตาลอมแดง

ใต้ลำตัวสีออนกวาขนหลัง





รปแบบการค้า: ขณะมีชีวิตเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยง มักขายตอนเป็นลูก และขายเนื้อเป็นอาหาร

ทั้งตัวเต็มวัยและลก ลิงอาจพบขนส่งโดย ใส่ไว้ในตะกร้า

ลิงแสมแรกเกิด

**ลักษณะคล้ายคลึงกับ:** ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต<sup>้</sup> - ลิงสีน้ำตาลชนิดอื่นๆ

Macaca arctoides - ลิงเสน



ความยาวหาง: 1.4 - 6.9 ซม.

หาง: แทบไม่มีขน

หน้า: ไม่มีขน หน้าดางเป็น สีแดงเข้มกับดำ

ทารก: แรกเกิดสีขาว

น้ำหนักตัวโตเต็มวัย:

ตัวผู้: 4.7 - 8.3 กก. ตัวเมีย: 2.5 - 5.7 กก.



Crodit: Tilo Nadlor

Macaca assamensis - ลิงอ้ายเงี๊ยะ หรือลิงอัสสัม หรือลิงภเขา

ความยาวหาง: 20 - 29 ซม.

ขนสีหลากหลายตั้งแต่น้ำตาล อมเหลืองถึงน้ำตาลเข้ม

หน้า: ไม่มีขนหรือมีขนน้อย ตัวเต็มวัย หน้าสีแดงอ่อน

ปลายหลัง: สีออกเทา

น้ำหูนักตัวโตเต็มวัย: ตัวผู้: 7.9 - 15 กก. ตัวเมีย: 4.9 - 8.6 กก.

#### Macaca mulatta - ลิงวอก



ความยาวหาง:19 - 30 ซม.

ขนสีน้ำตาล

หบ้าสีแดงอ่อบ ตะโพกแดง

น้ำหนักตัวโตเต็มวัย: ตัวผู้: 5.6 - 10.9 กก. ตัวเมีย: 4.4 - 10.9 กก.

#### Macaca nemestrina\* และ Macaca leonina





ความยาวหาง: 13 - 24.5 ชม.

หาง: มักขดม้วน ขนาเวงหรือไม**่มีขนเ**ลย

ขน: ด้านบนสีน้ำตาล ด้านลางขาว

หัว: สีน้ำตาลเข้น

น้ำหนักตัวโตเต็มวัย: ตัวผู้: 6.2 - 14.5 กก. ตัวเมีย: 4.7 - 10.9 กก.











# Elephas maximus & Loxodonta africana - Elephant

# ชาง

ชื่ออื่น: Gajah (มาเลเซีย), Voi (เวียดนาม)

การแพร่กระจาย:

บังคลาเทศ ภภาณ บรไน กัมพชา จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า เนปาล ศรีลังกา ไทย ข้างเอเชีย

และเวียดนาม (Elephas maximus):

ช้างแอฟริกา แองโกลา เบนิน บอตสวานา บูร์กินาฟาโซ แคเมอรูน แอฟริกากลาง ชาด คองโก

(Loxodonta africana):สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโัก โกตดิวัวร์ อิเควทอเรียลกินี เอริเทรีย เอธิโอเบีย กาบอง กานา กินี

้กินีบิสเซา เคนยา ไลบีเรีย มาลาวี มาลี โมซัมบิก นามิเบีย ไนเจอร์ ไนจีเรีย รวันดา เซเนกัล เชียร์ราลีโอน โซมาเลีย แอฟริกาใต ้ ซดาน แทนชาเนีย โตโก ยกันดา และซิมบับเว

ความสงถึงใหล่: สงสด 4 เมตร น้ำหนัก: สงสด 10 ตัน ขนาด:

**ลักษณะคล้ายคลึงกับ:** ไม่เหมือนสัตว์ชนิดใดที่ยังไม่สญพันธ์ไปจากโลก

งาช้างหรืองาแกะสลัก:

งาแมมมอธ (สุณพันธ์ 10,000 ปีมาแล้ว) งาวาฬ Narwal งาหรือพันวอลรัส ฟันปลาวาฬ, วัสดธรรมชาติ:

เขี้ยวหมปาแอฟริกา ฟื้นฮิปโปโปเตมัส กระดก โหนกนกชนหิน เมล็ดของปาล์ม Tagua

สิ่งที่นำมาทำขึ้น: เรฑิน เคฑิน

การจำแนกงาช้างจากวัสดอื่น:

ในแสงอัลตราไวโอเลต: - งาแมมมอธ และงาช้างจะเป็นสีขาว/ฟ้าเรืองแสง

- งาแบบบอธอาจจะบีตำหนิสีน้ำตาลหรือเขียวอบฟ้า

- งาข้างจะไม่มีลักษณะดังกล่าว

#### เส้นลายงา (Schreger Line):

้เส้นลายตามธรรมชาติพบเฉพาะในงาช้างแท้หรืองาแมมมอธที่นำมาตัดขวางและขัดเรียบเท่านั้น

วิธีแยกความแตกต่างระหว่างงาช้างและแมมมอธให้ดูที่ขอบนอกของงา

1. ใช้เครื่องถ่ายเอกสารถ่ายสำเนาภาพงาช้าง

2 ใช้แผ่นใสวางคั่นระหว่างงากับกระจกเครื่อง ถ่ายเอกสาร ถ่ายสำเนาโดยขยายภาพขึ้น

่ 3 ขีดเส้นตามเส้นในภาพสำเนา ลากเส้นต่อให้ ยาวพอสำหรับอ่านค่ามมได้ ทำอย่างเดียวกันหลายๆ จด

4. วัดมมที่ได้และหาค่าเฉลี่ย





งาช้าง งาช้างแมมมอธ

ี่สถานภาพเชิงอนุรักษ**์ระดับนานาชาติ**:

บัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 ของไชเตส

Loxodonta africana ประชากรในบอตสวานา นามิเบีย แอฟริกาใต้ และซิมบับเว อยู่ในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 2\*

#### **IUCN:**

Elephas maximus - ใกล้สูญพันธุ์ EN

Loxodonta africana - อาจมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ในอนาคต NT

การค้มครองในประเทศไทย:

สัตว์ปาคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง สัตว์ปุ่า พ.ศ. 2535 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2548

รปแบบการค้า: สัตว์มีชีวิต (เพื่อนำมาใช้ในการเดินปาและการท่องเที่ยว) งาหรือชิ้นงาแปรรป ฟัน กะโหลก และกระดกส่วนอื่น ขน หนัง



ขนหางช้าง แหวนทำด้วยขนหางข้าง



Credit: Chris Shepherd/TSEA



หนังช้าง Credit: Chris Shepherd/TSEA







งาช้างแกะสลัก Credit: Chris Shenherd/TSEA



ของที่ระลึกแกะสลัก

จากงาช้าง





<sup>&</sup>lt;sup>∝</sup>ตรวจสอบสถานภาพเชิงอนุรักษ์ล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ www.cites.org และ www.iucnredlist.org











พถษภาคม 2551

# Dendrocygna javanica - Lesser Whistling Duck and Dendrocygna arcuata - Wandering Whistling Duck

## เปิดแดง Lesser Whistling Duck

ชื่ออื่น: Itek Belibis, Belibis Kembang (มาเลเซีย)

การแพร่กระจาย: บรูไน กัมพูชา จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ลาว มาเลเซีย พม่า เบปาล ปากีสถาน สิงคโปร์ ศรีลังภา ไต้หวับ ไทย เวียดบาม

สรีระ: ความยาว 38 - 41ชม.

# **Wandering Whistling Duck**

ชื่ออื่น :

**การแพร่กระจาย:** ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย นิวบริเทน ปาปัวนิวกินี

ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์

สรีระ: ความยาว 40 - 45 ซม.


#### สถานภาพเชิงอนรักษ**์**สากล: <sup>๓</sup>


นอกบัญชีไซเตส

IUCN: Dendrocygna javanica: LC Dendrocygna arcuata: LC

#### การคุ้มครองในประเทศไทย

เปิดแดง - สัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535

















# Leptoptilos spp. - Adjutant Storks

#### นกตะกราม Leptioptilos dubius

ชื่ออื่น: Gio đãy lớn (เวียดนาม)

การแพร่กระจาย: กัมพูชา อินเดีย

ไม่ประจำถิ่น: บังคลาเทศ เนปาล ไทย เวียดนาม

คาดว่าสูญพันธุ์: ลาว พม่า

สรีระ: ความยาว 145 - 150 ซม.

#### นกตะกรุม Leptioptilos javanicus

ชื่ออื่น: Botak Kecil (มาเลเซีย), Gio đấy giava (เวียดนาม)

**การแพร**่กระ**จาย:** บังคลาเทศ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย

พม่า เนปาล ศรีลังกา ไทย เวียดนาม

สรีระ: ความยาว 122.5 - 129 ซม.

สถานภาพเชิงอนุรักษ*์*สากล: <sup>∝</sup>


#### นอกบัญชีไซเตส


IUCN: นกตะกราม ใกล้สูญพันธุ์ (EN) นกตะกรุม มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (VU)


การคุ้มครองในประเทศไทย:

สัตวุ์ปุ่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง

สัตว์ป่า พ.ศ. 2535

















<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> ตรวจสอบสถานภาพเชิงอนุรักษ์ล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ www.cites.org www.iucnredlist.org และ www.birdlife.org/datazone/search/species\_search.html

# **Bucerotidformes - Hornbills**

## นกเงือก

ชื่ออื่น:

**การแพร**่กระจาย: แอฟริกา และเอเชีย

ขนาด: ความยาว: 320 ซม.

#### สถานภาพเชิงอนุรักษ์สากล:

มีนกเงือก 4 ชนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต<sup>้</sup>อยู่ใน <mark>บัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 ของไชเตส</mark> นอกนั้นอยู่ใน บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2


#### การคุ้มครองในประเทศไทย:

สัตว์ปาคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง สัตว์ปา พ.ศ. 2535

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล<sup>้</sup>อม ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2548 Rhyticeros undulatus (นกเงือกกรามข้าง) <sup>Credit:</sup> Claire Beastall (ขีดที่ถงคอมักเห็นแค่บางส่วน)










Ramphastos toco (Toco toucan) <mark>บัญชีแนบท้ายหมายเลข 1</mark> Credit: WWF-Canon / Michel GUNTHER



#### รูปแบบการค้า:

์ โหนก และขายขณะมีชีวิตเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยง



Anthacroceros albirostris (นกแก๊ก) Credit: TRAFFIC Southeast Asia



Buceros bicornis (นกกก) โหนกหัวนกกกเพื่อขาย



Buceros bicornis (นกกก) โหนกหัวนกกก Credit: Chris Shepherd/TRAFFIC SEA









# Copsychus malabaricus - White-rumped Shama

## นกกางเขนดง นกบินหลาดง

ชื่ออื่น: นกบินหลาดง นกบินหลาควน นกจิงปุ๊ย Murai Batu, Murai Hutan (มาเลเชีย)

บังคลาเทศ ภูฏาน บรูไน กัมพูชา จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า การแพร่กระจาย: เนปาล สิงคโป๊ร์ ศรีลังกา ไทย เวียดนาม (นำเข้าฮาวาย สหรัฐอเมริกา)

ความยาว: สงสด 25 ซม. สรีระ:

สถานภาพเชิงอนรักษ**์**สากล: ื

นอกบัญชีไซเตส

IUCN: ไม่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (LC)


การค้มครองในประเทศไทย

สัตว์ปาคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปา พ.ศ. 2535



#### ลักษณะเด่น:

- ก้นสีขาว
- ตัวผู้: สีดำเป็นมัน ท้องสีน้ำตาลอ่อน
- ตัวเมีย: สีเทา ท้องสีน้ำตาลอ่อน



นกกางเขนดงตัวเมีย Credit: Suppalak Klabdee



นกกางเขนดงตัวผ<sup>้</sup> Credit: Lee Kip Yang



นกกางเขนดงตัวผู้ (ซาบาห์ มาเลเซีย) Credit: Suppalak Klabdee


ลักษณะคล้ายคลึงกับ: Copsychus saularis -นกกางเขนบ้าน Magpie Robin

IUCN: LC; นอกบัญชีไชเตส

สีดำเป็นมัน ท้องและใต้หางสีขาว แถบสีขาวที่ปีก

ความยาว: สูงสุด 21.6 ซม.

nารแพร่กระจาย: บังคลาเทศ ภูฏาน บรูไน กัมพูชา จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ศรีลังกา ไทย เวียดนาม



IUCN: NT: นอกบัญชีไชเตส

ความยาว: สงสด 21 - 22.5 ซม การแพร่กระจาย: บรูใน อินโดนีเซีย มาเลเซี่ย ไทย



Copsychus luzoniensis **White-browed Shama** IUCN: LC; นอกบัญชีไชเตส

ไม่ค่อยพบในการค้า


ความยาว: สงสด 18 ซม. การแพร่กระจาย: ฟิลิปปินส์

#### รูปแบบการค้า:

ขายขณะมีชีวิตเพื่อเป็นนกให้เสียงร้อง หมายเหต: ตัวเมียไม่ให้เสียงร้อง ไม่ค่อยพบในการค้า



ผู้ลักลอบถูกจับในสหรัฐอเมริกา พร<sup>้</sup>อมนกให<sup>้</sup>เสียงร<sup>้</sup>อง รวมทั้งนกกางเขนดง Credit: US Fish & Wildlife Service













# Falconiformes - Birds of Prey

#### นกล่าเหยื่อ เหยี่ยวปึกแตก นกอินทรี อีแร้ง เหยี่ยวปึกแหลม และเหยี่ยวขนาดเล็กอื่นๆ ชื่ออื่น:

ทั่วโลก การแพร่กระจาย:

ความสง: 14 - 118 ซ.ม. ช่วงปีก: 26 - 300 ซ.ม. น้ำหนัก: 35 กรัม - 14 กก. ขนาด:

#### ลักษณะเด่น:

- ยืนตัวตั้งตรง
- มีกรงเล็บแหลมคม
- ปากง้ม
- สีหม่นไม่สดใส



ปากง้ม

มีกรงเล็บ แหลมคม



Spizaetus bartelsi - เหยี่ยวหงอนสีน้ำตาลพันธุ์ชวา (ก่อนเต็มวัย)

#### สถานภาพเชิงอนุรักษ**์สาก**ล: ็

ทกชนิดอย**่ใน บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 ของไชเตส**\* ยกเว<sup>้</sup>น 15 ชนิดที่อยู่ใน บัญชี้แนบท้ายหมายเลข 1 ของไชเตส - 5 ชนิดในจ้านวนนี้พบในเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้:

Aguila heliaca - นกอินทรีหัวไหล่ขาว (Eastern Imperial Eagle)

Haliaeetus albicilla - นกอินทรีย์หางขาว (White-tailed Eagle)

Pithecophaga jefferyi - นกอินทรียักษ์ฟิลิปปินส์ (Philippine Eagle) Falco jugger - เหยี่ยวแล็กกา (Laggar Falcon)

Falco peregrinus - เหยี่ยวเพเรกริน (Peregrine Falcon)

\* อีแร้งโลกใหม่: อยู่ในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 3 ของไซเตสหนึ่งชนิด ไม่มีสถานภาพ 4 ชนิด

IUCN: สถานภาพแตกต่างกันไป - สงสดคือใกล้สณพันธ์อย่างยิ่ง (CR)



Falco pereginus - เหยี่ยวเพเรกริน Credit: WWF-Canon / John S. MITCHELL

#### การค้มครองในประเทศไทย:

สัตว์ปาคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง สัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2548

รปแบบการค้า: ขายขณะมีชีวิต ขายอวัยวะเพื่อทำยาแผนโบราณ/ใช้ในพิธีกรรม



Elanus caeruleus - Black-winged Kite เหยี่ยวขาวที่วางขายในตลาด



Aviceda leuphotes -Black Baza เหยี่ยวกิ้งก่าสีดำ ที่วางขายในตลาด Credit: Chris Shepherd/TSEA



นกล่าเหยื่อที่วางขายในตลาด











# Pycnonotus zeylanicus - Straw-headed Bulbul

# นกปรอดแม่ทะ หรือนกปรอดแม่พะ

ชื่ออื่น: Cangkurawa (อินโดนีเซีย), Barau-barau (ชาบาห์ มาเลเซีย)

การแพร่กระจาย: บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า สิงคโปร์ และไทย

ขนาด: ความสูง: 30 ซ.ม. - เป็นนกปรอดที่ใหญ่ที่สุด

# ลักษณะเด่น: - หัวสีเหลืองฟางข้าว แถบดำคาดผ่านตา ขนข้างแก้มสีดำ คอขาว Credit Mervin Quah

ลักษณะคล้ายคลึงกับ: นกปรอดชนิดอื่นๆ

็นกปรอดแม่ทะเป็นนกปรอดที่ใหญ่ที่สุด ที่มีหัวด้านบน และแก้มสีเหลืองแกมส์ม ตัวด้านบนและอกสีน้ำตาลมีขีดสีขาวเล็กๆ กระจาย

#### สถานภาพเชิงอนุรักษ์สากล: <sup>®</sup>

บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 ของไชเตส

IUCN: มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (VU)

#### การคุ้มครองในประเทศไทย:

สัตว์ปาคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง สัตว์ปา พ.ศ. 2535 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2548



Credit: Mervin Qual

#### รูปแบบการค้า: ขายขณะยังมีชีวิตเพื่อเป็นนกให้เสียงร<sup>้</sup>อง และสัตว<sup>์</sup>เลี้ยง













# Gracula religiosa - Hill Mynah


## นกขุนทอง

ชื่ออื่น: Tiong Emas (มาเลเซีย)

การแพร่กระจาย: ภูฏาณ บรูไน กัมพูชา จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า เนปาล ฟีลิปปินส์ สิงคโปร์

ศรีลังกา ไทย และเวียดนาม

ขนาด: ความยาว 30 ซ.ม. น้ำหนัก 400 กรัม





#### สถานภาพเชิงอนุรักษ์สากล**:** บัญชีแนบท**้ายหมายเลข 2 ของไซเต**ส

IUCN: ไม่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (LC)

#### การคุ้มครองในประเทศไทย:

สัตว์ปาคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง สัตว์ปา พ.ศ. 2535 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2548



Credit: WWF-Malaysia / Oon Swee Hock

#### รูปแบบการค้า: ขายขณะมีชีวิตเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยง



นกขุนทองในตลาด Credit: Chris Shepherd/TSEA



นกขุนทองในตลาด Credit: Chris Shepherd/TSEA














# Psittaciformes spp. - Parrots

# นกแก้ว



#### สถานภาพเชิงอนรักษ์สากล: ็

#### นกแก้วทุกชนิด อยู่ในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 หรือ 2 ของไซเตส

ยกเว้นนก 4 ชนิดด้านล่างที่ไม่ได้คุ้มครอง: Agapornis roseicollis - Peach-faced Lovebird

Melopsittacus undulatus - Budgerigar Nymphicus hollandicus - Cockatiel

Psittacula krameri - Ring-necked Parakeet

#### การคุ้มครองในประเทศไทย:

นกต่อไปนี้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535:

Loriculus galgulus - นกหกเล็กปากดำ Loriculus vernalis - นกหกเล็กปากแดง

Psittacula alexandri - นกแขกเต้า
Psittacula eupatria - นกแก้วโม่ง
Psittacula finschii - นกกะลิง
Psittacula roseata - นกแก้วหัวแพร
Psittinus cyanurus - นกหกใหญ่


การส่งออกชนิดพันธุ์ Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus และ Nymphicus hollandicus จำเป็นต้องมีใบอนุญาตส่งออก



Female Eclectus Parrot Credit: Chris Shepherd/TSEA

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2548

ร**ูปแบบการค้า:** ขายขณะมีชีวิต และไข่ (พกไว้ในตัวคนขนส่ง) เพื่อเป็นสัตว์เลี้ยง




# Nymphicus hollandicus Cockatiel

การแพร่กระจาย: ออสเตรเลีย ความยาว: 29 - 33 ซ.ม.

#### | রী:

- หงอนทางด้านบนโค้ง (1)
- หน้ามีสีเหลือง (2),
- มีรอยแต้มสีส้ม (3)
- ปีกสีขาวเป็นประกาย (4) ลักษณะเฉพาะ:
- ปีกและหางแหลม
- \_ ที่แพงกเกตเผม

ข้อสังเกต: นกเลี้ยงอาจมี สีหลากหลาย



#### Psittacula krameri Ring-necked Parakeet

การแพร่กระจาย: แอฟริกา และเอเชีย ความยาว: 40 ซ.ม.

- สีตามธรรมชาติ:
- ตัวสีเขียวอ่อน (1)
- หัวเขียว (2)
- คางสีดำ แถบคอสีดำ-ชมพู
- หัวสีม่วงอ่อน(เฉพาะตัวผฺ้เต็้มวัย) (3)
- หางสีฟ้าปลายหางสีเหลือง (4)
- ลักษณะเฉพาะ: - หางแหลม

TRAFFIC

- ไบ่มีแต้บสีแดงเข้บอบน้ำตาลที่ไหล่

ข้อสังเกต: นกเลี้ยงอาจมี **สีหลากหลาย** 

- น้ำเงิน หรือเหลือง
- ลักษณะคล้ายนกแก้วที่เป็นสัตว์คุ้มครองมาก - หากไม่แน่ใจควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ





<sup>\*</sup> Image Source: Environment Canada

<sup>&</sup>quot; ตรวจสอบสถานภาพเชิงอนุรักษ์ล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ www.cites.org www.iucnredlist.org และ www.birdlife.org/datazone/search/species search.html

## Cacatua spp. - White Cockatoos

#### **White Cockatoos**

ชื่ออื่น: Kakatua (อินโดนีเซีย)

การแพร่กระจาย: ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกีนี ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และหมู่เกาะโซโลมอน


ขนาด: สีขาว หรือสีชมพูอมล้มจางๆ เป็นนกขนาดกลาง - ใหญ่ หางสั้นทรงสี่เหลี่ยม ปีกยาว ปลายปีกโค้งมน ทั้งสองเพศลักษณะเหมือนกัน สูงได้ถึง 51 ซ.ม.

#### สถานภาพเชิงอนุรักษ์สากล:

บัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 ของไชเตส - 4 ชนิดพันธุ์ บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 - ทั้งหมดที่เหลือ

#### การคุ้มครองในประเทศไทย:

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2548



# รูปแบบการค้า: ขายขณะมีชีวิต และไข่ (พกไว้ใน ตัวคนขนส่ง) เพื่อเป็นสัตว์เลี้ยง



Tanimbar Cockatoos ในตลาด



Yellow-crested Cockatoo Credit: Chris Shepherd/TSEA



Salmon-crested Cockatoo Credit: Chris Shepherd/TSEA



Philippine Cockatoo Credit: Chris Shepherd/TSEA









## Probosciger aterrimus - Palm Cockatoo

## **Palm Cockatoo**

ชื่ออื่น: Kakatua raja, Kakatua hitam (Indonesia)

ออสเตรเลีย ปาปัวตะวันตก หมู่เกาะอารู อินโดนีเซีย และปาปัวนิวกีนี การแพร่กระจาย:

ขนาด: ความยาวหัวและลำตัว: 51 - 64 ซ.ม. สถานภาพเชิงอนุรักษ์สากล:<sup>∝</sup>

บัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 ของไชเตส


IUCN: ไม่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (LC)

การค้มครองในประเทศไทย:

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่

23 ธันวาคม 2548





#### ลักษณะคล้ายคลึงกับ:

#### **Other Black Cockatoos**


บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 ของไชเตส พบได้ในออสเตรเลียเท่านั้น

<u>ไม่มี</u> ผิวหน**้าสีแดง-ชมพู** ไม่มี ขนสีเทาดำ

#### **Other Black Parrots** บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 ของไชเตส

พบในมาดากัสกา เกาะโคโมรอสIslands และซีเชลล์

<u>ไม่มี</u> ผิวหน้าสีแดง-ชมพู ไม่มี หงอนหรือจะงอยปากสีดำ





Palm Cockatoo ก่อนเต็มวัยในตลาด



Palm Cockatoo เต็มวัย














## Eos spp. - Indonesian Lories

## นกแก้วอินโดนีเซีย

ชื่ออื่น: Nuri Sangir (Red & Blue Lory, อินโดนีเซีย)

การแพร่กระจาย: อินโดนีเซียตะวันออก

ความยาว: 24 - 31 ซม. ขนาด:

#### สถานภาพเชิงอนรักษ**์สาก**ล:

Eos histrio บัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 ของไชเตส ที่เหลืออยู่ใน บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 ของไชเตส

IUCN: ไม่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (LC)

การคุ้มครองในประเทศไทย:

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 23

ิธันวาคม 2548



#### ลักษณะเดน:


#### **Red and Blue Lory** Eos histrio

#### บัญชีแนบท้ายไชเตสหมายเลข 1 IUCN: ใกล้สญพันธ์ (EN)

1 มีแถบสีมวง-น้ำเงินที่ท้ายทอย (ขนาดอาจตางกันในแต่ละตัว)

ลำตัว: 2. มีแถบสีน้ำเงินพาดอก

หาง: 3. สีมวงอมแดงเมื่อมองจากด้านบน ปีก: 3. ปีกทั้งสองข้างมีแต้มสีน้ำเงิน




การแพร่กระจาย: หมูเกาะ Sangir Talaud และ การแพร่กระจาย: หมูเกาะโมลุกกะ Nanusa อินโดนีเซีย

#### **Red Lory** Eos bornea บัญชีแนบท้ายไชเตสหมายเลข 2

#### IUCN: ไม่มีความเสียงต่อการสูญพันธุ์

หัว: 1 มีสีน้ำเงินรอบตา หัวไม่มีสีมวง

. | ลำตัว: 2. ตัวไมมีสีน้ำเงิน แต่มีสีน้ำเงิน ใต้โคนหาง




ประกอบด้วย Buru Seram และ Kai อินโดนีเซีย

#### **Blue-eared Lory** Eos semilarvata บัญชีแนบท้ายไชเตสหมายเลข 2

#### IUCN: ไม่มีความเสียงต่อการสุญพันธ์

1 แต<sup>้</sup>มสีน้ำเงินมวงบริเวณแก<sup>้</sup>มด้าน บนและห มีแถบสีเดียวกันพาด ลงมาตามคอ

ลำตัว: 2. ลำตัวและใต้หางสีน้ำเงิน



การแพรกระจาย: Seram อินโดนีเซีย


#### **Violet-necked Lory** Eos squamata

#### บัญชีแนบท้ายไชเตสหมายเลข 2 IUCN: ไมมีความเสี่ยงตอการสญพันธ์

1 มีแถบสีน้ำเงินมวงรอบคอ

บางตัวอาจสีจางมาก

ลำตัว: 2. ลำตัวและใต้หางสีน้ำเงิน



การแพรกระจาย: หมูเกาะโมลูกกะเหนือ และปาปัวตะวันตก อิ้นโดนีเซี่ย

#### **Black-winged Lory** Eos cyanogenia บัญชีแนบท้ายไชเตสหมายเลข 2


#### IUCN: มีแนวโน้มใกล้สญพันธ์ (VU)

หัว: 1 สีมวงอมน้ำเงินคาดจากตาถึง

ด้านข้างคอ

ลำตัว: 2. สีข้างและต้นขาดำ

3. ปีกมีแต้มดำ




การแพรกระจาย: หมูเกาะในอาวกีลวิงค์ ปาปัวตะวันตก อินโดนีเซีย


#### **Blue-streaked Lory**


#### Eos reticulata บัญชีแนบท้ายไชเตสหมายเลข 2 IUCN: อาจมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์

- ในอนาคต (NT) สีมวงอมน้ำเงินคาดจากตาถึง
- ลำตัว: 2 หลังครึ่งบนสีน้ำเงิน-ดำ มีริ้วสีมวง-น้ำเงินแทรก



การแพร่กระจาย: กลุ่มทานิมบา อินโดนีเซีย
















## Loriculus galgulus - Blue-crowned Hanging Parrot


## นกหกเล็กปากดำ

ชื่ออื่น: Burung Serindit (มาเลเซีย)

การแพร่กระจาย: บรไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย

ความยาว 12 ซ.ม. ขนาด:







สถานภาพเชิงอนุรักษ*์*สากล:

บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 ของไซเตส


IUCN: ไม่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (LC)


#### การค้มครองในประเทศไทย:

สัตว์ปาคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง สัตว์ปา

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 23 ิธันวาคม 2548

















## Lorius garrulus - Chattering Lory

## **Chattering Lory**

Nuri Ternate (อินโดนีเซีย) ที่อลื่น:

การแพร่กระจาย: Lorius garrulus garrulus - เกาะ Halmahera Widi และ Ternate อินโดนีเซีย

> Lorius garrulus flavopalliatus - เกาะ Bacan และ Obi อินโดนีเซีย Lorius garrulus morotaianus - เกาะ Morotai และ Rau อินโดนีเซีย

ความยาว: 30 ซเ.ม. ขนาด:

ลักษณะเด่น:

เขียวที่กระจายไปทั่ว\*

ปลายปีกด้านใต้ปีก

มีแถบสีแดงสด

ปลายหางเขียวเข้ม เกือบดำ

สถานภาพเชิงอนรักษ*์*สากล**:** บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 ของไซเตส

IUCN: ไม่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (LC)

การคุ้มครองในประเทศไทย:


ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2548



#### Lorius garrulus garrulus -หลังมีแต<sup>้</sup>มสีเหลืองอมเขียว แต่ละตัวขนาดใหญ่เล็กไม่เท่ากัน รอยแต<sup>้</sup>มสีเหลืองปกลมสี

แถบสีเหลืองที่ขนคลุม Lorius garrulus flavopalliatus -แต้มสีเหลืองใหญ่กว่า แต่อมเขียวน้อยกว่า *Lorius* garrulus garrulus

> Lorius garrulus morotaianus -มีแต้มสีเหลืองเล็กๆ อมเขียว




Credit: Chris Shepherd/TSEA



Kredit Foto: Mark Auliva/TSEA
















## **Lorius Iory - Black-capped Lory**

## **Black-capped Lory**

ชื่ออื่น:

**การแพร**่กระจาย: อิเรียนตะวันตก อินโดนีเซีย ปาป๊วนิวกีนี

ขนาด: ความยาว: 31 ซม.



ัสถานภาพเชิงอนุรักษ์สากล:<sup>∞</sup>

บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 ของไชเตส

IUCN: ไม่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (LC) การคุ้มครองในประเทศไทย:

การคุ้มครองในประเทศไทย:

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล<sup>้</sup>อม ลงวันที่

23 ธันวาคม 2548



Credit: Lory Brent Stirton - Getty Images - WWF-U













<sup>็</sup>ตรวจสอบสถานภาพเชิงอนุรักษ์ล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ www.cites.org www.iucnredlist.org และ www.birdlife.org/datazone/search/species\_search.html

## **Strigiformes - Owls**

## นกเค้า

ชื่ออื่น: Burung Hantu (อินโดนีเซีย มาเลเซีย)

**การแพร่กระจาย:** ทั่วโลก (ยกเว<sup>้</sup>นแอนตาร์กติกา)


**ขนาด:** สูง: 16 - 84 ซม. ช่วงปิกกว้าง: 38 - 160 ซม. หนัก: 40 กรัม - 1.8 กก.

#### ลักษณะเด่น:

- ขนนุ่ม
- เกาะตัวตั้ง
- หัวกลมโต
- หางสั้น
- ขายาว (อาจซ่อนอยู่ใต้ขน)
- นิ้วตีนนอกพลิกกลับข้างได้ หันนิ้วตีนไปข้างหน้าหรือข้างหลังก็ได้
- ส่วนใหญ่สีทึมๆ ไม่สดใส



หมายเหตุ: การจำแนกชนิดลูก นกเค้านั้นทำได้ยาก



#### สถานภาพเชิงอนรักษ**์**สากล:

ทั้งหมดอยู่ใน <mark>บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 ของไชเตส</mark> ยกเว<sup>้</sup>น 5 ชนิดที่อยู่ใน บัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 ของไชเตส

Heteroglaux blewitti - นกเค้าแมวป่า (อินเดีย) Mimizuku gumeyi - นกเค้าอักษ์ (ฟิลลิปปินส์) Ninox natalis - นกเค้าเกาะคริสต์มาส (เกาะคริสต์มาส) Ninox novaeseelandiae undulata - นกเค้าเกาะนอร์ธฟอล์ค (เกาะนอร์ธฟอล์ค) Tyto soumagnei - นกแสกมาตากัสการ์ (มาตากัสการ์)

IUCN: ต่างกันไป - สูงสุดคือใกล<sup>้</sup>สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (CR)



Bubo sumatranus (ในกเค้าใหญ่พันธุ์สุมาตร Credit: Claire Beastall

#### การคุ้มครองในประเทศไทย:

สัตว์ปาคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง สัตว์ปา พ.ศ. 2535 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2548

#### **รปแบบการค้า:** ขณะมีชีวิต อวัยวะเพื่อทำยาแผนโบราณ/ประกอบพิธีกรรม



Tyto alba (นกแสก) ขายในตลาด



Ninox scutulata (นกเค้าเหยี่ยว) ขายในตลาด Credit: Obris Shenberd/TSEA



Ketupa ketupu (นกทึดที่อมลายู) ขายในตลาด














## Crocodylia spp. - Hides



All Images Credit












<sup>็</sup>ตรวจสอบสถานภาพเชิงอนุรักษ์ล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ www.cites.org และ www.iucnredlist.org

## **Alligators & Caiman**

#### อัลลิเกเตอร์/เคแมน

ขณะหุบปากฟันลางชี่ที่สี่จะซุกอยู่ในช่องเหนือกรามบน









# Alligator mississippiensis อัลลิเกเตอร<sup>์</sup>อเมริกัน


บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 ของไชเตส

IUCN: ไม่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (LC)

ชื่ออื่น: American Alligator, Gator (อัง กฤษ)

**การแพร**่กระจาย: สหรัฐอเมริกา

ขนาด: ความยาว: สูงสุด 6 เมตร - ปกติยาวราว 4 .8 เมตร



#### All Images Credit: Environment Canada

# Alligator sinensis อัลลิเกเตอร์จีน

บัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 ของไชเตส


IUCN: ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (CR)

ชื่ออื่น: Chinese Alligator (อัง กฤษ), Yangtze Alligator

(อังกฤษ), EY u, T'uo, Tou Lung, Yow Lung (จีน)

การแพร่กระจาย: จีน (Anhiu, Jiangsu, Zhehiang)

ขนาด: ความยาว: สูงสุด 1.8 เมตร



# Caiman crocodilus สเปคตาเคิล เคแมน

บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 ของไชเตส

IUCN: ความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์น้อย (LR)


ชื่ออื่น: Spectacled Caiman, Common Caiman (อังกฤษ)

**การแพร่กระจาย:** บราซิล โคลัมเบีย คอสตาริกา เอกัวดอร์ เอลซัลวาดอร์

เฟรนช์ก็อานา กัวเตมาลา กายอานา ฮอนดูรัส เม็กซิโก นิการากัว ปานามา เปร ชรินาเม ตรินิแดดและโตเบโก

และเวเนซูเอลา

ขนาด: ความยาว: สงสด 2. 7 เมตร













## Crocodylus novaeguineae & Crocodylus mindorensis

# Crocodylus novaeguineae จระเข็นวกินี

#### บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 ของไชเตส

IUCN: ไม่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (LC)

ชื่ออื่น: New Guinea Crocodile (อังกฤษ), Buaya air tawar, Pukpuk, Wahne

huala (อินโดนีเซีย ปาปัวนิวกินี)

การแพร่กระจาย: อินโดนีเซีย (อิเรียนตะวันตก) ปาปัวนิวกินี

ขนาด: ความยาว: สูงสุด 3.5 เมตร

All Images Credit: Environment Canada

# ลักษณะเด่น: บนหางมีเกล็ดดังเป็น แถวคุ 18 - 20 คุ - หนังตายน - ตาสิคอนขางเขียว เกล็ดใหญ่ 4 เกล็ด มีเกล็ตเล็กขนาบขางละหนึ่งเกล็ด เกล็ดใหญ่ 5 เกล็ดไม่เรียงเป็นแถว

# Crocodylus mindorensis จระเขฟิลิปปินส์


#### บัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 ของไชเตส

IUCN: ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (CR)

ชื่ออื่น: Philippine Crocodile (อังกฤษ)

การแพร่ะกระจาย: ฟีลิปปินส์

ขนาด: ความยาว: สูงสุด 3 เมตร



#### การคุ้มครองในประเทศไทย:

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล<sup>้</sup>อม พ.ศ.2548 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2548

#### รูปแบบการค้า:

หนัง และขายขณะมีชีวิต เพื่อเป็นสัตว์เลี้ยง



หนังจระเข<sup>้</sup>ที่วางขาย Credit: TRAFFIC Southeast Asia













## Crocodylus porosus & Crocodylus siamensis

#### Crocodylus porosus จระเขน้ำเด็ม

#### บัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 ของไชเตส

ยกเว<sup>้</sup>นประชากรในออสเตรเลีย อินโดนีเซีย และปาปัวนิวกีนี: บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2

IUCN: ไม่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (LC)

ชื่ออื่น: Estuarine Crocodile, Saltwater Crocodile (อังกฤษ), Buaya muara

(อินโดนีเซีย), Baya, Pukpuk, Kone huala (ป่าปั้วนิ้วกินี), Jara Kaenumkem


(ไทย)

**การแพร่กระจาย:** ออสเตรเลีย บังคลาเทศ บรูใน กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า ปาเลา

ปาปัวนิวกินี ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ หมู่เกาะโซโลมอน ศรีลังกา ไทย วานัวตู

และเวียดนาม

ขนาด: ความยาว: สูงสุด 7 เมตร



#### All Images Credit: Environment Canada

## Crocodylus siamensis จระเขน้ำจืด

#### บัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 ของไชเตส


#### IUCN: ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (CR)

ชื่ออื่น: Siamese Crocodile (อังกฤษ), Buaya kodok (อินโดนีเซีย), Jara

Kaenumchued (ไทย)

**การแพร่กระจาย:** กัมพูชา อินโดนีเซีย (กลิมันตัน) ลาว มาเลเซีย (ซาราวัก) ไทย และเวียดนาม

**ขนาด:** ความยาว: สูงสุด 4 เมตร



#### การคุ้มครองในประเทศไทย: สัตว์ปาค<sup>ั</sup>มครองตามพระราช

ุลตวบาคุมครองตามพระราช บัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพ.ศ. 2535

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล<sup>้</sup>อม พ.ศ.2548 ลงวันที่ 23 รับวาคม 2548

#### รูปแบบการค้า:

หนัง และขณะมีชีวิตเพื่อ เป็นสัตว์เลี้ยง



ลูกจระเข้ที่วางขายในตลาด Credit: TRAFFIC Southeast Asia



กระเป๋าหนังจระเข้ Credit: Mark Auliya











## Tomistoma schlegelii - False Gharial

## ตะโขง

ชื่ออื่น: Tomistoma (อังกฤษ) Buaya sumpit (อินโดนีเซีย)

Julong julong (มาเลเชีย) ตะโขง (ไทย)

การแพร่กระจาย: อินโดนีเซีย (กลิมันตัน สุมาตรา) มาเลเซีย (คาบสมุทรมาเลเซีย ซาราวัก)

ความยาว: สูงสุด 5 เมตร ขนาด:

#### สถานภาพเชิงอนุรักษ์สากล:

บัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 ของไชเตส

#### IUCN: ใกล้สูญพันธุ์ (EN)

#### การค้มครองในประเทศไทย:

สัตว์ปาคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง สัตว์ป่า พ.ศ. 2535

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2548



Credit: Mark Auliya

รปแบบการค้า: ขณะมีชีวิตเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยง มักขายตอนยังไม่โตเต็มวัย



Credit: WWF-Canon / Alain COMPOST






Image Source: Environment Canada





ฟ้นล่างมี 19 - 20 ชื่







- มีเกล็ดขนาดใหญ่สามแถว

## Uromastyx spp. - Spiny-tailed Lizards

## จำพวกกิ้งก**่ามาสติเกอร**์ทุกชนิดในสกุล *Uromastyx*

ชื่ออื่น: Dab Lizard, Mastigure

อินเดียตะวันตกเฉียงเหนือ จนถึงตะวันตกเฉียงใต้ของเอเชีย การแพร่กระจาย:

และแหลบอาราเทียวบถึงซาสาราของแอฟริกา

สรีระ: ความยาว: สูงสุด 91.5 ซม.

สถานภาพเชิงอนุรักษ<sup>์</sup>สากล: กิ้งก่าในวงศ์ *Uromastyx* spp. อยู่ใน บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 ของไซเตส

IUCN: หลากหลาย ตั้งแต่ CR จนถึง

การค้มครองในประเทศไทย:

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2548



# ลักษณะเด่น: ระยะระหว่างรจมก และปลายจมูกสั้นมาก Credit: Mark Auliya/TSEA

- หางมีหนาม และค่อนข้างแบน

- ลำตัวค่อนข้างแบน

- อาจพาเหนังด้านข้างพับเข้า



ลักษณะคล้ายคลึงกับ: Spiny-tailed iguanid lizards จากอเมริกา และมาดากัสการ*์* 

ไม่แสดงลักษณะโดยรวม ดังกล่าวข้างต้น



Australian agamid lizards

ไม่แสดงลักษณะโดยรวม ดังกล่าวข้างต้น



#### รูปแบบการค้า:

ขายขณะมีชีวิตเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยง และใช้เป็นยา

















## Phelsuma spp. - Day Gecko species

## จิ้งจกสีทุกชนิดในสกุล Phelsuma

ชื่ออื่น :

หมู่เกาะอันดามัน (อินเดีย) หมู่เกาะโคโมโร เคนยา มาดากัสการ์ มอริเชียส การแพร่กระจาย:

รียเนียน โรดริเควส ซีเชลส์ ทานซาเนีย

ความยาว 7.6 - 30.5 ซม. สรีระ:

#### สถานภาพเชิงอนุรักษ์สากล: <sup>๓</sup>

ตุ๊กแกประเภท *Phelsuma* spp. ทั้งหมดอยู่ใน บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 ของไชเตส

IUCN: แตกต่างกันไป CR - LR/LC

การคุ้มครองในประเทศไทย:

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2548



Credit: Eugène Bruins

#### ลักษณะเดน:


- สีสดใส ส่วนมากมีสีเขียว
- ตื่นตัวในท่วงกลางวัน
- ตาโต สีเข้ม ม่านตากลม

ไล้กษณะคล้ายคลึ

ต<sup>๊</sup>กแกอื่น

- สีไม่สด

- นิ้วตีนในลดรป









#### รูปแบบการค้า:


ขายขณะมีชีวิตเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยง



Phelsuma spp. แบบตางๆ มีให้เลือกในร้านขายสัตว์เลี้ยง



Phelsuma quadricellata วางจำหน่ายในร้านขายสัตว์เลี้ยง





นิ้วตีนใน ไม่ลดรูป

ม่านตาไม่กลม











<sup>็</sup>ตรวจสอบสถานภาพเชิงอนุรักษ์ล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ www.cites.org, www.iucnredlist.org

## Gekko gecko - Tokay Gecko

## ตุกแกบาน

ชื่ออื่น:


ทั่วเขตร้อนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การแพร่กระจาย:

ขนาด: ยาว: 20 - 40 ซ.ม. หนัก: 150 - 300 กรัม ่สถานภาพเชิงอนุรักษ์สากล:<sup>°</sup>

การคุ้มครองในประเทศไทย:







#### ลักษณะคล้ายคลึงกับ:

ตุ๊กแกชูนิดอื่น - ตุ๊กแกชนิดอื่นไม่มีลักษณะพิเศษูคือจุดูสีส้ม ตุ๊กแกบ้านมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองในจำนวนตุ๊กแกทั้งหมด

#### รูปแบบการค้า: ตากแห้งหรือแข่ในของเหลวเพื่อทำยาแผนโบราณ



ตุ๊กแกบ้านสำหรับทำยาแผนโบราณ



ตุ๊กแกบ้านสำหรับใช้ทำยาแผนโบราณ



ตุ๊กแกบ้านดองเหล้า



ต๊กแกบ้านสำหรับใช้ทำยาแผนโบราณ Credit: TRAFFIC Southeast Asia













## Varanus spp. - Monitor Lizard spp.

#### ตะกวด

ชื่ออื่น: Biawak (มาเลเซีย)

**การแพร่ะกระจาย:** แอฟริกา คาบสมุทรอาระเบีย เอเชียใต<sup>้</sup> เอเชียตะวันออกเฉียงใต<sup>้</sup> อินเดียตะวันออก

ออสเตรเลีย หมู่เกาะมาร์แชล คาโรไลน์ และฟิจิ

ขนาด: ความยาว: ตั้งแต่ 15 ซ.ม. - 3 เมตร


#### สถานภาพเชิงอนุรักษ์สากล:


บัญชีแนบท้ายใชเตสหมายเลข 2 ยกเว้น Varanus bengalensis, V. flavescens, V. griseus, V. komodoensis, V. nebulosus อยู่ใน บัญชีแนบท้ายใชเตสหมายเลข 1

IUCN: มี 3 ชนิดเท่านั้น - V. komodoensis, V. olivaceus: มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (VU), V. flavescens: มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์น้อย (LR)

#### การคุ้มครองในประเทศไทย:

สัตว์ปาคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง สัตว์ปา พ.ศ. 2535 (Varanus nebulosus, Varanus dumerilii, Varanus rudicollis, Varanus salvator) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2548

















## Ptyas mucosus - Oriental Rat Snake

## งูสิงหางลาย

ชื่ออื่น: Banded Ratsnake (อังกฤษ)

**การแพร่กระจาย:** อัฟกานิสถาน กัมพูชา จีน อินเดีย อินโดนีเชีย อิหราน ลาว เนปาล มาเลเชีย พมา ปากีสถาน

ไต**้หวัน ไทย เติร**์กเมนิสถาน และเวียดนาม

ขนาด: ความยาว: 320 ซ.ม.

#### ลักษณะเด่น:



− มีลายแถบคาดลำตัว (ตัวสีเข<sup>้</sup>มจะมองเห็นยาก)



#### ลักษณะคล้ายคลึงกับ: *Ptyas korros* - Indochinese Rat Snake

ไม่อยู่ในบัญชีแนบท้ายไซเตส





การแพร่กระจาย: บังคลาเทศ กัมพูชา จีน อินเดีย อินโดนีเชีย ลาว มาเลเชีย พม่า สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม

All Photographs Credit: Mark Auliya/TSEA

#### สถานภาพเชิงอนุรักษ์สากล:

บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 ของไชเตส

#### **IUCN:** -

#### การคุ้มครองในประเทศไทย:


สัตว์ปาคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง สัตว์ปา พ.ศ. 2535

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล<sup>้</sup>อม ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2548



งูสิงหางลาย Credit: Mark Auliya/TSEA


#### รูปแบบการค้า: หนัง เนื้อ และถุงน้ำดีสำหรับทำยาแผนโบราณ



หนังงูสิงหางลาย Credit: Mark Auliva/TSEA



เนื้องูสิงหางลาย Credit: Mark Auliya/TSEA



หนังงูสิงหางลาย Credit: Mark Auliya/TSEA



ถุงน้ำดีงูสิงหางลาย Credit: Mark Auliya/TSEA











## Ophiophagus, Naja spp. - Cobras


งูเหา

ชื่ออื่น:

แอฟริกา และเอเชีย การแพร่กระจาย:

ความยาว: สูงสุด 585 ซ.ม. ขนาด:

#### ลักษณะเด่น:



เกล็ดตรงหัวตาชนรจมก ลักษณะนี้พบในงูเห่า - cobra งสามเหลี่ยม - krait และงปล้อง หวาย - coral snake (ตากับรจมก อยู่ใกล้กันมากกว่างูอื่นๆ

งเห่าและงจงอางเท่านั้นที่ สามารถแผ่แม่เบี้ย คือชคอตั้ง ขึ้นและแผ่ให้แบบนออกใได้



Credit: Mark Auliya



Coelognathus (Elaphe) radiata งทางมะพร้าว พับคอและลำตัวเพื่อ เลียนแบบงเห่า

Credit: Claire Beastall



ลักษณะเด่นของ Ophiophagus hannah งจงอาง คือเกล็ดบนหัว ใหญ่มาก

Credit: Mark Auliya

ลายด้านหลังแมเบี้ยของ Naia kaouthia (งเห่าไทย/งเห่าหม้อ) ลักษณะไม่ตายตัว

All Photographs Credit: Mark Auliva/TSEA

#### สถานภาพเชิงอนุรักษ์สากล:

งเห่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อยู่ใน

#### บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 ของไชเตส:

Ophiophagus hannah (งูจงอาง), Naja kaouthia (งูเห่าหม้อ), Naja mandalayensis (งูเหาพมา), Naja philippinensis (งูเห่าฟิลิปปินส์พ่นพิษ), Naja samarensis (งูเหาปีเตอร์), Naja siamensis (งูเห่าด่างพุ่นพิษ), Naja sputatrix (งูเห่าอินโดนีเซีย), Naja sumatrana (งูเห่าสุมาตรา)

#### IUCN: -

#### การค้มครองในประเทศไทย:

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2548



Naja sputatrix (งูเห่าอินโดนีเซีย)

รูปแบบการค้า: หนัง เนื้อ และถุงน้ำดีเพื่อทำยาแผนโบราณ





ถูงน้ำดี (สด)



การรีดเลือดจาก Ophiophagus hannah



ซากงเห่าในตลาด



ถงน้ำดี (ตากแห้ง)

















## **Pythons - Pythons**

## งูเหลือม งูหลาม

ชื่ออื่น:

**การแพร่กระจาย:** แอฟริกา เอเชีย และออสเตรเลีย (พบเฉพาะในโลกเก่า)

ขนาด: ความยาว: สูงสุด 10 เมตร

#### สถานภาพเชิงอนรักษ**์สาก**ล: ็

บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 ของไชเตส ยกเว้นงูหลาม
Python molurus molurus (Indian Rock Python) ซึ่งอยู่ใน
บัญชีแนบท้ายหมาย เลข 1 ของไชเตส

IUCN: Python molurus - ไม่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (LC)


#### การคุ้มครองในประเทศไทย:


สัตว์ปาคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง สัตว์ปา พ.ศ. 2535 งหลาม Python molurus bivittatus, งหลามปากเปิค Python curtus, งเหลือม Python reticulatus) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2548



Python breitensteini Credit: Mark Auliya

#### ลักษณะเด่น:





มีเดือยเล็กๆ 2 เดือยยื่นออกมาสองข้างของช่อง ทวารรวม (ช่องเปิดเหนือโคนหาง)

#### รูปแบบการค้า: หนัง เนื้อ และขณะมีชีวิตเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยง

รองเท้าที่ทำจาก

หนังงหลาม

Credit:TRAFFIC



งเหลือม *Python reticulatus* ในการค<sup>้</sup>าเนื้อ <sup>Credit:</sup> Bounma Vongxay



Morelia viridis (Green Tree Python) จากออสเตรเลีย อินโดนีเซีย (อิเรียนตะวันตก) และปาปัวนิวกีนี มักพบค้าเป็นสัตว์เลี้ยง Credit: WWF-Canon / Martin HARVEY




งเหลือม *Python reticulatus* มักพบในการค<sup>้</sup>าหนัง Credit: Chris Shepherd/TSEA



Python curtus และ Python brongersmai



หนังงูหลามที่ยึดไว้เป็นของกลาง



มีงู Boa 6 ชนิดพันธุ์อยู่ใน <mark>บัญชีแนบท้ายไชเดสหมายเลข 1</mark> นอกนั้นอยู่ใน <mark>บัญชีแนบท้ายไชเดสหมายเลข 2</mark> พบเฉพาะในอเมริกากลางและใต้ มาดากัสการ์ และอินโด-แปซิฟิก เท่านั้น











## Carettochelys insculpta - Pig-nosed Turtle

## เต่าจมูกหมู หรือเต่าบิน


ชื่ออื่น: Labi-labi mongcong babi (ID), Budu Susa (Fly River region, PNG), Garr (Morehead

River region, PNG)

แม่น้ำทางตอนใต้ ปาปัวตะวันตก (อินโดนีเซีย และปาปัวนิวกีนี) อาณาเขตทางตอนเหนือ การแพร่กระจาย:

(ออสเตรเลีย)

ความยาวกระดองส่วนบน: สูงสุด 55 ซ.ม. ขนาด:



ลักษณะคล้ายคลึงกับ: ตะพาบน้ำ

ตะพาบน้ำจะไม่มีจมกยื่นยาวและตีนหน้าที่เป็นครีบ มีเล็บตีนข้างละ 2 เล็บ

#### ่สถานภาพเชิงอนุรักษ์สากล: บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 ของไชเตส

IUCN: มีแนวโน้มใกล้สุญพันธุ์ (VU)

#### การคุ้มครองในประเทศไทย:

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2548



Credit: Chris Shepherd/TSEA

#### รูปแบบการค้า: ขายขณะมีชีวิตเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยงโดยมักเป็นลูกเต่า และขายเนื้อเพื่อบริโภคด้วย



ลกเต่าจมกหม Credit: James Compton/TSEA



ลกเต๋าจมกหม Credit: Mark Auliva/TSEA



เนื้อเต่าจมูกหมู



เต่าจมูกหมูก่อนเต็มวัย



เต**่าจมูกหมูเมื่อโตเต็มวัย** Credit: Mark Auliya/TSEA











## Chelus fimbriatus - Matamata Turtle

เต่าคอเลี้ยวมาตามาตา

วงศ์: Chelidae

ชื่ออื่น**:** 

การแพร่กระจาย: โบลิเวีย บราซิล บริติชกียานา โคลอมเบีย เอกวาดอร์ เฟรนช์กียานา เปรู สุรินัม

เวเนซูเอลา

สรีระ: ความยาวกระดองบน: สูงสุด 44.9 ซม.

สถานภาพเชิงอนุรักษ์สากล:

ไม่ระบุ


IUCN: ไม**่ระบุ** 

การคุ้มครองในประเทศไทย: ไม่ระบุ




ลักษณะเด่น:

มีสันนูนสูงสามแนวพาดยาว บนกระดองบน



- กระดองบนมีสีน้ำตาล หรือสีดำ
- ขอบท้ายของกระดองบนเป็นรอยหยักชัดเจน
- หัว คอ ขา และหาง ในตัวเต็มวัยมีสีน้ำตาลอมเทา

รูปแบบการค**้า:** ขายขณะมีชีวิตเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยง






ลักษณะคล้ายคลึงกับ: ไม่คล้ายคลึงกับชนิดใด

มีเดือยสอง แท**่งใต**้คาง













## **Cheloniidae and Dermochelyidae - Marine Turtles**

#### เตาทะเล

#### พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 5 ชนิดคือ:

Dermochelidae: Dermochelys coriacea - เต่ามะเฟือง Chelonidae: Eretmochelys imbricata - เตากระ

> Chelonia mydas - เต่าตน Caretta caretta - เต่าหัวฆ้อน Lepidochelys olivacea - เต่าหญ้า

ความยาวกระดองส่วนบน: สงสด 150 ซ.ม. น้ำหนัก: สงสด 950 ก.ก. ขนาด:

สถานภาพเชิงอนรักษ**์สาก**ล: เต่าทะเลทกชนิดอยู่ใน บัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 ของไชเตส

IUCN: ภาวะอันตรายที่ใกล้สุญพันธ์ -ใกล้สูญพันธุ์ (EN)

การค้มครองในประเทศไทย:

สัตว์ปาคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง

สัตว์ป่า พ.ศ. 2535


ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่


23 ธันวาคม 2548



#### ลักษณะเด่น:

- ขาหน้ามีลักษณะเป็นครีบหมด ทั้งห้าชนิด
- เล็บ (ถ้ามี) จะอยู่ด้านหน้าของ
- หัวและขาไม่สามารถหดเข้าไป ในกระดองได้











เต่าตนสตัฟ



กระดองเตากระ

#### รปแบบการค้า:

ขายขณะมีชีวิต เนื้อ ไข่ สตัฟทั้งตัว ผลิตภัณฑ์จากกระดอง (กระ หรือ Bekko) เช่น เครื่องประดับ กรอบแว่นตา

Image Source: Environment Canada



Bekko Credit: Julia Ng/TSEA



ลกเต่าตนที่วางขาย Credit: Chris Shepherd/TSEA



เนื้อเต่าทะเล Credit: James Compton/TSEA



ไข่เต่าทะเลที่วางขาย

#### กลมและขาว (ลักษณะคล้ายลกปึงปอง)

#### เส้นผ่าศูนย์กลาง:

Chelonia mydas:

Dermochelys coriacea: 5.1 - 5.5ช.ม.

Eretmochelys imbricata: 3.2 - 3.6ช.ม.

Caretta caretta: 3.9 - 4.3ช.ม.

Lepidochelys olivacea: 3.7 - 4.2ช.ม.











4.0 - 4.6ช.ม.

## Eretmochelys imbricata - Hawksbill Turtle

#### เตากระ

ชื่ออื่น: Penyu Karah (มาเลเซีย), Penyu Sisik (อินโดนีเซีย)

การแพร่กระจาย: มหาสมุทรแอตแลนติก: ตะวันออกกลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันตกเฉียงเหนือ


ตะวันออกเฉียงใต<sup>้</sup> ตะวันตกเฉียงใต<sup>้</sup> ตะวันตกกลาง มหาสมุทรอินเดีย: ตะวันออก และตะวันตก


ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และทะเลดำ

ุ่มหาสมทรแปซิฟิก: ตะวันออกกลาง ตะวันตกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงใต<sup>้</sup> ตะวันตกเฉียงใต<sup>้</sup>

ตะวันตกกลาง

ขนาด: ความยาวกระดอง: 62 - 114 ซ.ม. น้ำหนัก: 35 - 127 ก.ก.





สถานภาพเชิงอนุรักษ์สากล: ็ บัญชีแนบท**้ายหมายเลข 1 ของไซเต**ส

IUCN: ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (CR)

#### การคุ้มครองในประเทศไทย:

สัตว์ปาคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง สัตว์ปา พ.ศ. 2535

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2548



รูปแบบการค้า: ขายขณะมีชีวิต เนื้อ ไข่ สตัฟทั้งตัว ผลิตภัณฑ์จากกระดอง (กระ หรือ Bekko) เช่น เครื่องประดับ กรอบแว่นตา ฯลฯ





<sup>\*</sup> Image Source: Environment Canada











<sup>็</sup>ตรวจสอบสถานภาพเชิงอนรักษ์ล่าสดได้ที่เว็บไซต์ www.cites.org และ www.iucnredlist.org

## Batagur spp.

#### แตากะอาน เตาจาน Batagur baska - River Terrapin

ชื่ออื่น : Four-toed Terrapin (อังกฤษ), Tuntong, Tuntong Laut

(มาเลเซีย), Tungtung (อินโดนีเซีย)


บังคลาเทศ กัมพูชา อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า การแพร่กระจาย:

สญพันธ์ในสิงคโปร์ ไทย เวียดนาม

สรีระ: ความยาวสงสด 60 ซม.

#### ลักษณะเด่น:

- ตีนหน้ามีกรุงเล็บ 4 กรุง
- กระดองส่วนทนบีสีหลากเฉด ตั้งแต่สีเทาเข้มจนถึงดำ ตัวเบียอาจบีสีน้ำตาล
- ศีรษะมีสีเทาดำ (ไม่มีเฉดสีแดง)



เล็บ 4 กรง

Credit: Mark Auliva/TSEA



กระดองส่วนล่าง (plastron)



กระดองส่วนบน (carapace)

## เต่าลายตีนเปิด เต่าหัวแดง

#### Batagur (Callagur) borneoensis - Painted Terrapin

ชื่ออื่น : Three-striped Batagur (อังกฤษ), Beluku (อิบัน บอร์เนียว),

> Tuntong Sungei (มาเลเชีย), Biuku, Sulong, Tuntung Semangka (อินโดนีเซีย), Kura-kura jidat merah (เวสท์กาลิมันตัน อินโดนีเซีย ),


Tumtum (อีสท์กาลิมันตัน อินโดนีเซีย )

การแพร่กระจาย: บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย


สรีระ: ความยาวสงสด 60 ซม.

#### ลักษณะเด่น:

- ตีนหน้ามีกรงเล็บ 5 กรง
- กระดองส่วนบนมีสีหลากเฉด
- ศีรษะมีสีหลากหลาย



เต่าลายตีนเป็ด ตัวเมีย Credit: Mark Auliya/TSEA



ตัวเมีย (ดูรูปด้านซ้าย) ศีรษะ: สีส้มอมน้ำตาล

กระดองส่วนบน: สีน้ำตาล อาจมีลายจางๆ

ตัวผู้ - นอกฤดูผสมพันธุ์



ศีรษะ:สีเทาและมี แถบ สีน้ำตาล

กระดองส่วนบน: สีน้ำตาลดำ มีแถบกว้างสีดำ ริมเกล็ดอาจมีลายสีดำ



ตัวผู้ - ฤดูผสมพันธ์



เต่าลายดีนเปิด ตัวผ้

ถดผสมพันธ์ Credit: Mark Auliva/TSEA

ศีรษะ:สีขาว ขอบสีดำ แถบสีแดง

สีขาวนวล เรียบ มีลายสีดำเหมือน ตัวผ<sup>้</sup>นอกถดผสมพันธ์ (ดูรู้ปใน"รูปแบบการค้า″)

กระดองส่วนบน:

ิสถานภาพเชิงอนรักษ*์*สากล: ็ ไเต่ากะอาน เต่าจาน:

บัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 ของไซเตส เต่าลายตีนเป็ด เต่าหัวแดง:

บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 ของไซเตส

#### IUCN: ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (CR) การค้มครองในประเทศไทย:

สัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราช บัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2548

#### รปแบบการคา:

ไข่และขายขณะมีชีวิตเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยง



เต่าลายดีนเปิด สีในถดผสมพันธ์ Credit: Chris Shepherd/TSEA











<sup>็</sup>ตรวจสอบสถานภาพเชิงอนุรักษ์ล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ www.cites.org, www.iucnredlist.org

## Geoclemys hamiltonii - Black Pond Turtle

## เต**่าดำแฮมมิลตัน เต**่าบึงดำลายจุด

วงศ์: Geoemydidae

ชื่ออื่น: Black Spotted Turtle, Hamilton's Terrapin, Spotted Pond Turtle (English)

การแพร่กระจาย: บังคลาเทศ อินเดีย เนปาล ปากีสถาน

สรีระ: ความยาวกระดองบน: สงสด 39 ซม.

สถานภาพเชิงอนุรักษ*์*สากล**ะ** บัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 ของไซเตส

IUCN: มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (VU)

การคุ้มครองในประเทศไทย:

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2548



รูปแบบการค้า: ขายขณะมีชีวิตเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยง

#### ลักษณะคล้ายคลึงกับ

**American Spotted Pond Turtle** (Clemmys guttata) บัญชีไซเตส: ไม่ระบุ IUCN: มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (VU)



- มีจุดสีเหลืองบน กระดองบน
  - ไม่มีจดสีเหลือง บนศีรษะ
- กระดองบนไม่มี สันนน




Credit: Olivier Caillabet

ความยาวกระดองบน: ตั้งแต่ 8.9 - 13.6 ซม.

การแพร่กระจาย: สหรัฐอเมริกา







กระดองบนมีสีดำ พร้อมรอยแต้มสีส้ม สีเหลือง สีครีมหรือสีขาว สีจะจางหายไปตามอายุ ตัวเต็มวัยอาจมีสีดำเกือบ ทั้งหมด

มีสันนูนสามแนว


อยู่บนกระดองบน





Credit: Peter Praschag

Credit:Turtle Conservancy











## Cuora spp. - Asian Box Turtle species

## จำพวกเต**่าหับทุกชนิดในสกุล Cuora**

ชื่ออื่น :

เอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การแพร่กระจาย:

ความยาวสูงสุด 30 ซม. สรีระ:

#### สถานภาพเชิงอนรักษ์สากล:

เต่าในวงศ*์ Cuora* spp. อยู่ใน บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 ของไซเตส

IUCN: แตกต่างกันไป สูงสุดคือใกล้สูญพันธุ์ (EN)

#### การค้มครองในประเทศไทย:

สัตว์ปาคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง สัตว์ปา พ.ศ. 2535

(Cuora amboinensis)


เต่าในวงศ์ Cuora spp. ที่พบในการค้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้:

์ ประกาศกระทรวงทรัพย**้ากรธรรมชาติและสิ่งแวดล**้อม ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2548



#### ลักษณะเดน:

- กระดองส่วนล่างมีบานพับ
- ขอบของกระดองเรียบ (ไม่เป็นรอยฟันปลา)
- กระดองส่วนบนโค้งสูง



Cuora amboinensis

age Source: Environment Canada




Credit: Mark Auliya/TSEA



แถบสีเหลือง


สามแถบอยู่



การแพร่กระจาย: บังคลาเทศ กัมพชา อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ ไทย เวียดนาม

#### Cuora galbinifrons -Indochinese Box Turtle IUCN: CR






#### Cuora trifasciata -Chinese Three-striped Box Turtle



แถบสีดำสามเ



All photos: Chris Shepherd/TSEA



การแพร่กระจาย: บังคลาเทศ กัมพูชา (?) จีน การแพร่กระจาย: จีน (?) ลาว พม่า เวียดนาม

#### รปแบบการค้า:

ขายขณะมีชีวิตเพื่อบริโภค (พบทีละจำนวนมาก) และเป็นสัตว์เลี้ยง



Cuora amboinensis Credit: Chris Shepherd/TSEA



Credit: Mark Auliya/TSEA











## Leucocephalon yuwonoi - Sulawesi Forest Turtle

## เต่าสุลาเวสี

วงศ์: Geoemydidae

TRAFFIC Southeast Asia 2011

ชื่ออื่น**:** Kura-kura daun (อินโดนีเซีย)

การแพร่กระจาย: อินโดนีเซีย

สรีระ: ความยาวกระดองบน: สงสด 25-28 ซม.

#### สถานภาพเชิงอนุรักษ์สากล:

บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 ของไซเตส

IUCN: ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (CR)

#### การคุ้มครองในประเทศไทย:

สัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง สัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2548



Credit: Ian Ives

รูปแบบการค้า:

เนื้อเพื่อบริโภคและขายเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยง



Credit: Ian Ives

ลักษณะคล้ายคลึงกับ:
Asian Leaf Turtle
(Cyclemys dentata)
CITES: ไม่ระบุ
IUCN: ใกล้ถูกคุกคาม (NT)



ศีรษะและคอมีสีเข้ม มีลายเส้นสีส้ม หรือน้ำตาลแดง ด้านข้างหัวและใต้คอ


#### กระดองบน:

- สีน้ำตาลถึงดำ
- สันนูนสันเดียว (ชัดเจนน<sup>้</sup>อย ลง เมื่อสัตว์มีอายุมากขึ้น)
- แผ่นเกล็ด 5 แผ่น เรียงเป็นแนว ที่ด้านาเน



กระดองล่าง:

- สีเหลืองหรือน้ำตาลอ่อน พร้อมเส้นรังสีที่มีสีน้ำตาลเข้ม หรือสีดำ







#### กระดองบน:

- สีเขียวถึงเหลือง น้ำตาลถึง หรือน้ำตาลแดง
- แบนลง แต่มีสันนนสันเดียว
- แผ่นเกล็ด 6 แผ่น เรียงเป็น แนวที่ด้านบน



กระดองล่าง:

- สีเหลืองถึงส<sup>ั</sup>ม และมีแต<sup>้</sup>มสีดำ ในแผ<sup>่</sup>นเกล็ดแต่ละแผ่น ส่วนมาก เป็นสีดำ

การแพร่กระจาย: บรูไน อินโดนีเชีย มาเลเชีย พม่า(?) ไทย เวียดนาม









1ark Auliva/TRAFFIC

## Platysternon megacephalum - Big-headed Turtle

เต่าปูลู

วงศ์: Platysternidae

ชื่ออื่น:

การแพร่กระจาย: กัมพูชา จีน ลาว พม่า ไทย เวียดนาม

ความยาวกระดองส่วนบน: สูงสุด 20 ซม. สรีระ:

สถานภาพเชิงอนุรักษ*์*สากล**:** บัญชีแนบท**้ายหมายเลข 2 ของไซเต**ส

IUCN: ใกล้สูญพันธุ์ (EN)

การค<sup>ุ</sup>้มครองในประเทศไทย: สัตว์ป่ำคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง สัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล<sup>้</sup>อม ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2548



#### ลักษณะเด่นะ

เป็นเต่าน้ำจืดที่มีลักษณะเด่นดังนี้

ศีรษะ: ขนาดใหญู่เกินกว่าที่จะหดเข้าไปในกระดองได้ ด้านบนหัว ปกคลุมด้วยแผ่นเกล็ดเดี่ยวขนาดใหญ่

ยาวเกือบเท่าความยาวของกระดองบน ปกคลุมด้วยเกล็ดขนาดใหญ่





ตัวเต็มวัย





รูปแบบการค้า: 

ความคล้ายคลึง: ไม่เหมือนชนิดใดๆ



วัยอ่อน กระดองล่างมีสีส้ม และมีลายสีดำ ที่กึ่งกลาง



All images: Peter Paul van Diik









© TRAFFIC Southeast Asia 2011

## Orlitia borneensis - Malaysian Giant Turtle

## เต่าแม่น้ำบอร์เนียว

ชื่ออื่น : Bajuku, Biukuk (อินโดนีเซีย); Juku juku besar, Baning dayak (มาเลเซีย)

การแพร่กระจาย: อินโดนีเซีย มาเลเซีย

สรีระ: ความยาวสงสด 80 ซม.

#### สถานภาพเชิงอนุรักษ์สากล

บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 ของไชเตส

IUCN: ใกล้สูญพันธุ์ (EN)


#### การคุ้มครองในประเทศไทย:

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พ.ศ.2548 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2548



#### ลักษณะเด่น:



กระดองส่วนบนมีสีเทา น้ำตาล หรือดำ

ศีรษะมีสีน้ำตาล หรือดำ

แผ่นเกล็ดหนา ที่รอบๆ ตา

เกล็ดกลางแผ่นแรก ด้านบนกว้าง และ ด้านล่างแคบ

มีรอยเว<sup>้</sup>าแหลมที่ฐานของ กระดองส่วนล่าง





#### รูปแบบการค้า:

ขายขณะมีชีวิตเพื่อบริโภคเนื้อ (พบคราวละมากๆ)





Credit: Chris Shepherd/TSEA





Credit: Mark Auliva/TSEA











## Siebenrockiella leytensis - Philippine Forest Turtle

#### เต่าป่าฟิลิปปินส์

วงศ์: Geoemydidae

© TRAFFIC Southeast Asia 2011

ชื่ออื่น: Bakoko, Bakuku (ฟิลิปปินส์); Philippine Pond Turtle, Leyte Pond Turtle, Necktie

Turtle (อังกฤษ)

การแพร่กระจาย: เกาะพาลาวัน และเกาะดูมารัน ในฟิลิปปินส์

สรีระ: ความยาวกระดองบน: สูงสุด 30 ชม. น้ำหนักตัว 3.5 กก. หรือมากกว่า

สถานภาพเชิงอนุรักษ์สากล:

บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 ของไซเตส

IUCN: ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (CR)

การคุ้มครองในประเทศไทย:


ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล**้**อม

ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2548

(เต่าบึงฟิลิปปินส์ Heosemys leytensis)



รูปแบบการค้า: ขายขณะมีชีวิตเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยง เพื่อบริโภคเนื้อ และยาแผนโบราณ





ขากรรไกรบนงุ้มขึ้น เล็กน้อย

ศีรษะใหญ่

สีของศีรษะจางลง ตามอาย



ตัวเต็มวัย

ลักษณะคล้ายคลึงกับ:

เต่าดำ หรือเต่ากา (Black Marsh Turtle) (Siebenrockiella crassicollis)

บัญชีแนบท**้ายหมายเลข 2 ของไซเต**ส

IUCN: มีแนวโนมใกล้สูญพันธุ์ (VU)



− ศีรษะ คอ มีสีดำเทา และจุดสีเหลือง หรือขาว (สังเกตเห็นได้ยาก ในตัวเด็มวัยตัวผู้) กระดองล่างสีดำหรือสีอ่อน



มีรอยแต<sup>้</sup>มสีดำชัดเจน ที่ขอบของเกล็ด ถ้ากระดองมีสีอ่อน

การแพร่กระจาย: กัมพชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม

สรีระ: ความยาวกระดองบน: สูงสุด 20 ซม.

Photo credit: Mark Auliva/TSE









## Trachemys scripta elegans - Red-eared Slider

#### **Red-eared Slider**

ชื่ออื่น: Kura-kura Telinga merah, Kura-kura ninja (อินโดนีเซีย),

Kura terlinga-merah (มาเลเซีย).

การแพร่กระจาย: สหรัฐอเมริกา

หมายเหตุ: นำเข้าบรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ปาปัวนิวกินี ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์

และประเทศในเขตอ๊บอุ่น เขตร้อนชื้น และเขตกึ่งร้อนชื้นทั่วโลก

สรีระ: ความยาวสูงสุด 30 ซม.

สถานภาพเชิงอนุรักษ์สากล:

นอกบัญชีไซเตส

IUCN: ไม่ระบุ

การคุ้มครองในประเทศไทย:



Credit: Mark Auliya

#### ลักษณะเด่น:

ลายแต้มแตกต่างกัน

ในลักษณะนี้

วัยอ่อน

Credit: Sabine Schoppe



กระดองล่าง

แต้มยาวสีแดง

ศีรษะสี เขียวเข<sup>้</sup>ม มีแถบสีเหลือง

เกล็ดมีสี่ส้มอม

หลืองและรอยแตม

สีเขม

- สีของกระดองส่วนบนและล่าง แตกต่างไปตามอาย
- สีของศีรษะไม่เปลี่ยนตามอาย
- ด้านข้างศีรษะ บริเวณหลังตา มักจะมีแต้มสีแดงปรากฏให้เห็น
- ตัวเต็มวัยเพศผู้ มีเล็บยาว

#### กระดองบน



#### รปแบบการค้า:

ขายขณะมีชีวิตเพื่อบริโภคเนื้อและเพื่อเป็น สัตว์เลี้ยง ขายตัวอ<sup>่</sup>อนเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยง



Credit: Sabine Schoppe

หมายเหตุ ในแต่ละปี เต่า Red-eared Slider นับล้านตัว ถกจับมาเพาะเลี้ยงอย่างผิดกฎหมาย

ผู้ลักลอบ มักจะระบุการค้าเต่าชนิดนี้ในใบอนุญาต แต่ในความเป็นจริง นำเต่าชนิดอื่นมาใส่ในการขนส่ง

ตัวเต็มวัย











<sup>์</sup> ตรวจสอบสถานภาพเชิงอนุรักษ์ล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ www.cites.org,

## Testudinidae spp. - Tortoise species

## จำพวกเต**่าโดมทุกชนิดในสกุล** Testudinidae

ชื่ออื่น :

การแพร่กระจาย: แอฟริกา (รวมมาดากัสการ์) อเมริกา ยุโรป เอเชีย

สรีระ: ความยาว: 10 - 135 ซม. น้ำหนักสูงสุด 140ก.- 300 กก.

#### สถานภาพเชิงอนุรักษ์สากล:<sup>∞</sup>

ทุกชนิดอยู่ใน บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 ของไซเตส\*,

ยกเว้น 8 สกุล ที่อยู่ใน บัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 ของไซเตส

Astrochelys (Geochelone) radiata - Radiated Tortoise
Astrochelys (Geochelone) yniphora - Ploughshare Tortoise
Chelonoidis (Geochelone) nigra - Galapagos Giant Tortoise
Gopherus flavomarginatus - Yellow-bordered Tortoise
Psammobates geometricus - Geometric Tortoise
Pyxis arachnoides - Spider Tortoise
Pyxis planicauda - Flat-tailed Tortoise
Testudo kleinmanni - Kleinmann's Tortoise

#### IUCN: หลากหลาย สูงสุด CR การคุ้มครองในประเทศไทย:


สัตว์ปาคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง สัตว์ปา พ.ศ. 2535 (เตาหก เตาหกเหลือง เตาเดือย หรือ เตาควะ หรือ เตาเขาสูง เต่าเหลือง หรือ เต่าขี้ผึ้ง หรือ เต่าเทียน หรือ เต่าเพ็ ) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2548



ู้ เตาเดือย *Manouria impressa* Credit: Doug Hendrie

\*หมายเหตุ: Geochelone sulcata - African Spurred Tortoise I อยู่ในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 ของไชเตส ไม่อนญาตให้นำออก จากถิ่นอาศัยเพื่อการค้าโดยเด็ดขาด

#### ลักษณะเด่น:



ส่วนมากเก็บคอและ ระยางค์เข้าไปใน กระดองได้อย่างมิดชิด

บางชนิดตัวใหญ<sup>่</sup>มาก อาจมีน้ำหนักถึง 300 กก



Credit: Chris Shepherd/TSEA

#### หมายเหตุ:

เต่าในวงศ์ Testudinidae spp. อาศัยอยู่บนบก

ต้องให้เต่าที่ยังมีชีวิตดื่ม น้ำ แต่ห้ามปล่อยลงสระ เพราะเต่าจะจบน้ำตาย

#### รูปแบบการค้า:

ขายขณะมีชีวิตเพื่อบริโภคเนื้อและเพื่อเป็น สัตว์เลี้ยง กระดองถกนำมาใช้เป็นยาหรือเครื่องประดับ



การจับกุมเต<sup>่</sup>าของกลาง Credit: Hartmut JUNGIUS / WWF-Canor



กระดองเต<sup>่</sup>านำมาใช้ทำเครื่องดนตรี Credit: Hartmut JUNGIUS / WWF-Canon

#### **ลักษณะคล้ายคลึงกับ:** เต่าน้ำจืดและเต่าทะเล

เต่าน้ำจืด

ตีนมีพังผืด



Trachemys scripta elegans - Red-eared Slider

เต่าทะเล



Eretmochelys imbricata - เตากระ Credit: Cat HOLLOWAY / WWF-Canon

#### หมายเหต:

เต่าน้ำจืดและเต่าทะเล อาศัยอยู่ในน้ำเป็น ส่วนใหญ่











# Astrochelys (Geochelone) radiata - Radiated Tortoise เต่าบกลายจักร หรือเต่าลายรัศมี หรือเต่าเรเดียต้า สถานภาพเชิงอนุรักษ์สากละ

ชื่ออื่น:

มาดากัสการ์; เริ่มพบในมอริเชียสเนื่องจากมนษย์นำไปแพร่พันธ์ และเรอนียง การแพร่กระจาย:

ความยาวกระดองส่วนบน: สง 40 ซ.ม. ขนาด:

สถานภาพเชิงอนุรักษ์สากล: บัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 ของไชเตส

IUCN: ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (CR)

#### การคุ้มครองในประเทศไทย:

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2548













ลายกระดองเต่าเรเดียต้า



















All Photographs: Chris Shepherd/TSEA except where indicated). "ตรวจสอบสถานภาพเชิงอนุรักษลาสุดไดที่เว็บไชต์ www.cites.org และ www.iucnredlist.org

## Astrochelys yniphora\* - Ploughshare Tortoise

## เต่ามาดากัสการ์

ชื่ออื่น: Angonoka (มาดากัสการ์)

\*ชื่อวิทยาศาสตร์บางครั้งใช้ Angonoka yniphora หรือ Astrochelys yniphora

การแพร่กระจาย: มาดากัสการ์

ความยาวกระดองส่วนบน: ยาวได้ถึง 48 ซ.ม. ขนาด:

#### ิสถานภาพเชิงอนรักษ์สากล: <sup>∝</sup>

บัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 ของไชเตส

IUCN: ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (CR)

#### การค้มครองในประเทศไทย:

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2548

> ด้านหน้าของกระดอง ส่วนล่างมีจงอยยื่นหัน ขึ้นด้านบน - จงอย ของตัวผ<sup>้</sup>โตเต็มวัยจะ

ยาวที่สด




เลี้ยง มักขายขณะยังไม่เต็มวัย

รปแบบการค้า: ขายขณะมีชีวิตเพื่อเป็นสัตว์

#### ลักษณะเด่น:

ตอนอายน้อยลายจะเป็นลายสีเหลี่ยม บริเวณกลางแผ่นเกล็ดโล่งไม่มีจดหรือลายประ




Credit: Sandrine Pantel/TSEA





Credit: Kathrin Schmidt







ลกเตา Ploughshare Credit: WWF-Canon / Donald G. REID

**ลักษณะคล้ายคลึงกับ:** เมื่อโตเต็มวัยสามารถจำแนกได**้**ชัดเจน แต่ลูกเต่าและเต่าก่อนเต็มวัยคล้ายคลึงกับ Geochelone sulcata (African Spurred Tortoise) มาก

ลกเต่า Geochelone sulcata จะมี:

- กระดองเป็นทรงโดมเตี้ยกว่า















<sup>็</sup>ตรวจสอบสถานภาพการอนรักษ์ล่าสดได้ที่เว็บไซต์ www.cites.org และ www.iucnredlist.org

## Chelonoidis (Geochelone) carbonaria - Red Footed Tortoise

## เต่าบกตีนแดง

วงศ์เตาบก: Testudinidae

ชื่ออื่น: South American Red-footed Tortoise, Cherry-headed Tortoise

(English)

การแพร่กระจาย: อาร์เจนติน่า โบลิเวีย บราซิล โคลอมเบีย กียานา ปานามา ปารากวัย

เวเนซูเอลา

สรีระ**:** ความยาวกระดองบน: สูงสุด 51 ซม.

สถานภาพเชิงอนุรักษ์สากล:

บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 ของไซเตส

IUCN: ไม่ระบุ

การคุ้มครองในประเทศไทย:

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2548




Credit: David Lawson/WWF-UK

รูปแบบการค้า**:** ขายขณะมีชีวิตเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยง



กระดองบนมีสีดำ และมีรอยแต<sup>้</sup>มสีเหลือง ถึงสีแสดุแต<sup>้</sup>ม บนยอดแผ่นเกล็ด

|
 กระดองบุนมีสีดำ
และมีรอยแต่มสีเหลือง
ถึงสีแสด แต่มที่ขอบ
ดานนอกของแผ่นเกล็ด



ด้านบนของขาหน้า คลุมด้วยเกล็ดสีแดงขนาดใหญ่

> เกล็ดแผ่นหน้าบนหัว ไม่แบ่งเป็นสองชิ้น

เกล็ดบนหัวมีสีเหลือง แดง หรือส้บ



ลักษณะคล้ายคลึงกับ:

เต่าบกดีนเหลือง Yellow-footed Tortoise (Chelonoidis (Geochelone) denticulata)


บัญชีแนบท**้ายหมายเลข 2 ของไซเต**ส

IUCN: มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์

ความยาว: ยาวสูงสุดถึง ชม. 82 ชม.

TRAFFIC Southeast Asia 2011

การแพร่กระจาย: โบลิเวีย โคลอมเบีย เอกวาดอร์ เฟรนช์กียานา กียานา เปรู สุรินัม ตรินิแดดและโทแบโก เวเนซูเอลา



กระดองบนมีสีน้ำตาล มีรอยแต้มสีเหลืองถึงสมที่ ด้านบนของแผ่นเกล็ด

กระดองบนมีรอยแต<sup>้</sup>มสีเหลือง ถึงส<sup>ุ้</sup>ม แต<sup>้</sup>มที่ขอบด้านนอก ของแผ<sup>่</sup>นเกล็ด



Credit: Matt Morris


ด้านบนของขาหน้า คลุมด้วยเกล็ดสีเหลืองหรือสี สัมขนาดใหญ่

> เกล็ดแผ่นหน้าบนหัว แบ่งเป็นสองชิ้น

> > เกล็ดบนหัวมี สีเหลืองหรือส<sup>ู</sup>้ม



Credit: Matt Morris



<sup>&</sup>lt;sup>°</sup>ตรวจสอบสถานภาพเชิงอนุรักษ*์*ล่าสุดได*้*ที่เว็บไซต์ www.cites.org, www.iucnredlist.org

Credit: Matt Morris









## Geochelone elegans - Indian Star Tortoise

## เตาดาวอินเดีย

ชื่ออื่น:

การแพร่กระจาย: อินเดีย ปากีสถาน และศรีลังกา

ความยาวกระดองส่วนบน: สงสด 38 ซ.ม. ขนาด:

สถานภาพเชิงอนุรักษ์สากล: บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 ของไชเตส

IUCN: มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์น้อย (LR)

การคุ้มครองในประเทศไทย:

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2548











ลายกระดองเต่าดาวอินเดีย



ความยาวกระดอง: สูงสุด 26 ซ.ม.

Credit: Mark Auliya/TSEA







ความยาวกระดอง: สงสด 40 ซ.ม.

แผ่นอก

USAID

## Pyxis arachnoides - เต่าสไปเดอร **CITES Appendix I**



Credit: WWF-Canon / Urs WOY

TRAFFIC

ความยาวกระดอง: สงสด 15 ซ.ม.







ไม่มีเส้นเชื่อม

<sup>์</sup> ตรวจสอบสถานภาพเชิงอนุรักษ์ล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ www.cites.org และ www.iucnredlist.org

# Geochelone platynota - Burmese Star Tortoise

# เตาดาวพมา

ชื่ออื่น:

การแพร่กระจาย:

ขนาด: ความยาวกระดองส่วนบน: สูงสุด 26 ซ.ม. ่สถานภาพเชิงอนุรักษ์สากล: <sup>°</sup>


บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 ของไชเตส

IUCN: ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (CR)

การค้มครองในประเทศไทย:

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล<sup>้</sup>อม ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2548











ลายกระดองเตาดาวพมา Credit: James Comptom/TSEA



#### Astrochelys (Geochelone) radiata - เต่าบกลายจักร เต่าลายรัศมี เต่าเรเดียต้า

บัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 ของไชเตส

ลายดาว แผ่ออกเป็นรูปพัด คลุมประมาณหนึ่ง ในสี่ของปมบน กระดอง (เกล็ด)

Credit: Chris Shenherd/TSEA

ความยาวกระดอง: สูงสุด 40 ซ.ม.



แผ่นอก

USAID

# Pyxis arachnoides - เตาสไปเดอร์ บัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 ของไชเตส บานพับ พบใน บางตัวเท่านั้น Credit: WWF-Canon / Urs WOY ความยาวกระดอง: สูงสุด 15 ซ.ม. แผ่นอก\*

TRAFFIC





<sup>\*</sup> Image Source: Environment Canada

<sup>็</sup>ตรวจสอบสถานภาพเชิงอนุรักษ์ล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ www.cites.org และ www.iucnredlist.org

# Geochelone (Stigmochelys) pardalis - Leopard Tortoise

# \_ เต**่าเสือดา**ว

ชื่ออื่น:

**การแพร่กระจาย:** แองโกลา บอตสวานา เอธิโอเปีย เคนยา เลโซโท มาลาวี โมชัมบิก นามิเบีย โชมาเลีย

แอฟริกาใต ้ ซูดาน สวาชิแลนด์ แทนชาเนีย ยูกันดา ซาเอียร์ แซมเบีย ซิมบับเว

ขนาด: ความยาวกระดองส่วนบน: สูงสุด 70 ซ.ม. หนัก: 20 กก.

# สถานภาพเชิงอนุรักษ*์*สากล:

บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 ของไชเตส


**IUCN: -**


# การคุ้มครองในประเทศไทย:

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล<sup>้</sup>อม ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2548



Credit: WWF-Canon / Michel TERRETTAZ





All Photographs Credit: Mark Auliya/TSEA











# Geochelone (Centrochelys) sulcata - African Spurred Tortoise

# **African Spurred Tortoise**

วงศ์เต่าบก: Testudinidae

ชื่ออื่น: Grooved Tortoise (อังกฤษ)

การแพร่กระจาย: แชด อียิปต์ อิริเทรีย เอธิโอเปีย มาลี มอริทาเนีย ในเกอร์ ในจีเรีย เซเนกัล

โซมาเลีย ซูดาน

สรีระ: ความยาวกระดองบน: สูงสุด 83 ซม. น้ำหนักตัวมากสุดถึง 100 กก.

สถานภาพเชิงอนรักษ์สากล

#### บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 ของไซเตส

Zero quota: ไม่อนุญาตให้มีก**ว**รน่า African Spurred Tortoises อยู่ในกา<u>รค้าเชิงพาณิชย์</u>ระหวางประเทศ

IUCN: มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (VU)

## การคุ้มครองในประเทศไทย:

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล<sup>้</sup>อม ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2548



รูปแบบการค**้า:** ขายขณะมีชีวิตเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยง





เต่าโดมเฮอร์มานน์ Hermann's Tortoise (*Testudo hermanni*) บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 ของไซเตส IUCN: ใกล้ถกคกคาม (NT)



เกล็ดเหนือ ส่วนหาง


ความยาว: สูงสุด 20 ชม. การแพร่กระจาย: ยุโรป Image credit: UK Border Agency

© TRAFFIC Southeast Asia 2011

เต่าโดม Spur-thighed Tortoise (*Testudo graeca*) บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 ของไชเดส IUCN: มีแนวโนมใกล้สุญพันธ์ (VU)



Credit: WWF-Canon/Michel Gunthe



มีเดือยทรงกรวยขนาดใหญ่ 1 คู่ อยู่ด้านข้างของหาง

ความยาว: สูงสุด 40 ชม. การแพร<sup>่</sup>กระจาย: ยุโรป ตะวันออกกลาง Image credit: UK Border Agency เต่าโดมอียิปต์ Kleinmann's Tortoise (*Testudo kleinmanni*) บัญชีแนบท้ายูหมายเลข 1 ของไชเตส



Credit: H. Zwartepoorte, Rotterdam

กระดองล่างสี เหลืองอ่อน มีรอยแต้มคู่ เป็นรูปสามเหลี่ยม

ความยาว: สูงสุด 14.4 ซม. การแพร่กระจาย: อียิปต์(?) ลิเบีย

เต<sup>่</sup>าโดมเอเชียกลาง Central Asian Tortoise

บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 ของไชเตส IUCN: มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (VU)



Credit: Peter Paul van Dijk



ความยาว: สูงสุด 22 ซม. การแพร่กระจาย: ยุโรปตะวันออก เอเชียตะวันออก เอเชียเหนือ และเอเชียใต้ Asian Brown Tortoise (Manouria emys)

บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 ของไซเตส IUCN: ใกล้สฌพันธ์ (EN)



redit: Sabine Schoppe



ความยาว: สงสด 60 ซม.

การแพร่กระจาย: บังคลาเทศ อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย พมา ไทย เวียดนาม

#### ∣ลักษณะคล้ายคลึงในวัยอ่อน

เต<sup>่</sup>าบก Ploughshare Tortoise (*Astrochelys yniphora*)

บัญชีแนบท**้ายหมายเลข 1 ของไชเตส** IUCN: ใกล้สฌพันธ์อย**่**างยิ่ง (CR)



มีเกล็ดเดี่ยว ที่ดานหน้า ของกระดอง ล่าง

redit: Chris R Shepherd/TS

การแพร่กระจาย: มาดากัสการ์









# Indotestudo elongata - Yellow-headed Tortoise

# เต่าเหลือง เต่าขี้ผึ้ง เต่าเทียน เต่าเพ็ก

วงศ์: Testudinidae

ชื่ออื่น: Elongated Tortoise, Pineapple Tortoise (ภาษาอังกฤษ), Banding

Lontong, Kura-kura Mas (มาเลเชีย)

การแพร่กระจาย: บังคลาเทศ กัมพูชา อินเดีย ลาว มาเลเซีย พม่า เนปาล ไทย เวียดนาม

สรีระ: ความยาวกระดองบน: สูงสุด 36 ซม.

# สถานภาพเชิงอนุรักษ์สากล:

บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 ของไซเตส

IUCN: ใกล้สุญพันธ์อย่างยิ่ง (EN)

# การค้มครองในประเทศไทย:

สัตว์ป่าค<sup>ุ</sup>่มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและค<sup>ุ</sup>่มครอง สัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2548



รูปแบบการค้า: เนื้อเพื่อบริโภคและขายเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยง

#### ลักษณะเด่น:

© TRAFFIC Southeast Asia 2011

ส่วนที่สงที่สดของกระดองบนเมื่อมองจากด้านข้าง อยู่ที่แผ่นเกล็ดที่ 3



ศีรษะสีเหลือง

ในฤดผสมพันธ์ ตัวผ<sup>้</sup>มีสีชมพรอบตา และรูจมูก

ส่วนมาก มีแผ่นเกล็ดที่ท้ายทอยขนาดเล็ก ยาวเรียว อยู่ตรงกลางด้านหน้าของ กระดองบน

ลวดลายหลากหลาย พื้นสีส้มถึงส้มอมเขียว อาจมีแต้มสีดำกระจัดกระจาย



วัยอ่อน



วัยอ่อน Credit: Sabine Schoppe



กระดองลาง

#### ลักษณะคล้ายคลึงกับ:

Sulawesi Tortoise (Indotestudo forstenii)

บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 ของไซเตส IUCN: ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (EN)

การแพร่กระจาย: สลาเวสี อินโดนีเซีย



กระดองบน

ส่วนมาก ไม่พบแผ่นเกล็ดที่ท้ายทอย ถ้าหากมี จะสั้นและเป็นรูปเสี้ยว

ส่วนที่สูงที่สุดของกระดองบนเมื่อมอง จากด้านข้าง อยู่ที่แผ่นเกล็ดที่ 3

กระดองมีสีเหลืองอมส<sup>้</sup>ม มีลายสีดำ รูปสี่เหลี่ยมอยู่กึ่งกลางของแผ่นเกล็ด



มีรอยแต้มสีดำเข้ม รอยนี้ไม่ข่นมัวหรือแตกลาย

ที่ท้ายทอย

**Travancore Tortoise** (Indotestudo travancorica) บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 ของไซเตส

IUCN: มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (VU)

การแพร่กระฉาย อินเดีย



ส่วนที่สูงที่สุดของกระดองบนอยู่ที่แผ่นเกล็ดที่ 2 ตามแนว สันบน (หากกระดองไม่เปลี่ยนร<sup>ู้</sup>ป) อาจพบที่แผ่นเกล็ดที่ 3

ในวัยอ่อน

ส่วนมาก ไม่พบแผ่นเกล็ด



วัยออบ Indotestudo travancoria Credit: Indraneil Das











# Malacochersus tornieri - Pancake Tortoise

# เต่าแพนเค้ก

ชื่ออื่น:

**การแพร**่กระจาย: เคนยา แทนซาเนีย และซิมบับเว

ขนาด: ความยาวกระดองส่วนบน: 18 ซ.ม.

สถานภาพเชิงอนุรักษ์สากล:<sup>็</sup>

บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 ของไชเตส

IUCN: มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (VU)

การคุ้มครองในประเทศไทย:

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล<sup>้</sup>อม ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2548



Credit: Fabian Schmid


#### ลักษณะเด่น:

กระดองแบน (แม้แต่ตัวที่มีขนาดใหญ่ก็มี ความหนาเพียง 6 ซ.ม.)

กระดองส่วนบนมีลายดาว (เห็นลายได้เสมอแต่บางตัว อาจไม่ชัดเจนนัก)

กระดองรูปร่างค่อนข้างเป็นสี่ เหลี่ยม เมื่อมองจากด้านบน

ริมกระดองทั้งกระดองส่วนบน และลางค่อนข้างแข็ง แต่ ตรงกลางกระดองเมื่อกดดู จะรู้สึกนุ่ม



รูปแบบการค้า: ขายขณะมีชีวิตเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยง



เต่าแพนเค้กที่วางขายในร้านขายสัตว์เลี้ยง Credit: Mark Auliva/TSEA

All Photographs Credit: Mark Auliya/TSEA











# Manouria emys - Asian Brown Tortoise

# ์เต่าหก เต่าหกเหลือง

ชื่ออื่น : Baning perang, Kura-kura anam kaki (มาเลเซีย), Kadazandusun, Suyan (รัฐซาบาห์

มาเลเซีย), Baning coklat (อินโดนีเซีย)

การแพร่กระจาย: บังคลาเทศ อินเดีย อินโดนีเซีย (สมาตรา และบอร์เนียว) มาเลเชีย พม่า ไทย เวียดนาม

ความยาวสงสด 60 ซม. น้ำหนักสงสด 30 กก. สรีระ:

# สถานภาพเชิงอนุรักษ์สากล:

บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 ของไซเตส

IUCN: ใกล้สูญพันธุ์ (EN)

# การคมครองในประเทศไทย:

สัตว์ปาค้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและค้มครอง สัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2548



# ลักษณะเด่น:

มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาเต่าเอเ

กระดองส่วนบนและกระดองส่วนล่าง มีสีเดียวกัน - เทา น้ำตาล หรือดำ

ศีรษะสีน้ำตาล หรือดำ

ตัวผู้มีเดือยที่ขาหลัง




Credit: Chris Shepherd/TSEA

เต่าหกเหลือง มี 2 สกลย่อย:

Manouria emys emys พบในสมาตราและบอร์เนียว (อินโดนีเซีย) มาเลเซีย และภาคใต้


Manouria emys phayrei พบในบังคลาเทศ อินเดีย พม่า ภาคตะวันตก และภาคกลางของไทย

มีความแตกต่างกันเล็กน้อย แต่ทั้งสองชนิดอยู่ใน <u>บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 ของไซเตส</u>



Credit: Mark Auliya/TSEA

Manouria emys phayrei -แผ่นเกล็ดคู่ที่อยู่ด้านหลังของขาคู่หน้า บรรจบกันตรงกลาง




# รปแบบการค้า:









บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 ของไซเตส

ความยาวสูงสุด 31 ซม.

แผ่นเกล็ดบนและด้านข้าง โค้งเข้าด้านใน

เป็นขอบฟันเลื่อย และงุ้มเข้าหากระดองส่วนบน



การแพร่กระจาย: ลาว มาเลเซีย พม่า ไทย เวียดนาม



Credit: Mark Auliya/TSEA









# Manouria impressa - Impressed Tortoise

# เต**่าเดือย หรือ เต**่าควะ หรือ เต**่าเขาสู**ง

ชื่ออื่น : Banning bukit (มาเลเชีย); Baning Asia (อินโดนีเซีย)

ลาว มาเลเซีย พม่า ไทย เวียดนาม การแพร่กระจาย:

สรีระ: ความยาวสงสด 33 ซม.

#### สถานภาพเชิงอนุรักษ**์สาก**ล: ็

บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 ของไซเตส

IUCN: มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (VU)

## การค้มครองในประเทศไทย:

สัตว์ปาคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครอง สัตว์ป่า พ.ศ. 2535

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2548



# รูปแบบการค้า:

ขายขณะมีชีวิตเพื่อบริโภคเนื้อและเพื่อเป็น สัตว์เลี้ยง



# ลักษณะเด่น: แผ่นเกล็ดบนและด้านข้ เป็นขอบฟันเลื่อย และง้มเข้าหา ศีรางะสี กระดองส่วนบน เหลือง ตัวผู้เท่านั้นที่มี กระดองส่วนบนสีน้ำตาล เดือย ทองและโปร่ง Credit: Douglas B. Hendrie Credit: Douglas B. Hendrie

#### ลักษณะคล้ายคลึงกั

#### Manouria emys เต่าหกเหลือง


บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 ของไซเตส

มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาเต่าเอเชีย ยาวสูงสุด 60 ซม. ศีรษะสีน้ำตาล หรือดำ

กระดองส่วนบนและกระดองล่าง - เทา น้ำตาล หรือดำ แผ่นเกล็ดบนและด้านข้าง ไม่โค้งเข้าด้านใน เป็นขอบฟันเลื่อย ไม่ง้มเข้าหากระดองส่วนบน



การแพร่กระจาย: บังคลาเทศ อินเดีย อินโดนีเซีย (สมาตรา และบอร์เนียว) มาเลเซีย พม่า ไทย เวียดนาม













# Amyda cartilaginea - Asiatic Softshell Turtle

# ตะพาบนำ้

ชื่ออื่น: Labi labi, Labi labi super, Kuaya emas (อินโดนีเซีย)

บรไนดารสซาลาม กัมพชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า การแพร่กระจาย:

สิง<sup>้</sup>คโปร*์* ไทย และเวียด<sup>้</sup>นาม

ความยาวกระดองส่วนบน: สงสด 100 ซ.ม. ขนาด:

สถานภาพเชิงอนุรักษ์สากล:

บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 ของไชเตส

IUCN: มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (VU)

การค้มครองในประเทศไทย:

สัตว์ปาคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครอง

สัตว์ป่า พ.ศ. 2535


ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2548



## ลักษณะเด่น:

Credit: Mark Auliya



มีจุดสีเหลืองที่หัว และคอ

จมูกมีลักษณะ คล้ายงวง และตรงมาก



Credit: Mark Auliya

## กระดองส่วนบนโค้ง


ขอบด้านหน้ากระดองขรขระ ลักษณะเป็นตุ่มเล็กๆ เรียงกัน



ลักษณะคล้ายคลึงกับ: Dogania subplana - ตะพาบแก้มแดง



จมูกมีลักษณะ คล้ายงวง และชี้ลง



Credit: Chris Shepherd/TSEA

กระดองแบนราบ ผิวค่อนข้างเรียบ

บีแถบสีเข้มกลางกระดอง

มีลายจุดข้างละ 2 หรือ 3 จุด (บางครั้งมีลายเส้นละเอียดเป็นฝอยล้อม)



ขอบด้านหน้ากระดองเรียบ ไม่มีตุ่มนูนขรุขระ

# รูปแบบการค้า: ขายขณะมีชีวิตเพื่อบริโภคเนื้อ



การค้าตะพาบน้ำ Amyda cartilaginea



ตะพาบน้ำ Amyda cartilaginea ก่อนขนส่ง (ในภาพจะเห็นกระดองปริแตก)



IUCN: มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์น้อย (LR)



ความยาวกระดอง (ส่วนบน): ยาวถึง 35 ซ.ม.

การแพร่กระจาย: อินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า ฟีลิปปินส์ สิงคโปร์











# Chitra spp. - Narrow-headed Softshell Turtles

# ตะพาบม**่านลาย กราวลาย กริวลาย** ทุกชนิดในสกุล *Chitra*

วงศ์: Trionychidae

ชื่ออื่น**:** Labi-labi bintang (อินโดนีเซีย), Manlai (มาเลเซีย)

การแพร่กระจาย: บังคลาเทศ อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า เนปาล

ปากีสถาน ไทย

สรีระ: ความยาวกระดองบน: สงสด 183 ซม.

#### สถานภาพเชิงอนุรักษ์สากล:

ทุกชนิดในสกุล *Chitra* อยู่ใน บัญชีแนบท**้ายหมายเลข 2 ของไซเต**ส

IUCN: ใกล้สูญพันธุ์อย**่างยิ่ง - ใกล้สูญพันธ**ุ์

(CR - EN)

#### การคุ้มครองในประเทศไทย:

สัตว์ป่ำคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง สัตว์ป่า พ.ศ. 2535

พ.ศ. 2333 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล<sup>้</sup>อม ลงวันที่

23 ธันวาคม 2548

Chitra vandijki



ตัวอ<sup>่</sup>อนเพิ่งฟัก *Chitra chitra* (Thailand) Credit: Peter Paul van Dijk

#### ลักษณะเด่น:

TRAFFIC Southeast Asia 2011

Credit: Jonathan Murray


เปลือกกระดองปกคลุมด้วยผิวคล้ายหนัง

กระดองบนกลมมนและแบน เรียบในตัวเต็มวัย

กระดองล่างมีสีครีมถึงขาวอมชมพู

ศีรษะเรียว ยาว และแบน

ระยะห่างระหว่างตาทั้งสองข้างน้อยกว่า ความกว้างของกระบอกตา



ตะพาบในสกล Chitra สามชนิด:

# Southeast Asian Narrow-headed Softshell Turtle (*Chitra chitra*) IUCN: ใกล้สุญพันธ์อย่างยิ่ง (CR)

Chitra chitra (ประเทศไทย)

สี: สีเหลืองอมเขียว ถึงเขียวมะกอก ถ้าสีดำ เป็นสัตว์ที่มาจากชวา อินโดนิเชีย การแพร่กระจาย: อินโดนีเซีย บาเลเซีย ไทย

#### Burmese Narrow-headed Softshell Turtle (*Chitra vandijki*) IUCN: ไม**่**ระบ

สี: สีน้ำตาลช็อคโกแลต การแพร่กระจาย: พม่า

# Indian Narrow-headed Softshell Turtle (Chitra indica)

IUCN: ใกล้สูญพันธุ์ (EN)

สี: กระดองบนมีสีเทาดำถึงเขียวมะกอกเข้ม วัยอ่อนอาจมีลวดลายคล้ายตาที่กระดองบน การแพร่กระจาย: บังคลาเทศ อินเดีย เนปาล ปากีสถาน รูปแบบการค**้า:** เนื้อเพื่อบริโภค

#### ลักษณะคล้ายคลึงกับ:

ตะพาบหัวกบ กราวเขียว กริวดาว (Giant Softshell Turtles) ในสกุล *Pelochelys* 



สีและลวดลายไม่แน่นอน อาจเป็นสีพื้น

ความยาวกระดองบนสูงสุดถึง 150 ชม. ระยะห่างระหว่างตาทั้งสองข้างมากกว่าความ กว้างของกระบอกตา

ศีรษะสั้น และกว้าง



การแพร่กระจาย: ออสเตรเลีย บังคลาเทศ กัมพูชา จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พมา ปาบัวนิวกินี ฟิลิปปินส์ ไทย เวียดนาม









Credit: Peter Paul van Diik

# Pelochelys spp. - Giant Softshell Turtles

# ตะพาบหัวกบ กราวเขียว กริวดราว ทกชนิดในสกล Pelochelys

วงศ์: Trionychidae

ชื่ออื่น: Labi-labi raksasa (อินโดนีเซีย), Antipa (ฟิลิปปินส์)

การแพร่กระจาย: ออสเตรเลีย (?) บังคลาเทศ กัมพูชา จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ลาว

บาเลเซีย พบ่า ้าไวบัวนิวกินี ฟีลิปปึ้นส์ ไทย เวียดนาม

สรีระ: ความยาวกระดองบน: สงสด 150 ซม.

#### สถานภาพเชิงอนุรักษ์สากล:

ทุกชนิดในสกุล Pelochelys อยู่ใน บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 ของไซเตส

IUCN: ใกล้สุญพันธุ์ - มีแนวโน้มใกล้สุญพันธุ์ (EN - VU)

#### การคุ้มครองในประเทศไทย:

สัตว์ปาคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง สัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล<sup>้</sup>อม

ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2548



#### ลักษณะเด่นะ

- เปลือกกระดองปกคลมด้วยผิวหนัง
- กระดองบนกลมมนและแบน เรียบในตัวเต็มวัย
- กระดองล่างมีสีขาวครีม
- ศีรษะสั้น และกว้าง
- ระยะห่างระหว่างตา กว้างกว่าความกว้าง ของกระบอกตา





# ตะพาบหัวกบ (Pelochelys cantorii) Frog-faced Softshell Turtle

สี: กระดองบนมีสีน้ำตาลพื้นๆ ไม่มีลวดลาย

การแพร่กระจาย: บังคลาเทศ กัมพูชา จีน อินเดีย อินโดนีเซีย (สมาตรา กาลิมันตัน สลาเวสี) ลาว มาเลเซีย พม่า ปาปั๊วนิวกินี ฟิลิปปินส์ ไทย เวียดนาม

# Striped New Guinea Softshell Turtle (Pelochelys bibroni)

สี: กระดองบนมีลวดลายคล้ายตะพาบม่านลาย (Chitra chitra) แต่มีแถบกว้างสี น้ำตาลพาดจากด้านหลังคอไปจนถึงกลางกระดอง (ดูตามรูปข้างบน) การแพร่กระจาย: ปาปัวอินโดนีเซีย ปาปัวนิวกินี ออสเตรเลีย (?)

#### Speckled Giant Softshell Turtle (Pelochelys signifera) IUCN: ไม่ระบ

สี: กระดองบนมีความยาว 55 ซม. สีน้ำตาลอมเขียวมะกอก ไม่มีลวดลาย

#### ตะพาบในสกุล Pelochelys สามชนิด:

# IUCN: ใกล้สูญพันธุ์ (EN)

การแพร่กระจาย: ปาปัวอินโดนีเซีย ปาปัวนิวกินี

#### รปแบบการค้า: เนื้อเพื่อบริโภค

#### ลักษณะคล้ายคลึงกับ:

ตะพาบบ่านลาย กราวลาย กริวลาย (Narrow-headed Softshell Turtles) Chitra spp.




สีและลวดลายมีความหลากหลาย ระยะห่างระหว่างตา แคบกว่าความกว้าง ของกระบอกตา

ศีรษะยาว เรียว



การแพร่กระจาย: บังคลาเทศ อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า เนปาล ปากีสถาน ไทย



Pelochelys cantorii

© TRAFFIC Southeast Asia 2011











# Pelodiscus sinensis - Chinese Softshell Turtle

# ตะพาบจีน

ชื่ออื่น : Labi China (มาเลเซีย), Labi labi Cina (อินโดนีเซีย)

จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน เวียดุนาม การแพร่กระจาย: เพาะเลี้ยงในที่กักขังเป็นจำนวนมาก

ความยาว: 25 - 35 ซม. สรีระ:

## สถานภาพเชิงอนุรักษ์สากล:

นอกบัญชีไซเตส

IUCN: มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (vu)

การค้มครองในประเทศไทย:



#### ลักษณะเด่น:

- มีสีหลากหลาย (ตั้งแต่เขียว เทาอมน้ำตาล)
- อาจมีสีดำแต้มที่กระดองส่วนบน
- จมูกยาวเมื่อเทียบกับตะพาบน้ำชนิดอื่นๆ

- พบร่องที่กระดองส่วนบน



Credit: Mark Auliva/TSEA



Credit: Bui Dang Phong



ตัวอ่อน: สีแดงหรือส้ม (อาจมีสีเหลืองหรือขาว) แต่จะพบ จดสีดำที่ขาหลังและกระดองส่วนล่างเสมอ

ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อโตขึ้น หมายเหตุ: ลวดลายแตกต่างกันไปในแต่ละตัว



Dogania subplana - Malaysian Softshell Turtle

นอกบัญชีไชเตส



Credit: Mark Auliva/TSEA

#### รปแบบการค้า: ขายขณะมีชีวิตเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยง และเพื่อบริโภคเนื้อ



ลกตะพาบวางขายในร้านขายสัตว์เลี้ยง Credit: Chris Shepherd/TSEA



การขายเนื้อที่ตลาดสด Credit: Chris Shepherd/TSEA

#### Amyda cartilaginea - Asiatic SoftshellTurtle

บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 ของไชเตส

**IUCN: VU** 

- มีจดสีเหลืองที่หัวและคอ
- จมูกยาวตรง
- ขอบด้านหน้า ของกระดองส่วนบนหยาบ และนนขึ้นมา อย่างเห็นได้ชัด



- **IUCN: LR** - มีเส้นสีดำลากยาวตรงกลางของกระดองส่วนบน
- ขอบด้านหน้า ของกระดองส่วนบนเรียบ
- จมูกยาวงุ้มลง



Credit: Mark Auliya/TSEA













# Dyscophus antongilii - Tomato Frog

# อึ่งมะเขือเทศ หรือ กบมะเขือเทศ

ชื่ออื่น: Northern Tomato Frog

การแพร่กระจาย: มาดากัสการ์

สรีระ: ความยาว: 6 - 10.5 ซเม.

# ลักษณะเด่น: ที่หลังไม่มีลวดลายสีดำ แต่อาจมีรอยด่าง ใต้คางสีขาว แถบสีดำ (บางทีไม่มี) หนังพับเข้า นิ้วหลังมีพังผืดบางส่วน สีแตกต่าง แต่พบว่าสีแดงมากกว่ากบ Dyscophus guineti Image Source: Environment Canada

# สถานภาพเชิงอนุรักษ์สากล:


บัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 ของไซเตส

IUCN: ใกล้ถูกคุกคาม (NT)

#### การคุ้มครองในประเทศไทย:

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2548















# Scleropages formosus - Asian Arowana

# ปลาตะพัด ปลามังกร ปลาอโรวาน่า

**ชื่ออื่น:** Ikan Kelisa (มาเลเซีย); Ikan Kelesar (อินโดนีเซีย); Jinglongyu (จีน Hanyupinying),

Trey tapawt (เขมร)

การแพร่กระจาย: กัมพูชา อินโดนีเซีย (เกาะบันกา สุมาตรา กลิมันตัน) ลาว มาเลเซีย (รวมถึงชาราวัก) พม่า ไทย

และเวียดนาม

สรีระ: ความยาวโดยรวมของตัวโตเต็มวัย: ยาวถึง 100 ชม. แต่ส่วนใหญ่มักเห็นระหว่าง 50 - 60 ชม.

#### สถานภาพเชิงอนรักษ์สากล: ็

บัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 ของไชเตส ปลาที่มาจากการเพาะเลี้ยงสามารถค้าขายได้ถ้า:

1. ผู้เพาะเลี้ยงจดทะเบียนกับไชเตส

และ

2. มีการติดไมโครชิพ


และ


3. เป็นปลาในระดับอย่างน้อย F2 (ผสมพันธุ์เป็นรุ่นที่ 2)

# IUCN: ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (EN)

การคุ้มครองในประเทศไทย:

สัตว์ปาคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง สัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2548









All Photos (except where indicated) credited to: Tan Heok Hui











# Cheilinus undulatus - Humphead Wrasse


# ปลานโปเลียน หรือ ปลานกขุนทองหัวโหนก

ชื่ออื่น**:** Mameng, Licin, Langkawit (Malaysia), So-mei (Chinese)

การแพร่กระจาย: มหาสมทรอินเดีย: ตะวันออก และตะวันตก

มหาสมทรแปซิฟิก: ตะวันออกกลาง ตะวันตกเฉียงเหนือ ตะวันตกกลาง

สรีระ: ความยาว 229 ซ.ม. น้ำหนักสูงสุด 191 ก.ก.



ลักษณะคล้ายคลึงกับ:
Cheilinus chlororurus
Floral Maori Wrasse

— ไม่มีลายแถบที่ตา หรือสีเหลืองที่ขอบปลายครีบหาง — ไม่มีลายแถบที่ตา หรือสีเหลืองที่ขอบปลาย

มีลายจดสีขาวเรียงเป็นแถวหลายแถว

— มีลายจุดและลายจุดเรียงเป็นแถวสีชมพู

Cheilinus trilobatus

**Triple Tail Wrasse** 

สถานภาพเชิงอนุรักษ*์*สากล**:** <sup>๓</sup>

บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 ของไซเตส

IUCN: ใกล้สูญพันธุ์ (EN)

การคุ้มครองในประเทศไทย:

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2548



รูปแบบการค้า:

ขายขณะมีชีวิตเพื่อเลี้ยงในตู้ปลา หรือ ร้านอาหาร

โดยทั่วไปจะขนส่งทั้งตัว

โดยทั่วไปที่พบในตลาด: น้ำหนัก 0.5 - 1.0 ก.ก. ยาว 30 - 40 ซ.ม. ส่วนลกปลาคนขายจะเสี้ยงไว้จนกว่าจะโตได้ขนาดจึงนำมาขาย



ลอบสำหรับจับปลานโปเลียน Credit: Debbie Ng



การขนย้ายปลานโปเลียน Credit: Debbie No.



ปลานโปเลียนรอการขนย้าย Credit: Julia Na / TSEA



ปลานโปเลียนในตู้ปลาตามร้านอาหาร 🔵 Credit: WWF-Canon / Michèle DUPRÁZ














# Hippocampus spp. - Seahorse spp.

# Hippocampus spp. - ม้าน้ำ

ชื่ออื่น:

© TRAFFIC Southeast Asia 2008

ชายฝั่งทะเลเขตร้อนและอบอุ่น (ตั้งแต่ประมาณ 50 องศาเหนือถึง 50 องศาใต้) การแพร่กระจาย:

ขนาดต่างกันไปตั้งแต่ 2 ซ.ม. จนถึง 35 ซ.ม. สรีระ:

# ลักษณะเด่น: หัวเหมือนม้า หางใช้ในการ จับยึดได้



สถานภาพเชิงอนุรักษ**์สาก**ล: <sup>°</sup> บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 ของไชเตส

IUCN: แตกต**่างกันไป สูงสุดคือใกล**้สูญพันธุ์ (EN)

# การคุ้มครองในประเทศไทย:

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2548



รปแบบการค้า: ตากแห<sup>้</sup>งเพื่อนำม<sup>า</sup>ทำยาแผนโบราณ หรือของที่ระลึก หรือขายขณะมี ชีวิตเพื่อเลี้ยงในตู้ปลา







ม้าน้ำตากแห้ง



ม้าน้ำตากแห้ง



ม้าน้ำตากแห้งขณะวางขาย









# Tridacnidae spp. - Giant Clam spp.

# จำพวกหอยมือเ**สือและหอยมือแมวทุกชนิดในวงศ**์ **Tridacnidae**

ชื่ออื่น: Kima (มาเลเซีย)

การแพร่กระจาย: อินโด-แปซิเฟิค

เนื้ออาจมีสีสัน สดใส

สรีระ: ความยาว: สงสด 130 ซม. น้ำหนักสงสด 300 กก. สถานภาพเชิงอนุรักษ**์**สากล: <sup>๓</sup>

หอยมือเสือทุกชนิดในวงศ์ Tridacnidae spp. อยู่ใน

บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 ของไซเตส

IUCN: ขึ้นบัญชี 4 ชนิด สถานะตั้งแต่ LR/conservation dependent to VU

การค้มครองในประเทศไทย:

สัตว์ปาคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง สัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2548



#### มีชีวิต เวลาที่กาบหอยเปิด เนื้อหนาปกคลุมล้นนอกขอบบนของกาบ





## ไม่มีชีวิต (เฉพาะกาบ)

ภายในกาบหอยไม่มันวาวเหมือน







# รปแบบการค้า:

้ขายเนื้อ กาบ และขณะมีชีวิตเพื่อการค้าตู้ปลา





เนื้อหอยมือเสือเชิงการค้า













<sup>็</sup>ตรวจสอบสถานภาพเชิงอนุรักษ์ล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ www.cites.org, www.iucnredlist.org

# Nepenthes spp. - Pitcher Plants

# หม้อข้าวหม้อแกงลิง

หม้อ (pitcher) งอกออกมาจาก

สายดิ่ง (tendril) ์ ที่งเป็นส่วนขยาย

ของใบ

ชื่ออื่น:

ลักษณะเด่น:

จากภาคเหนือของออสเตรเลีย ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถึงภาคใต้ของจีน การแพร่กระจาย:

# ัสถานภาพเชิงอนรักษ**์สาก**ล: ็

มี 2 ชนิดพันธุ์: Nepenthes rajah and Nepenthes khasiana อยู่ใน บัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 ของไชเตส

Nepenthes ชนิดที่เหลืออยู่ใน บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2

# การค้มครองในประเทศไทย:

พืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518



Nepenthes macfarlanei (upper pitchers)

# หมายเหตุ: ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในประเทศ เพื่อหาข้อมลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจำแนก

รปแบบการค้า: ขณะมีชีวิต

หมายเหตุ: ผู้ลักลอบมักตัด ปลายใบทิ้งร<sup>้</sup>าว 1/3 ความยาว เพื่อกำจัดหม<sup>้</sup>อแล<sup>๊</sup>ะสายดิ่ง ทำให้จำแนกชนิดพันธ์ยากขึ้น



Nepenthes rafflesiana ที่ค้าขาย

Nepenthes rajah

IUCN: ใกล้สณพันธ์ (EN)

การแพร่กระจาย: มาเลเซีย (ซาบาห์ - ยอดเขาคินาบาลู และยอดเขาตัมโบยคอนเท่านั้น)

เป็นหนึ่งในจำนวน หม้อข้าวหม้อแกง ลิงที่สายดิ่งงอก ออกมาจากใต้ใบ ตรงประมาณ 1/3 ความยาวจาก ปลายใบ

หม้ออาจสูงได้ถึง 35 ซม. กว้าง 18 ซม. และจุของเหลว มากกว่า 3 ลิตร



Nepenthes raiah

ชนิดพันธุ์ที่อยู่ในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 ของไชเตส:

และใบแคบยาว (บางครั้งจึงจะมีกิ่งก้าน)

\_ หม้องอกอยู่ตรงปลายใบ -แต่ไม่ใช่ทกใบจะต้องมีหม้อเสมอไป



\_ จุดเด่น - คล้ายเครือเถา มีก้านบางๆ

Nepenthes albomarginata



Nepenthes burbidaeae Credit: Carrol Lawrence



Nepenthes albomarginata

Nepenthes macfarlanei (lower pitchers) Credit: Carrol Lawrence



Nepenthes sanguinea Credit: Carrol Lawrence

Nepenthes khasiana

IUCN: DD

การแพร่กระจาย: อินเดีย

ชนิดพันธ์ที่อยู่ใน\*บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 ของไชเตส : ทกส่วนและสิ่งที่ได้จากพืช ยกเว้น:

- a) เมล็ด สปอร์ และละอองเรณู (รวมถึงกลุ่มเรณู pollinia);
- b) ต้นอ่อน หรือต้นอ่อนที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออยู่ในอาหาร แข็งหรือเหลว และขนส่งใสภาชนะที่ปลอดเชื้อ












# **Orchidaceae**

# กลวยใม้

ชื่ออื่น: Anggerik (มาเลเซีย)

มากกว่า 25,000 ชนิดที่เป็นที่ร<sup>้</sup>จัก - การจำแนกยากมากแต่ตัวดอกมีคณสมบัติบางอย่างร่วมกัน




- มีกลีบเลี้ยง (sepal) 3 กลีบแยกจากกลีบดอก (petal) (อาจดุคล้ายกลีบดอก) **(S)** 

คณสมบัติร่วมของดอกกล้วยไม้:

- มีกลีบดอก 3 กลีบ (P) กลีบหนึ่งเปลี่ยนรูปทรงไปจนกลายเป็นปาก (lip) **(L)** ซึ่งอาจจะมีสี้ รปทรง และขนาดแตกต่างจากกลีบอื่น
- ด้านหนึ่งของดอกไม้จะตรงกับอีกด้านเหมือนเงาสะท้อนกันและกัน
- ส่วนที่เป็นเพศผู้และเพศเมียรวมกันเป็นเส้าเกสร (column) (C)

กล้วยไม้รองเท้านารี: Eq. Paphiopedilum spp. and Phragmipedium spp.



## กล้วยไม้ในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 ของไชเตส\*

การแพร่กระจาย: ไทย บาเลเซีย พบ่า ลาว Dendrobium cruentum

Renanthera imschootiana การแพร่กระจาย: อินเดีย พม่า เวียดนาม

การแพร่กระจาย: เอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จีน ปาปัวนิวกีนี Paphiopedilum spp.

การแพร่กระจาย: อเมริกากลาง อเมริกาใต้ Phragmipedium spp.

Aeranais ellisii การแพร่กระจาย: มาดากัสการ์

Laelia (Sophronitis) lobata การแพร่กระจาย: บราซิล

การแพร่กระจาย: บราซิล Laelia (Sophronitis) jongheana

Peristeria elata การแพร่กระจาย: คอสตาริกา ปานามา เวเนซเอลา โคลัมเบีย

# ่สถานภาพเชิงอนรักษ**์สาก**ล: ็

#### บัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 ของไชเตส: มี 8 ชนิด\*

ต้นอ่อนหรือที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออยู่ในอาหารแข็งหรือเหลว และขนส่งในภาชนะที่ปลอดเชื้อ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของไซเตส

บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 ของไซเตส: ORCHIDACEAE spp (ข้อมลเพิ่มเติมกรณาดที่ www.cites.org )

. ทั้งหมดที่เหล็

Paphiopedilum lowii

หมายเหต: กล้วยไม้ป่าทกชนิดต้องขอใบอนุญาตไชเตส

รปแบบการค้า: ต<sup>้</sup>นมีชีวิต (อาจไม่มีดอกติดมา) ดอกที่ตัดออกมา หรือทำเป็นของที่ระลึก

#### กล้วยไม้ในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 ของไชเตส\* ที่พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้



Dendrobium cruentum การแพร่กระจาย: ไทย มาเลเซีย พม่า ลาว



เวียดนาม

Credit: Nik Ahamad Fahmi



Eq. Paphiopedilum barbatum Credit: REACH/Amran

Paphiopedilum spp. การแพร่กระจาย: เอเชียใต้ เอเชียตะวันออก เฉียงใต้ จีน ปาปัวนิวกีนี

ใบ: - ผิวหยาบเหมือนหนังสัตว์ ใบมีสันกลางชัด

- เมื่อตัดขวางจะมีรปร่างเป็นอักษร V

- ส่วนใหญ่สั้น (ไม่ถึง 20 ซม.

- สีแตกต่างกันไปตั้งแต่สีเขียวธรรมดา เขียวบันวาว ถึงลายประสีบ่วง

หมายเหตุ: ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในประเทศเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจำแนก











© TRAFFIC Southeast Asia 2008

# **Orchidaceae**

# กล้วยไม้

# กล้วยไม้ป่าทุกชนิดต้องใช้ใบอนุญาตจากไชเตส...

#### กล้วยไม้ป่า

มักขนส่งเป็นจำนวนน้อย (ไม่ถึง 20 ต้น) จำนวน:

ขนาดต้นไม่สม่ำเสมอ ขนาด:

ส่วนใหญ่สภาพไม่ดี จำนวนไม่มาก ราก:

มีตำหนิหรือตัดบางส่วนทิ้ง

ทิศทางการงอกต่างจากที่ควรจะเป็นใน เครื่องบรรจปัจจบัน อาจมีรา เฟ็นเล็กๆ เปลือกไม้ กิ่งไม้ หิน ทราย และ สัตว์เล็ก เช่น หอยทาก แบลงติดบา

ลักษณะทั่วไป: สภาพไม่ดีนัก ใบอาจมีจดด่างดำ

หรือสีหมุ่นทึบ มักมีตำหนิ (มีรอยแมลง ทำลายขึ้นรา มีตะไคร่หรือไลเคนสีเขียว

# กล้วยไม้จากการขยายพันธ์

มักขนส่งจำนวนมาก (มากกว่า 20 ตัวอย่าง)

ต้นบีขนาดสน่ำเสนอ ใกล้เคียงกัน

ส่วนใหญ่สภาพดี

งอกตามรูปทรงของเครื่องบรรจุ มีเครื่องเพาะเลี้ยง (เช่นถ่านไม*้* 

ว้นสำหรับเพาะเลี้ยง กาบมะพร้าว มอส ฯลฯ)

อาจ...

ทำลาย

หลงเหลือให้เห็นได้

ไม่มีตำหนิ (ไม่มีรอยแมลง ขึ้นรา มีตะไคร่หรือใลเคนเกาะ)

# สถานภาพเชิงอนรักษ์สากล:<sup>°</sup>

กล้วยไม้ทุกชนิดอยู่ในบัญชีที่ 2 ของไซเตส

ยกเว้น 8 ชนิด ที่อยู่ในบัญชีที่ 1 (ดูในแผ่นที่ 1 กล้วยไม้ในบัญชี แนบท้ายหมายเล้ข 1 ของไชเตส)

# การค้มครองในประเทศไทย:

กล้วยไม้ป่าทกชนิดได้รับการค้มครองตาม พระราชบัญญัติปาไม้ พ.ศ. 2484



กล้วยไม้จากการขยายพันธุ์เทียม: ...เช่น กล้วยไม้เพาะในหลอดแก้ว จะ

ไม่อยู่ภายใต้ความควบคมของไซเตส

...กล้วยไม้ที่ปลกเพื่อส่งออกนั้นได้รับ

อาหารเท่าเทียมกัน ขนาด อาย

ดภายนอกจึงเหมือนกันทกประการ

และสภาพไม่แตกต่างกัน

Credit: WWF-Canon / Wil LUIIJF

หมายเหต: ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาณในประเทศเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจำแนก

# | |ทำอย่างไรจึง จะแยกแยกกล้วยไม้ปาออกจากกล้วยไม้ท ได้จากการี่เพาะเลี้ยง - อะไรที่ควรมองหา...

# รากกล้วยไม้ป่า:



Credit: REACH/Carrol

#### อาจ....

... - รากไม่สมบรณ์ อาจมีรากที่ไส<sup>้</sup>ก<sup>ื</sup>ลวงแห<sup>้</sup>ง ตายติดมา

...อาจพบรอยตัดแต่ง ปลายรากที่เสียหาย

...มีรากพืชอื่น หรือเปลือกไม้ที่เคยเกาะ อาศัยติดมา

...มีรอยตำหนิ ขาด เสียหายจากการขนส่ง

# ใบกล้วยไม้ป่า:



Credit: Royal Botanic Gardens Kew



Credit: REACH/Carrol

...มีจดสีอ่อนหรือรซึ่งเกิด

จากแมลงกัดทำลาย

...มีรอยหัก พับหรือฉีกขาด

...มีรอยแมลงหรือสัตว์กัด

ต้นมีลักษณะเหี่ยวเฉาจากการ ขาดน้ำมีตำหนิจากการขาดน้ำ (ไม่อวบ มีรอยปริแตก โดยเฉพาะบริเวณสันกลางใบ)

# ลักษณะภายนอกของกล้วยไม้ป่าโดยทั่วไป:



ขนาดไม่สม่ำเสมอ

มักจะมีดอกหรือฝึก แห้ง ติดมากับต้น



Credit: Royal Botanic Gardens Kew











# Gonystylus spp. - Ramin spp.

รามิน

ชื่ออื่น: Bengol, Gaharu, Melawis, Garu Buaja, Lanutan-bagio

บรไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ปาปัวนิวกีนี ฟิลิปปินส์ และหม่เกาะโซโลมอน การแพร่กระจาย:

สถานภาพเชิงอนุรักษ์สากล:

บัญชีรายชื่อแนบท้ายหมายเลข II ของไชเตส


IUCN: มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (VU) 15 ชนิด

การคุ้มครองในประเทศไทย:

#### ขั้นตอนการจำแนก:

## 1. ทำตัวอย่างไม้เพื่อตรวจสอบ

ตัดเนื้อไม้ตามขวาง





ให้มีดคมๆ ตัดเนื้อไม้ชิ้นเล็กๆ ออกมาจากชิ้นไม้ที่ ตัดขวางนั้น

#### 2. ตรวจสอบผิวหน้าไม้ที่ตัดออกมา

ลักษณะ

คล้ายคลึง

ใช้แว่นขยายมือถือ กำลังขยาย 14 เท่า ตรวจสอบผิวหน้า ไม้ที่ตัดออกมา




ต้องถือแว่นขยายให้ ชิดตาจึงจะเห็น รายละเอียดได้อย่าง ชัดเจน



# รปแบบการค้า:

ไม้แปรรูป ไม้อาบน้ำยา มักใช้ ทำกรอบประตู กรอบรูป เตียงเด็ก และไม้บรรทัด



mage Source: Forest Products Laboratory, US Forest Service

#### รามิน

ใจกลางไม้เป็นสีขาวข่นถึง เหลืองจางๆ

เนื้อแข็งและหนักพอประมาณ


เมื่อดวงปีจะไม่เห็น ท่ออาหาร เรียงตัวชัดเจน

ท่ออาหารปกติแยกกันอย่ แต่อาจพบซ้อนกันได้

รอบท่ออาหารมีลักษณะคล้าย







Gonystylus sp.






Dyera costulata



Hevea brasiliensis



Endospermium malaccense

หมายเหตุ: ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในประเทศ ์ เพื่อหาข**้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ**้ำแนก



ไม้รามินอาจพบย้อมเป็น สีต่างๆ Credit: Chris Shepherd/TSEA













The Association of Southeast Asian Nations Wildlife Enforcement Network (ASEAN-WEN) ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ศุลกากร และหน่วยงาน สิ่งแวดล้อมจากประเทศในกลุ่มอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ คือ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย

ASEAN-WEN ประสานงานในภูมิภาคเพื่อตอบโต้ต่อการนำสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการคุ้มครอง มาค้าขายอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งกระทบต่อสถานะความหลากหลายทางชีวภาพ ้ ก่ออันตรายต่อสุขภาวะของสาธารณะ และกัดกร่อนความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

ASEAN-WEN คือ:

- \* เครือข่ายส่งเสริมให้กฎหมายมีผลบังคับใช้ระหว่างรัฐบาลในระดับภูมิภาค เพื่อต่อสู้กับการค้าสัตว์ปา่อย่างผิดกฎหมาย
   \* การตอบสนองเชิงรุกต่อระดับการลอบค้าและการสูญเสียสัตว์ปา่อันนาตกใจ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
   \* กลไกที่เอื้อให้แต่ละประเทศแบ่งปันข้อมูลและเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดจากกันและกัน

TRAFFIC เครือข่ายเฝ้าระวังการค้าสัตว์ป่า ทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าการค้าพืชและสัตว์ป่า มิได้เป็นภัยคุกคามต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยมีสำนักงานครอบคลุมเกือบทั่วโลกและ ทำงานประสานความรวมมืออย่างใกล้ชิดกับคณะทำงานของอนุสัญญาว่าด้วยการค้า ระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ:

Regional Director TRAFFIC Southeast Asia Unit 3 - 2, 1st Floor Jalan SS23/11, Taman SEA, 47400 Petaling Jaya Selangor MALAYSIA

Tel: +603 7880 3940 Fax: +603 7882 0171 Website: www.traffic.org TRAFFIC เป็นโครงการ ความร่วมมืดของ



