

Notochelys platynota - ເຕົ້າຫລັງພຽງ

Malayan Flat-shelled Turtle

ຊື່ອື່ນ:

ເຂດການກະຈາຍພັນ: ປະເທດບຣູໄນ; ອິນໂດເນເຊຍ; ມາເລເຊຍ; ໄທ; ຫວຽດນາມ

ລັກສະນະພາຍນອກ: ຄວາມຍາວຂອງລຳຕົວ: ຍາວເຖິງ 40 ຊມ

ສະຖານະພາບດ້ານການອະນຸລັກສາກົນ:

ສິນທິສັນຍາ CITES ບັນຊີ II

ອົງການສາກົນເພື່ອການອະນຸລັກທຳມະຊາດ (IUCN): VU (ມີແນວໂນ້ມໃກ້ຈະສູນພັນ)

ສະຖານະພາບດ້ານການອະນຸລັກໃນ ສປປ ລາວ:

ບໍ່ມີໃນບັນຊີ



Notochelys platynota (ເຕົ້າຫລັງພຽງ)

Credit: Chris R. Shepherd

ຄຳຂາຍເປັນ: ອາຫານ ແລະ ສັດລ້ຽງ

ລັກສະນະຈຸດພິເສດ:

ອອງດ້ານເທິງ:


- ມີຮູບຊົງຄືໝວຍໄຂ່ ແລະ ມີລັກສະນະເປັນແຜ່ນພຽງພາດຜານເທິງອອງດ້ານເທິງ
- ມີສາຍຄູສັນຫລັງສິນຕຳພາດຜ່ານອອງດ້ານເທິງ
- ປົກກະຕິຈະມີເກັດ 6 - 7 ເກັດພາດຜ່ານເທິງອອງດ້ານເທິງ

ອອງດ້ານລຸ່ມ (ພື້ນທ້ອງ):

- ມີສ່ວນເຫລືອທີ່ຕັ້ງຈາກເອິກເຕົ້າທີ່ສາມາດເຫັນຕັ້ງໄດ້
- ມີຮອຍເປື້ອນຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ຜິດປົກກະຕິ ຫລືວ່າບໍ່ມີລວດລາຍເລີຍ



ມີເຄື່ອງໝາຍສີອອກເຫລືອງຢູ່ປາຍດັງ, ຂາກັນໄກເບື້ອງລຸ່ມ ແລະ ຄໍຫອຍເບື້ອງເທິງ



ປົກກະຕິຈະມີເກັດ 6 - 7 ເກັດພາດຜ່ານເທິງອອງດ້ານເທິງ

ຂອບເກັດເປັນລັກສະນະຄືແຂວເລື້ອຍໄປດ້ານຫລັງ (ໂຕໃຫຍ່ແກ່ຈະມີໜ້ອຍ)

ມີສ່ວນເຫລືອທີ່ຕັ້ງຈາກເອິກເຕົ້າທີ່ສາມາດເຫັນຕັ້ງໄດ້

ຄ້າຍຄືກັບ:

Cyclemys spp.

- ຈຳພວກເຕົ້ານ້ຳ spp.

IUCN: *Cyclemys dentata*: NT (ໃກ້ຖືກຄຸກຄາມ)

ຊະນິດພັນອື່ນແມ່ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ທຳການປະເມີນເທື່ອ

ຂະໜາດຂອງລຳຕົວ: ຍາວເຖິງ 25 ຊມ

ຖືກຄຸກ-ຂາຍເປັນ: ອາຫານ ແລະ ສັດລ້ຽງ

ອອງດ້ານເທິງ

- ປົກກະຕິຈະມີເກັດ 5 ເກັດພາດຜ່ານເທິງອອງດ້ານເທິງ
- ມີສາຍຄູສັນຫລັງປູພາດຜ່ານອອງດ້ານເທິງ

ໃນແຕ່ລະເກັດມີລວດລາຍທີ່ເປັນເງົາເຫລື້ອມເບິ່ງເປັນປະກາຍ

ເຫລື້ອມເບິ່ງເປັນປະກາຍ

ມີສ່ວນເຫລືອທີ່ຕັ້ງຈາກເອິກເຕົ້າທີ່ສາມາດເຫັນຕັ້ງໄດ້ (ມັກຈະເຫັນໄດ້ຍາກ)

ເສັ້ນຮອຍທີ່ລະຫວ່າງສອງເກັດສູດທ້າຍກົງໄປດ້ານໜ້າຢ່າງຈະແຈ້ງ

ເກັດເບື້ອງລຸ່ມແມ່ນມີຂະໜາດໃຫຍ່ສົມຄວນ

ເຂດການກະຈາຍ: ປະເທດບຣູໄນ, ບຣູໄນ, ກຳປູເຈຍ, ຈີນ, ອິນເດຍ, ອິນໂດເນເຊຍ, ສປປລາວ, ມາເລເຊຍ, ມຽນມາ, ເນປານ, ຟີລິບປິນ, ສິງກະໂປ, ໄທ, ຫວຽດນາມ

ອອງດ້ານລຸ່ມ (ພື້ນທ້ອງ)

- ປົກກະຕິຈະມີເກັດ 5 ເກັດພາດຜ່ານເທິງອອງດ້ານເທິງ
- ມີສາຍຄູສັນຫລັງ 3 ສັນພາດຜ່ານອອງດ້ານເທິງ

ອອງດ້ານລຸ່ມ (ພື້ນທ້ອງ)

- ມີຮອຍເປື້ອນຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ຜິດປົກກະຕິ ຫລືວ່າບໍ່ມີລວດລາຍເລີຍ
- ບໍ່ມີສ່ວນເຫລືອທີ່ຕັ້ງຈາກເອິກເຕົ້າທີ່ສາມາດເຫັນຕັ້ງໄດ້

ເຂດການກະຈາຍ: ອິນໂດເນເຊຍ

ອອງດ້ານເທິງ:

- ປົກກະຕິຈະມີເກັດ 5 ເກັດພາດຜ່ານເທິງອອງດ້ານເທິງ
- ມີສາຍຄູສັນຫລັງ 3 ສັນພາດຜ່ານອອງດ້ານເທິງ

ອອງດ້ານລຸ່ມ (ພື້ນທ້ອງ)

- ມີຮອຍເປື້ອນຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ຜິດປົກກະຕິ ຫລືວ່າບໍ່ມີລວດລາຍເລີຍ
- ບໍ່ມີສ່ວນເຫລືອທີ່ຕັ້ງຈາກເອິກເຕົ້າທີ່ສາມາດເຫັນຕັ້ງໄດ້

ເຂດການກະຈາຍ: ອິນໂດເນເຊຍ



ອອງດ້ານເທິງ:

- ປົກກະຕິຈະມີເກັດ 5 ເກັດພາດຜ່ານເທິງອອງດ້ານເທິງ
- ມີສາຍຄູສັນຫລັງ 3 ສັນພາດຜ່ານອອງດ້ານເທິງ

ອອງດ້ານລຸ່ມ (ພື້ນທ້ອງ)

- ມີຮອຍເປື້ອນຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ຜິດປົກກະຕິ ຫລືວ່າບໍ່ມີລວດລາຍເລີຍ
- ບໍ່ມີສ່ວນເຫລືອທີ່ຕັ້ງຈາກເອິກເຕົ້າທີ່ສາມາດເຫັນຕັ້ງໄດ້

ເຂດການກະຈາຍ: ອິນໂດເນເຊຍ



Cyclemys spp. (ເຕົ້ານ້ຳ)

Heosemys spinosa - ເຕົ້າໜາມ

IUCN: EN (ໃກ້ຈະສູນພັນ).

ຂະໜາດຂອງລຳຕົວ: ຍາວເຖິງ 23 ຊມ

ຖືກຄຸກ-ຂາຍເປັນ: ອາຫານ ແລະ ສັດລ້ຽງ

ອອງດ້ານເທິງ:

- ປົກກະຕິຈະມີເກັດ 5 ເກັດພາດຜ່ານເທິງອອງດ້ານເທິງ
- ມີສາຍຄູສັນຫລັງປູພາດຜ່ານອອງດ້ານເທິງ
- ໃນແຕ່ລະເກັດມີລວດລາຍທີ່ເປັນເງົາເຫລື້ອມເບິ່ງເປັນປະກາຍ
- ບໍ່ມີສ່ວນເຫລືອທີ່ຕັ້ງຈາກເອິກເຕົ້າທີ່ສາມາດເຫັນຕັ້ງໄດ້

ເຂດການກະຈາຍ: ບຣູໄນ, ອິນໂດເນເຊຍ; ມາເລເຊຍ, ຟີລິບປິນ, ສິງກະໂປ, ໄທ

Heosemys grandis - ເຕົ້າຫວາຍ

ອົງການສາກົນເພື່ອການອະນຸລັກທຳມະຊາດ (IUCN): VU (ມີແນວໂນ້ມໃກ້ຈະສູນພັນ).

ຂະໜາດຂອງລຳຕົວ: ຍາວເຖິງ 48 ຊມ

ຖືກຄຸກ-ຂາຍເປັນ: ອາຫານ ແລະ ສັດລ້ຽງ

ອອງດ້ານເທິງ:

- ປົກກະຕິຈະມີເກັດ 5 ເກັດພາດຜ່ານເທິງອອງດ້ານເທິງ
- ມີສາຍຄູສັນຫລັງປູພາດຜ່ານອອງດ້ານເທິງ
- ໃນແຕ່ລະເກັດມີລວດລາຍທີ່ເປັນເງົາເຫລື້ອມເບິ່ງເປັນປະກາຍ
- ບໍ່ມີສ່ວນເຫລືອທີ່ຕັ້ງຈາກເອິກເຕົ້າທີ່ສາມາດເຫັນຕັ້ງໄດ້

ເຂດການກະຈາຍ: ກຳປູເຈຍ, ສປປລາວ, ມາເລເຊຍ, ມຽນມາ, ໄທ, ຫວຽດນາມ

Leucocephalon yuwonoi - ເຕົ້າປາສູລາເວລີ

ອົງການສາກົນເພື່ອການອະນຸລັກທຳມະຊາດ (IUCN): CR (ໃກ້ສູນພັນຢ່າງຍິ່ງ)

ຂະໜາດຂອງລຳຕົວ: ຍາວເຖິງ 25 - 28 ຊມ

ຖືກຄຸກ-ຂາຍເປັນ: ອາຫານ ແລະ ສັດລ້ຽງ

ອອງດ້ານເທິງ:


- ປົກກະຕິຈະມີເກັດ 5 ເກັດພາດຜ່ານເທິງອອງດ້ານເທິງ
- ມີສາຍຄູສັນຫລັງ 3 ສັນພາດຜ່ານອອງດ້ານເທິງ
- ໃນແຕ່ລະເກັດມີລວດລາຍທີ່ເປັນເງົາເຫລື້ອມເບິ່ງເປັນປະກາຍ
- ບໍ່ມີສ່ວນເຫລືອທີ່ຕັ້ງຈາກເອິກເຕົ້າທີ່ສາມາດເຫັນຕັ້ງໄດ້

ເຂດການກະຈາຍ: ອິນໂດເນເຊຍ



ອອງດ້ານເທິງ:

ອອງດ້ານລຸ່ມ (ພື້ນທ້ອງ)



Credit: Mark Auliya

Credit: Mark Auliya