

# Lissemys spp. - ຈຳພວກເຕົ້າຊະນິດ ແຟ້ລບເຊວ

## Flapshell Turtles

ຊື່ອື່ນ:

ເຂດການກະຈາຍພັນ: ບັງກລາເທດ, ອິນເດຍ, ມຸ່ງມ່າ, ເນປານ, ປາກົດສະຖານ, ສິຣິລັງກາ

ລັກສະນະພາຍນອກ: ຄວາມຍາວຂອງລຳຕົວ: ຍາວເຖິງ 37 ຊມ

ສະຖານະພາບດ້ານການອະນຸລັກສາກົນ:  
ສິນທິສັນຍາ CITES ບັນຊີ II

ອົງການສາກົນເພື່ອການອະນຸລັກທຳມະຊາດ (IUCN): LR - DD  
(ຢູ່ໃນລະດັບຄວາມສ່ຽງຕ່ຳ-ມີຂໍ້ມູນບໍ່ພຽງພໍ)

ສະຖານະພາບດ້ານການອະນຸລັກໃນ ສປປ ລາວ:  
ບໍ່ມີໃນບັນຊີ



*Lissemys scutata* (ເຕົ້າຊະນິດແຟ້ລບເຊວພະມ້າ)  
Credit: Peter Paul van Dijk

### ລັກສະນະຈຸດພິເສດ:

- ອອງເບື້ອງເທິງມີລັກສະນະໂຄ້ງກົມຄືຍອດຂອງຕຶກ
- ສ່ວນເຫລືອທີ່ຕ່ຳຈາກເອິກເຕົ້າທີ່ສາມາດເໜັງຕີງໄດ້ຢູ່ອອງດ້ານລຸ່ມ (ພື້ນທ້ອງ) ທີ່ໃກ້ກັບອອງເພື່ອປ້ອງກັນຫົວ ແລະ ຂາໜ້າ
- ມີໜັງທີ່ເປັນພື້ນຄູ່ໜຶ່ງປົກຄຸມຂາຫລັງເມື່ອເວລາທົດຂາເຂົ້າ




*Lissemys punctata* (ເຕົ້າຊະນິດແຟ້ລບເຊວອິນເດຍ)  
showing hinge partially closed

ອອງດ້ານເທິງ



*Lissemys scutata* (ເຕົ້າຊະນິດແຟ້ລບເຊວພະມ້າ)  
Credit: Indraneil Das

ອອງດ້ານລຸ່ມ (ພື້ນທ້ອງ)



ມີສ່ວນເຫລືອ  
ທີ່ຕ່ຳຈາກ  
ເອິກເຕົ້າທີ່  
ສາມາດ  
ເໜັງຕີງ  
ໄດ້

ມີບໍລິເວນໜັງດ້ານ  
7 ບ່ອນ

ມີໜັງເປັນພື້ນທີ່ປົກປິດຂາ  
ຫລັງເມື່ອທົດຂາເຂົ້າ



*Lissemys punctata* (ເຕົ້າຊະນິດແຟ້ລບເຊວອິນເດຍ)  
Credit: Peter Paul van Dijk

*Lissemys scutata* (ເຕົ້າຊະນິດແຟ້ລບເຊວພະມ້າ)  
Credit: Peter Paul van Dijk

ຄ້າຂາຍເປັນ: ອາຫານ ແລະ ໂຕເປັນໄວ້ເປັນສັດລ້ຽງ, ພື້ນທ້ອງໃຊ້ປະກອບເປັນຢາພື້ນເມືອງ

ຄ້າຍຄືກັນ: ລັດຈຳພວກປາຝາ.

- ບໍ່ມີສ່ວນເຫລືອທີ່ຕ່ຳຈາກເອິກເຕົ້າທີ່ສາມາດເໜັງຕີງໄດ້
- ບໍ່ມີໜັງເປັນພື້ນເພື່ອປົກປິດຂາຫລັງເມື່ອເວລາທົດຂາເຂົ້າ



*Amyda cartilaginea*  
(ປາຝາອາຊີ)

Credit: Mark Auliya/TRAFFIC SEA



*Pelochelys cantorii*  
(ປາຝາໜ້າກົບ)

Credit: Mark Auliya/TRAFFIC SEA